

# TRAITÉ

DE

MÉCANIQUE CÉLESTE.

TRAITE

MECANIQUE CELESTE

rue du Jardinet, nº 12.

# TRAITÉ

DE

## MÉCANIQUE CÉLESTE,

#### PAR M. LE MARQUIS DE LAPLACE,

Pair de France; Grand'Croix de la Légion - d'Honneur; l'un des quarante de l'Académie française; de l'Académie des Sciences, Membre du Bureau des Longitudes de France; des Sociétés royales de Londres et de Gottingue; des Académies des Sciences de Russie, de Danemarck, de Suède, de Prusse, des Pays-Bas, d'Italie, de Boston, etc.

TOME CINQUIÈME.

#### PARIS,

BACHELIER (SUCCESSEUR DE MME VE COURCIER), LIBRAIRE,

# 4017462 1825

11/200

AX6 425

# TRAITE

DE

## MECANIQUE CÉLESTE,

#### PAR M. LE MARQUIS DE LAPEACE.

Pair de France; Grand'Croix-de la Legion - d'Honneur; l'un des quarante de l'Académie française; de l'Académie des Sciences, Membre du Bureau des Longitudes de France; des Societés royales de Londres et de Cottingue; des Académies des Sciences de Russie, de Banemarck, de Suède, de Prusse, des Pays-Bas, d'Ilalie, de Boston, etc.

TOME CINQUIEME

PARIS,

RACHELIER (SUCCESSEUR DE MOLE VE COURCIER), LIDRAIRE,

1825

## TABLE DES MATIÈRES

CHAR, IH De la vitesse du son, du mouvement des fluides élasti

CONTENUES DANS LE CINQUIÈME VOLUME.

## et spé n'lement esur le flux et le reflux de la merze et . page 145

CHAP 1. Notice historique des travaux des géomètres sur cet objet,

DE LA FIGURE ET DE LA ROTATION DE LA TERRE.

CHAP. I. Notice historique des travaux des géomètres su	r cet ob-
jet	page 2
CHAP. II. De la figure de la terre	
CHAP. III. De l'axe de rotation de la terre	
CHAP. IV. De la chaleur de la terre et de la diminution de	
du jour par son refroidissement	page 72

#### LIVRE XII.

DE	L'ATTRACTION	ET	DE	LA	REPULSION	DES	S SPHĚRE	S, ET	DES	LOIS	DI
30	L'ÉQUILIBR	E E	T DU	M	OUVEMENT	DES	FLUIDES	ÉLAST	IQUES	IOM S	OES

CHAP. I. Notice	historique	des	recherches	des	géomètres	sur	cet
objet	00. At 1, 200.00	·iejei	· · · · · · · · · · · · · · · ·	prece	1.20.10	page	87

CHAP. II.	Sur	l'attra	ction	des	spheres	et	sur la	répulsion	des fluides
élastiques			150210	1 .0720	l'equate	ap	ement	onous mp	. page 100

		AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	MICHIGAN CONTRACTOR	CONTRACTOR OF STREET
PET A	TIFE	TOTA	75 / 1 77	ALL LALLEL
1 A	14 . H	111	IVI A	TERES.
$\perp \Delta$		DLD	TATAL	

							des fluid		
ques	et de	lava	peur aqu	ieuse		 		page	119
	e e	出出	HIL	AM	83	MI	TAB		

#### CONTRNUES DAYIX TARYILLIEME VOLUME.

DES OSCILLATIONS DES FLUIDES QUI RECOUVRENT LES PLANÈTES.

CHAP. I. Notice historique des travaux des géomètres sur cet objet et spécialement sur le flux et le reflux de la mer page 14
CHAP. II. Nouvelles recherches sur la théorie des marées, page 16
CHAP. III. Comparaison de l'analyse précédente avec les observe tions des hauteurs des marées dont la période est d'environ u
demi-jour page 18
CHAP. IV. Comparaison de l'analyse avec les observations des heure
et des intervalles des marées page 21
CHAP. V. Des flux partiels dont la période est à peu près d'u
jour page 22
CHAP. VI. Des flux partiels qui dépendent de la quatrieme puis
sance inverse de la distance de la Lune à la Terre page 23
CHAP. VII. Du flux et reflux de l'atmosphère page 23

### DE L'ATTRACTION ET DE LA RÉPULSION DES SHIERES, ET DES LOIS DE

DES MOUVEMENS DES CORPS CÉLESTES AUTOUR DE LEURS CENTRES DE GRAVITÉ. L. Votice historique des recherches des geometres sur cet

CHAP. 1. De la précession des équinoxes. Notice historique des travaux des géomètres et des astronomes sur cet objet. Formules générales du mouvement de l'équateur terrestre..... page 245

- CHAP. II. De la libration de la Lune. Notice historique des travaux des astronomes et des géomètres sur cet objet. Remarques sur la théorie de la libration de la Lune..................... page 278
- CHAP. III. Des anneaux de Saturne. Notice historique des travaux des géomètres et des astronomes sur cet objet..... page 288

#### LIVRE XV.

\* CHAP. VII. Des satellites de Saurne et d'Uranus. . . . . page

DU MOUVEMENT DES PLANÈTES ET DES COMÈTES.

- CHAP. I. Notice historique des travaux des géomètres et des astronomes sur cet objet..... page 293

#### LIVRE XVI.

DU MOUVEMENT DES SATELLITES.

- CHAP. I. Du mouvement de la Lune. Notice historique des travaux des géomètres et des astronomes sur cet objet...... page 350
- CHAP. II. Sur la théorie lunaire de Newton..... page 349 367
- CHAP. III. De l'inégalité lunaire à longue période dépendante de la différence des deux hémisphères terrestres. Des inégalités lunaires dépendantes de la partie elliptique du rayon terrrestre, p. 381

viij	TABLE DES MATIÈRES.
CHAP.	IV. Sur la loi de l'attraction universelle page 401
rique	V. Du mouvement des satellites de Jupiter. Notice histo- des travaux des astronomes et des géomètres sur cet ob- 
	VI. De l'influence des grandes inégalités de Jupiter sur les emens de ses satellites
CHAP.	VII. Des satellites de Saturne et d'Uranus page 417
Erra	ta du cinquième volume page 420

tions the etchetis an mousement attiptique

ob offingons obg fin de la table du cinquième volume.

----

DO MUDUEMENT DES SATELLITES.

des géomètres et des astronomes sur cet objet..... page 350 CHAP. II. Sur la théorie hunaire de Newton..... page 349

CHAP III. De l'inegalité lunaire à longue periode det ordante de la différence des deux hemisphères terrestres. Des inegalités lu-

# TRAITÉ

DE

# MÉCANIQUE CÉLESTE.

LIVRE XI.

MARS 1823.

TRAITE

IMPRIMERIE DE HUZARD-COURCIER.

MÉCANIQUE CÉLESTE.

LIVREXL

MARS 1893.

### AVERTISSEMENT.

CE tome cinquième et dernier de mon Traité de Mécanique céleste, paraissant long-temps après les autres; il m'a paru convenable d'en publier séparément les divers livres, aussitôt après leur impression, en indiquant la date de leur publication.

les Tems d'in sense ou il sorait mile de les réunir

### AVERTISSEMENT.

CE tome cinquième et dernier de mon Traité de Mécanique colesse, paraissant long-temps après les antres; il m'a paru convenable d'en publier séparément les divers livres, aussitôt après leur impression, en indiquant la date de leur pu-blication.

### TRAITÉ

DE

### MÉCANIQUE CÉLESTE.

### NOTICE HISTORIQUE

Des Travaux des Géomètres sur la Mécanique céleste, et nouvelles Recherches sur le Système du Monde.

J'ar annoncé au commencement de ce Traité, que je le terminerais par une Notice historique des travaux des géomètres sur la Mécanique céleste. Je vais ici remplir cet engagement. Mais ayant fait depuis l'impression des volumes précédens de cet Ouvrage, de nouvelles recherches sur divers points de la Mécanique céleste, recherches que j'ai publiées dans les Mémoires de l'Institut et dans le Recueil de la Connaissance des Tems; j'ai pensé qu'il serait utile de les réunir à la suite des notices historiques sur chaque objet. Je vais commencer par la figure et la rotation de la Terre.

qui, par consequent, est la même qu'an pôle de l'ellipsoide terminé par

#### LIVRE XI.

DE LA FIGURE ET DE LA ROTATION DE LA TERRE.

#### CHAPITRE Ier.

Notice historique des travaux des Géomètres sur cet objet.

1. Le ne parlerai dans cette notice, que des recherches sur la théorie mathématique de la Terre. On ne peut alors remonter qu'à Newton, fondateur de cette théorie qu'il publia sur la fin de 1687, dans ses Principes mathématiques de la Philosophie naturelle. Ce grand géomètre y considère la Terre comme une masse fluide homogène, douée d'un mouvement de rotation, et dont toutes les parties s'attirent réciproquement au carré de la distance. Il suppose ensuite que cette masse prend, dans l'état d'équilibre, la figure d'un ellipsoïde de révolution; et il cherche, dans cette supposition, le rapport de l'axe du pôle à celui de l'équateur. Pour cela, il conçoit deux colonnes fluides partant du centre, et aboutissant, l'une au pôle, et l'autre à l'équateur; et il observe que les poids de ces deux colonnes doivent se faire équilibre. Si l'on imagine l'ellipsoïde, divisé en couches infiniment minces et semblables; la gravité (je nomme ainsi la résultante de toutes les forces attractives), sera aux pôles de ces couches, proportionnelle à leurs petits axes; car Newton établit cette proposition remarquable, savoir : qu'un point placé dans un ellipsoïde creux, dont les deux surfaces intérieure et extérieure sont semblables et semblablement situées, est également attiré de toutes parts. Ainsi, à la surface d'une couche terrestre, les couches supérieures n'ont aucune influence sur la gravité qui, par conséquent, est la même qu'au pôle de l'ellipsoïde terminé par la surface de cette couche. Or, il est facile de voir que la gravité des

points semblablement situés sur les surfaces de deux corps homogènes, semblables et de même densité, est proportionnelle aux dimensions linéaires et semblables de ces corps. Cela résulte de ce que l'attraction étant égale à la masse divisée par le carré de la distance, elle n'est que d'une dimension relativement à l'étendue. De là il suit que le poids de la colonne du pôle, étant la somme des gravités aux surfaces des diverses couches, il est égal au produit de la pesanteur au pôle; par la moitié de la longueur de cette colonne, ou par le quart de l'axe du pôle. Un raisonnement semblable fait voir que le poids de la colonne de l'équateur est le produit de la pesanteur à l'équateur, par le quart du demi-axe de l'équateur. Car la pesanteur à l'équateur est la gravité diminuée de la force centrifuge; et cette force diminue de la surface au centre, comme la gravité, c'est-à-dire proportionnellement à la distance à ce point. Ainsi dans l'état d'équilibre, le produit de la gravité au pôle, par l'axe du pôle, est égal au produit de la pesanteur à l'équateur, par l'axe de l'équateur.

Pour avoir au pôle, la gravité qui, sur ce point, est la pesanteur même, Newton considère un ellipsoïde de révolution, dont l'axe de révolution contient 100 parties, et l'axe de l'équateur 101; et il trouve au moyen des propositions qu'il établit sur la gravité aux pôles des sphéroïdes de révolution, que la gravité au pôle de cet ellipsoïde est à la gravité à la surface d'une sphère dont le diamètre est de 100 parties, comme 126 est à 125.

Newton obtient de la manière suivante, la gravité à un point quelconque A de l'équateur du même ellipsoïde. Il considère une sphère
ayant le même centre que l'ellipsoïde, dont la surface passe par le
point A, et dont le diamètre est, par conséquent, de 101 parties; et il
observe que si l'on diminue d'une partie, un des diamètres perpendiculaires à celui qui passe par le point A, de manière que ce diamètre
ainsi diminué devienne l'axe d'un ellipsoïde de révolution, passant par
le même point; ce point sera un point de l'équateur de cet ellipsoïde.
Newton remarque ensuite, que si l'on diminue pareillement d'une partie,
le diamètre de la sphère, perpendiculaire aux deux premiers; on aura un
second ellipsoïde de révolution, dont A sera encore un point de l'équateur. Si l'on fait varier à la fois les deux derniers diamètres; on aura un
ellipsoïde de révolution dont A sera le pôle, et dont l'axe de révolution
aura 101 parties, l'axe de l'équateur n'en ayant que 100. Dans cet

ellipsoïde, la gravité au pôle est à la gravité à la surface de la sphère dont le diamètre est de 101 parties, comme 125 est à 126. Mais par la nature des variations très petites de deux quantités, la diminution de la gravité, due à la diminution simultanée des deux diamètres, est la somme des diminutions de la gravité, lorsqu'on diminue le second diamètre sans diminuer le troisième, et lorsqu'on diminue le troisième, sans diminuer le second; et cette somme est le double de l'excès de la gravité à la surface de la sphère, dont le diamètre est de 101 parties, sur la gravité à l'équateur de l'ellipsoïde, dont l'axe de l'équateur étant de 101 parties, l'axe du pôle est de 100 parties. De là il est aisé de conclure que cet excès est  $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{126}$  de la gravité à la surface de cette sphère. Mais cette gravité est à la gravité à la surface de la sphère dont le diamètre est de 100 parties, comme 101 est à 100; d'où l'on conclut que la gravité au pôle de l'ellipsoïde supposé primitivement, est à la gravité à son équateur, comme  $\frac{126}{125}$ . 100 :  $\frac{125\frac{1}{2}}{126}$ . 101, ou, à très peu près, comme 501 est à 500. Désignons par φ le rapport de la force centrifuge à la gravité, à l'équateur; les pesanteurs au pôle et à l'équateur de l'ellipsoïde seront donc dans le rapport de 501 à 500  $(1-\varphi)$ . Ces pesanteurs multipliées respectivement par les longueurs des colonnes fluides, ou par 100 et 101, sont proportionnelles aux poids de ces colonnes. Ainsi, pour l'égalité de ces poids, ou pour l'équilibre, le produit de 501 par 100, doit égaler le produit de 500.  $(1-\varphi)$  par 101; ce qui donne à fort peu près  $\varphi$  égal à  $\frac{4}{500}$ , ou égal à  $\frac{4}{5}$  de l'aplatissement  $\frac{1}{100}$  de l'ellipsoïde. L'aplatissement d'un ellipsoïde quelconque très peu différent de la sphère, est donc généralement égal à 5/4 du rapport de la force centrifuge à la gravité à l'équateur; et comme pour la Terre, ce rapport est  $\frac{1}{289}$ , il en résulte un aplatissement égal à  $\frac{1}{250}$ , en sorte que les axes du pôle et de l'équateur sont à fort peu près dans le rapport de 229 à 230. Les pesanteurs à ces points sont, comme on l'a vu, réciproques à ces axes; elles sont donc dans le rapport de 230 à 229. Newton suppose que de l'équateur aux pôles, la pesanteur croît comme le carré du sinus de la latitude.

Tel est le premier pas que l'on a fait dans la théorie mathématique de la figure de la Terre. Il laissait, sans doute, beaucoup à désirer. Newton suppose, sans le démontrer, que la figure elliptique convient à l'équilibre d'une masse fluide homogène tournant sur un axe. Il suppose encore, sans démonstration, que la pesanteur à la surface, augmente de l'équateur aux pôles, comme le carré du sinus de la latitude. Enfin, il regarde la Terre comme homogène; ce qui est contraire aux observations qui prouvent incontestablement que les densités des couches du sphéroïde terrestre croissent de la surface au centre. Malgré ces imperfections, ce premier pas doit paraître immense; si l'on considère l'importance et la nouveauté des propositions que l'auteur établit sur les attractions des sphères et des sphéroïdes, et la difficulté de la matière.

Environ deux ans après la publication du livre des Principes mathématiques de la Philosophie naturelle, Huygens traita le même sujet, dans un Appendice à sa Dissertation sur la cause de la gravité. Il n'admet point l'attraction de molécule à molécule, et il suppose que chaque molécule d'une masse fluide homogène, tournant sur un axe, tend vers le centre de gravité de cette masse, en raison inverse du carré de sa distance à ce point. Le problème de la figure de cette masse présente alors beaucoup moins de difficultés. En combinant la force centrifuge avec la tendance vers le centre, Huygens détermine les longueurs que deux colonnes fluides partant du centre et aboutissant à la surface doivent avoir pour se faire équilibre; et il trouve pour la figure du méridien, une courbe du quatrième ordre, qui, lorsqu'on suppose très petit, le rapport \varphi de la force centrifuge à la pesanteur à l'équateur, devient une ellipse dont le petit axe étant représenté par l'unité, le grand axe est  $1 + \frac{1}{2} \varphi$ . Il trouve ensuite que la pesanteur croît de l'équateur aux pôles, proportionnellement au carré du sinus de la latitude, et de manière que la pesanteur étant supposée 1 à l'équateur, elle est 1 + 20 aux pôles. On vient de voir que dans la théorie de Newton, les axes et les pesanteurs sont dans le rapport de 1 à  $1+\frac{5}{4}\varphi$ ; ce qui est bien différent des résultats d'Huygens. Mais il est remarquable que dans ces deux théories, la somme de l'ellipticité et de l'excès de la pesanteur au pôle, sur la pesanteur à l'équateur, prise pour unité, soit la même et égale à  $\frac{5}{2}\varphi$ . La théorie d'Huygens revient à considérer la Terre comme un sphéroïde composé de couches infiniment rares de la surface au centre, et d'une densité infinie, infiniment près du centre; ce qui donne la limite de l'aplatissement, lorsqu'on suppose les densités de couches, croissantes de la surface au centre. La théorie de Newton donne l'autre limite de l'aplatissement dans la même supposition. C'est donc entre les limites  $\frac{1}{2} \varphi$  et  $\frac{5}{4} \varphi$  que doit être l'aplatissement de la Terre; et c'est, en effet, ce qui résulte des observations.

On n'ajouta rien à la théorie de Newton, jusqu'en 1737. Clairant prouva dans les Transactions philosophiques de cette année, que les suppositions sur lesquelles Newton avait fondé sa théorie, étaient exactes. Il fit voir que la figure elliptique satisfait à l'équilibre d'une masse fluide homogène, peu différente d'une sphère, et tournant sur un axe; et qu'à la surface de cette masse. la pesanteur croît proportionnellement au carré du sinus de la latitude. L'Académie des Sciences proposa pour le sujet du prix qu'elle devait décerner en 1740, la Théorie du flux et du reflux de la mer. Parmi les pièces qui partagèrent le prix, celle de Maclaurin est la plus remarquable par l'importance et par la beauté des résultats sur les attractions des sphéroïdes elliptiques de révolution. L'auteur y démontre que la figure elliptique satisfait rigoureusement à l'équilibre d'un e masse fluide homogène douée d'un mouvement de rotation, en prenant pour condition de l'équilibre, celle de l'équilibre du fluide dans un canal intérieur de figure quelconque, et aboutissant par ses extrémités, à la surface. Il détermine l'attraction à la surface de cette masse, et en la combinant avec la force centrifuge, il parvient à ce théorème, savoir que si, d'un point quelconque de la surface, on abaisse une perpendiculaire que l'on prolonge jusqu'au plan de l'équateur; la pesanteur à ce point, sera proportionnelle à cette perpendiculaire, et le rayon de courbure sera proportionnel au cube de la même ligne. Enfin, il obtient par une équation transcendante, le rapport des axes des pôles et de l'équateur. La méthode suivie par l'auteur est purement géométrique; et ce morceau de synthèse peut être comparé à ce que les anciens géomètres nous ont laissé de plus parfait, et à l'ouvrage d'Huvgens de Horologio oscillatorio.

Clairant publia en 1743, son ouvrage sur la Théorie de la figure de la Terre. Il y donne les équations générales jusqu'alors inconnues, de l'équilibre des fluides soit homogènes, soit hétérogènes, ou composés d'un

nombre quelconque de fluides, quelles que soient les forces qui animent chacune de leurs molécules, et en supposant entre ces molécules une attraction mutuelle suivant une loi quelconque. Appliquant ensuite ces équations à la Terre, en la supposant formée d'une ou de plusieurs et même d'une infinité de fluides, tous circulant autour d'un même axe, il prouve que la figure elliptique satisfait à l'équilibre des couches de niveau, lorsque leur figure est peu différente de la formé sphérique; et il détermine les ellipticités de ces couches, et la loi de la pesanteur à la surface de la couche extérieure. Il parvient aux expressions des mêmes quantités, dans le cas général où la Terre serait formée d'un novau elliptique recouvert d'un ou de plusieurs fluides, le noyau étant luimême formé de couches elliptiques dont les figures et les densités varient du centre à la suface; et il est conduit à ce résultat remarquable, savoir, que si l'on nomme E l'ellipticité de la Terre, ou l'excès de l'axe de l'équateur sur celui des pôles pris pour unité; si l'on désigne par C l'excès de la pesanteur aux pôles sur la pesanteur à l'équateur prise pour unité de pesanteur; enfin, si l'on exprime par ve le rapport de la force centrifuge à l'équateur, à l'unité de pesanteur; la somme E+C, dans toutes les hypothèses que l'on peut faire sur la constitution intérieure de la Terre, est constante et égale à 5 φ : l'accroissement de la pesanteur de l'équateur aux pôles, est le produit de C par le carré du sinus de la latitude. L'importance de tous ces résultats et l'élégance avec laquelle ils sont présentés, placent cet ouvrage au rang des plus belles productions mathématiques.

Clairaut y expose une théorie de l'action capillaire; mais cette théorie me paraît insignifiante. En concevant un tuyau cylindrique d'un très petit diamètre intérieur, plongé verticalement dans un fluide par son extrémité inférieure, il analyse toutes les forces dont la colonne infiniment petite du fluide, passant par l'axe du tube, est animée, en supposant une attraction des molécules du tube sur celles du fluide, et des molécules fluides sur elles-mêmes; la loi d'attraction étant la même dans les deux cas relativement à la distance, mais pouvant différer d'intensité. Clairaut remarque ensuite, que parmi toutes les lois possibles d'attraction, il doit y en avoir une ou plusieurs qui donnent, conformément à l'expérience, l'élévation du fluide dans le tube, réciproque au diamètre intérieur du tube; mais la difficulté du problème, consiste à dé-

terminer ces lois. C'est ce que j'ai fait dans ma Théorie de l'action capillaire de laquelle il résulte que toutes les lois d'attraction, qui la rendent insensible à des distances sensibles, satisfont à l'expérience, et sont les seules qui puissent y satisfaire. Mais Clairaut était d'autant plus éloigné de ce résultat, qu'il supposait au contraire que l'attraction du tube sur le fluide est sensible sur les molécules fluides placées dans l'axe. Il a, cependant, été conduit par cette fausse supposition, à ce résultat dont j'ai fait voir l'exactitude, savoir, que le fluide sera toujours élevé dans le tube au-dessus du niveau, tant que le double de l'intensité de l'attraction des molécules du tube sur celle du fluide surpassera l'intensité de l'attraction des molécules fluides sur elles-mêmes. Ce n'est pas le seul exemple de suppositions fausses, ayant conduit à des vérités; mais la découverte d'une vérité n'appartient qu'à celui qui le premier la démontre.

La méthode que Clairaut a suivie dans sa Théorie de la figure de la Terre, quoique fort élégante, est limitée aux ellipsoïdes de révolution. D'Alembert dans ses Recherches sur le système du monde, publiées en 1754 et 1756, traita cet objet d'une manière beaucoup plus générale. Il détermina les attractions d'un sphéroïde très peu différent de la sphère et dont l'équation de la surface est algébrique, et d'un ordre quelconque, en le supposant même formé de couches de diverses densités; et il en conclut que la figure que ces couches doivent prendre peut satisfaire à la condition générale de leur équilibre, lorsqu'elles sont fluides et douées d'un mouvement de rotation. Cette condition est que la pesanteur soit perpendiculaire à la surface de chaque couche de niveau. D'Alembert employait une autre condition dont Lagrange a fait voir l'identité avec la précédente. Les recherches de d'Alembert, quoique générales, manquent de la clarté si nécessaire dans les calculs compliqués. Elles laissaient surtout à désirer la connaissance des rapports généraux et simples qui doivent exister entre la figure des sphéroïdes et leurs attractions. Ces rapports des grandeurs génératrices aux résultats qui en dérivent, n'intéressent pas moins les géomètres, que les solutions des problèmes

La grande supériorité de l'analyse sur la synthèse se fait principalement sentir dans les questions difficiles du système du monde, questions pour la plupart inaccessibles à la synthèse. Mais le problème des attractions des ellipsoïdes de révolution, résolu avec tant d'élégance, par

Maclaurin, suivant la méthode synthétique, donnait à cette méthode. un avantage sur l'analyse, que l'on devait s'empresser d'autant plus de faire disparaître, qu'il était naturel d'attendre de l'application de l'analyse à cet objet, non-seulement un moyen plus simple d'obtenir les résultats de Maclaurin, mais encore une théorie complète des attractions de ce genre de sphéroïdes. C'est, en effet, ce qui est arrivé. Dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de Berlin, pour l'année 1773, Lagrange, par une transformation heureuse des coordonnées, est parvenu analytiquement et de la manière la plus simple, aux résultats de Maclaurin: il les a étendus à des ellipsoïdes quelconques, et il en a déduit ce théorème que Maclaurin n'avait fait qu'énoncer, et que d'Alembert a démontré le premier, savoir, que l'attraction d'un ellipsoïde quelconque sur un point placé dans le prolongement d'un de ses axes, est à l'attraction d'un sphéroïde qui aurait le même centre et les mêmes fovers, et qui passerait par le point attiré, comme la masse du premier sphéroïde est à la masse du second. Il restait, pour compléter cette théorie, à déterminer l'attraction d'un ellipsoïde sur un point quelconque placé au dehors. M. Legendre, dans le tome X des Savans étrangers, l'a fait à l'égard des ellipsoïdes de révolution, par une analyse ingénieuse et savante qui donne pour tous les sphéroïdes de révolution, un rapport très simple, entre leur attraction sur un point placé dans le prolongement de leur axe de révolution, et leur attraction sur un point placé dans le prolongement d'un rayon quelconque, à la même distance du centre. Relativement aux ellipsoïdes de révolution, ce rapport fait voir que le quotient de l'attraction sur un point quelconque extérieur, divisée par la masse, est le même pour tous les ellipsoïdes de révolution qui ont le même centre et les mêmes foyers; et comme l'attraction à la surface est donnée par les théorèmes de Maclaurin; il ne s'agit, pour avoir l'attraction sur un point quelconque au dehors, que de faire passer par ce point un de ces ellipsoïdes, ce qui est facile. Il était naturel d'étendre ce résultat, aux ellipsoïdes qui ne sont pas de révolution. Mais sa démonstration présentait beaucoup de difficultés. Je l'ai donnée le premier, dans un ouvrage sur la Théorie du mouvement elliptique et de la figure des planètes, qui parut en 1784, et dans mon Traité de Mécanique céleste. Ayant établi un rapport général entre les attractions d'un sphéroïde sur un point quelconque extérieur, et ses attractions sur les points placés dans le prolongement d'un de ses axes, et dans le plan perpendiculaire à cet axe; j'en ai déduit une nouvelle démonstration du résultat dont il s'agit. Enfin, M. Ivori est partenu au même résultat par une transformation très heureuse des coordonnées, sans recourir aux séries. Tel a été le progrès des recherches par lesquelles les géomètres sont parvenus à une théorie complète des attractions des ellipsoïdes.

Maclaurin a fait voir qu'une masse fluide homogène, tournant autour d'un axe, pouvait être rigoureusement en équilibre avec une figure elliptique. Mais y a-t-il d'autres sigures d'équilibre, lorsque le sphéroïde est très peu différent de la sphère? J'ai prouvé, sans connaître sa figure, que la pesanteur à sa surface suit la même loi que si cette figure était celle d'un ellipsoïde de révolution. M. Legendre a fait voir ensuite que si la figure est de révolution, elle doit, pour l'équilibre. être elliptique; et j'ai reconnu que cela est exact, sans supposer une figure de révolution. Mais d'Alembert a prouvé que plusieurs figures elliptiques d'équilibre correspondent à une même durée de rotation. J'ai démontré ensuite qu'il n'y en a que deux; et j'ai déterminé la limite de la durée de rotation que la masse peut avoir sans se dissiper. Mais le véritable problème à résoudre, consiste à déterminer la figure qu'une masse fluide doit prendre, lorsque ses molécules ayant été primitivement animées de forces quelconques, elles parviennent, à la longue, par leur frottement mutuel et par leur ténacité, à un état fixe d'équilibre. J'ai fait voir dans le troisième livre de la Mécanique céleste, que le fluide finit par prendre la figure d'un ellipsoïde de révolution dont l'équateur est le plan primitif du maximum des aires décrites par chaque molécule autour du centre de gravité de la masse. Le mouvement de rotation, ainsi que les axes de l'ellipsoïde de révolution, sont déterminés par ce maximum: il y a toujours une figure possible d'équilibre, et il n'y en a qu'une.

Enfin, j'ai donné dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, pour l'année 1782, et dans le troisième livre de la Mécanique céleste, une théorie générale des attractions des sphéroïdes. La fonction qui exprime la somme des molécules attirantes divisées respectivement par leurs distances au point attiré, a l'avantage d'exprimer par ses différences partielles, la résultante de ces attractions décomposées suivant une direction quelconque. J'ai reconnu à cette fonction, la propriété suivante : la somme de ses trois différences partielles du second ordre,

prises séparément par rapport à chacune des trois coordonnées rectangulaires du point attiré, est constamment égale à zéro. Cette équation fondamentale combinée avec une équation différentielle du premier ordre, à laquelle j'ai trouvé que la fonction dont il s'agit doit satisfaire, lorsque le point attiré est à la surface d'un sphéroïde homogène très peu différent de la sphère, m'a donné par le développement le plus facile, l'expression de l'attraction d'un sphéroïde formé de couches solides ou fluides de densités quelconques, douées d'un même mouvement de rotation, et dont les molécules s'attirent réciproquement au carré de la distance. Les rapports généraux et simples que cette expression donne entre les attractions et la figure des sphéroïdes, m'ont directement conduit à déterminer la figure des couches fluides dans l'état d'équilibre. et la loi de la pesanteur à leur surface. La fécondité de l'équation fondamentale qui sert de base à mon analyse, et qui se reproduit dans la théorie des fluides et dans celle de la chaleur, me porte à croire que les formules auxquelles je suis parvenu, sont les plus générales et les plus simples que l'on puisse obtenir.

Voici maintenant le précis des nouvelles recherches que j'ai ajoutées aux précédentes, et que j'ai publiées dans les volumes de la Connaissance des Tems et de l'Institut.

On voit par la Notice historique que je viens de donner des recherches des géomètres sur la figure de la Terre, qu'ils ont supposé le sphéroïde terrestre entièrement recouvert par la mer : mais ce fluide laissant à découvert, une partie considérable de ce sphéroïde; ces recherches, malgré leur généralité, ne représentent pas exactement la nature, et il est nécessaire de modifier les résultats obtenus dans l'hypothèse d'une inondation générale. A la vérité, la théorie mathématique de la figure de la Terre présente alors plus de difficultés; mais le progrès de l'analyse, surtout dans cette partie, fournit le moyen de les surmonter et de considérer les continens et les mers, tels que l'observation les présente. C'est l'objet de l'analyse suivante. En se rapprochant ainsi de la nature, on entrevoit les causes de plusieurs phénomènes importans que l'Histoire naturelle et la Géologie nous offrent; ce qui peut répandre un grand jour sur ces deux sciences, en les rattachant à la théorie du Système du monde. Voici les principaux résultats de mon analyse. L'un des plus intéressans est le théorème suivant, qui établit incontestablement l'hétérogénéité des couches du sphéroïde terrestre.

« Si à la longueur du pendule à secondes, observée sur un point puelconque de la surface du sphéroïde terrestre, on ajoute le produit de cette longueur, par la moitié de la hauteur de ce point au-dessus du niveau de l'Océan déterminée par l'observation du baromètre, et divisée par le demi-axe du pôle; l'accroissement de cette longueur ainsi corrigée sera, de l'équateur aux pôles, dans l'hypothèse d'une densité de la Terre, constante au-dessous d'une profondeur peu considérable, le produit de cette longueur à l'équateur, par le carré du sinus de la latitude et par cinq quarts du rapport de la force centrifuge à la pesanteur à l'équateur, ou par 43 dix-millièmes. »

Ce théorème auquel j'ai été conduit par l'équation différentielle du premier ordre, qui a lieu à la surface des sphéroïdes homogènes peu différens de la sphère, et dont j'ai parlé ci-dessus, est généralement vrai, quelles que soient la densité de la mer et la manière dont elle recouvre en partie la Terre. Il est remarquable, en ce qu'il ne suppose point la connaissance de la figure du sphéroïde terrestre, ni celle de la mer, qu'il serait impossible d'obtenir.

Les expériences du pendule, faites dans les deux hémisphères, s'accordent à donner au carré du sinus de la latitude, un coefficient plus grand que 43 dix-millièmes, et à fort peu près égal à 54 dix-millièmes de la longueur du pendule à l'équateur. Il est donc bien prouvé par ces expériences, que la Terre n'est point homogène dans son intérieur. On voit de plus, en les comparant à l'analyse, que les densités des couches terrestres vont en croissant de la surface au centre.

La régularité avec laquelle la variation observée des longueurs du pendule à secondes suit la loi du carré du sinus de la latitude, prouve que ces couches sont disposées régulièrement autour du centre de gravité de la Terre, et que leur forme est à peu près elliptique et de révolution.

L'ellipticité du sphéroïde terrestre peut être déterminée par la mesure des degrés du méridien. Les diverses mesures que l'on a faites, comparées deux à deux, donnent des ellipticités sensiblement différentes; en sorte que la variation des degrés ne suit pas aussi exactement que celle de la pesanteur, la loi du carré du sinus de la latitude. J'ai remarqué dans le troisième livre, que cela tient aux secondes différentielle du rayon terrestre, que renferment les expressions des degrés du méridien et du rayon osculateur; tandis que l'expression de la pesanteur ne contient

que les premières différentielles de ce rayon dont les petits écarts d'un rayon elliptique, s'accroissent par les différentiations successives. Mais si l'on compare des degrés éloignés, tels que ceux de France et de l'équateur; leurs anomalies doivent être peu sensibles sur leur différence; et l'on trouve par cette comparaison, l'ellipticité du sphéroïde terrestre égale à  $\frac{1}{308}$ .

Mais un moyen plus précis d'avoir cette ellipticité, consiste à comparer avec un grand nombre d'observations, deux inégalités lunaires dues à l'aplatissement de la Terre, l'une en longitude, et l'autre en latitude. Lorsque je parvins par la théorie, aux expressions analytiques de ces deux inégalités; je priai successivement MM. Bouvard, Burg et Burckardt, de faire cette comparaison. Ils y ont employé plusieurs milliers d'observations lunaires faites depuis Bradley jusqu'à nos jours. Les résultats de leurs calculs, s'accordent à donner l'aplatissement du sphéroïde terrestre, à très peu près égal à  $\frac{1}{306}$ ; et ce qui est digne de remarque, chacune des deux inégalités conduit à ce résultat qui, comme on voit, diffère très peu de celui que donne la comparaison des degrés de France et de l'équateur.

La densité de la mer n'étant qu'un cinquième à peu près, de la moyenne densité de la Terre; ce fluide doit avoir peu d'influence sur les variations des degrés et de la pesanteur, et sur les deux inégalités lunaires dont je viens de parler. Son influence est encore diminuée par la petitesse de sa profondeur moyenne que l'on prouve ainsi. En concevant le sphéroïde terrestre dépouillé de l'Océan, et supposant que dans cet état, sa surface devienne fluide, et soit en équilibre; on aura son ellipticité, par le théorème de Clairaut dont j'ai parlé ci-dessus, en retranchant de cinq fois la moitié du rapport de la force centrifuge à la pesanteur à l'équateur, le coefficient que les expériences donnent au carré du sinus de la latitude, dans l'expression de la longueur du pendule à secondes, cette longueur à l'équateur étant prise pour l'unité. On trouve par là 1/310 pour l'aplatissement du sphéroïde terrestre. Le peu de différence de cet aplatissement, à ceux que donnent les mesures des degrés terrestres et les inégalités lunaires, prouve que la surface de ce sphéroïde, serait à fort peu près celle de l'équilibre, si elle devenait fluide. De là, et de ce que la mer laisse à découvert de vastes continens,

on conclut qu'elle doit être peu profonde, et que sa profondeur moyenne est du même ordre que la hauteur moyenne des continens et des îles au-dessus de son niveau, hauteur qui ne surpasse pas mille mètres. Cette profondeur est donc une petite fraction de l'excès du rayon de l'équateur sur celui du pôle, excès qui surpasse vingt mille mètres. Mais de même que de hautes montagnes recouvrent quelques parties des continens, de même il peut y avoir de grandes cavités dans le bassin des mers. Cependant, il est naturel de penser que leur profondeur est plus petite que l'élévation des hautes montagnes; les dépôts des fleuves et les dépouilles des animaux marins, entraînés par les courans, devant

remplir à la longue, ces cavités.

Ce résultat est important pour l'Histoire naturelle et pour la Géologie. On ne peut douter que la mer n'ait recouvert une grande partie de nos continens sur lesquels elle a laissé des traces incontestables de son séjour. Les affaissemens successifs des îles d'alors et d'une partie des continens, suivis d'affaissemens étendus du bassin des mers, qui ont découvert les parties précédemment submergées, paraissent indiqués par les divers phénomènes que la surface et les couches des continens actuels nous présentent. Pour expliquer ces affaissemens, il suffit de supposer plus d'énergie à des causes semblables à celles qui ont produit les affaissemens dont l'histoire a conservé le souvenir. L'affaissement d'une partie du bassin de la mer, en découvre une autre partie d'autant plus étendue que la mer est moins profonde. Ainsi de vastes continens ont pu sortir de l'Océan sans de grands changemens dans la figure du sphéroïde terrestre. La propriété dont jouit cette figure, de différer peu de celle que prendrait sa surface en devenant fluide, exige que l'abaissement du niveau de la mer, n'ait été qu'une petite fraction de la différence des deux axes du pôle et de l'équateur. Toute hypothèse fondée sur un déplacement considérable des pôles à la surface de la Terre, doit être rejetée, comme incompatible avec la propriété dont je viens de parler. On avait imaginé ce déplacement pour expliquer l'existence des éléphans dont on trouve les ossemens fossiles en si grande abondance dans les climats du nord où les éléphans actuels ne pourraient pas vivre. Mais un éléphant que l'on suppose avec vraisemblance, contemporain du dernier cataclysme, et que l'on a trouvé dans une masse de glace, bien conservé avec ses chairs et dont la peau était recouverte d'une grande quantité de poils, a prouvé que cette espèce d'éléphans était garantie par ce moyen, du froid des climats septentrionaux qu'elle pouvait habiter et même rechercher. La découverte de cet animal a donc confirmé ce que la théorie mathématique de la Terre nous apprend, savoir que dans les révolutions qui ont changé la surface de la Terre, et détruit plusieurs espèces d'animaux et de végétaux, la figure du sphéroïde terrestre et la position de son axe de rotation sur sa surface, n'ont subi que de légères variations.

Maintenant, quelle est la cause qui a donné aux couches du sphéroïde terrestre, des formes à très peu près elliptiques et de densités croissantes de la surface au centre; qui les a disposées régulièrement autour de leur centre commun de gravité, et qui a rendu sa surface très peu différente de celle qu'elle eût prise, si elle avait été primitivement fluide? Si les diverses substances qui composent la Terre, ont eu primitivement, par l'effet d'une grande chaleur, l'état fluide; les plus denses ont dû se porter vers le centre : toutes ont pris des formes elliptiques, et la surface a été en équilibre. En se consolidant, ces couches n'ont changé que très peu de figure, et alors la Terre doit offrir présentement les phénomènes dont je viens de parler. Ce cas a été amplement discuté par les géomètres. Mais la Terre homogène dans le sens chimique, ou formée d'une seule substance dans son intérieur, pourrait encore nous présenter ces phénomènes. On conçoit, en effet, que le poids immense des couches supérieures peut augmenter considérablement la densité des couches inférieures. Jusqu'ici les géomètres n'ont point fait entrer dans leurs recherches sur la figure de la Terre, la compressibilité des substances dont elle est formée; quoique Daniel Bernoulli, dans sa pièce sur le flux et le reslux de la mer, eût déjà indiqué cette cause de l'accroissement de densité des couches du sphéroïde terrestre. J'ai pensé que l'on verrait avec quelque intérêt, l'analyse suivante de laquelle il suit qu'il est possible de satisfaire à tous les phénomènes connus, en supposant la Terre formée d'une seule substance dans son intérieur. La loi des densités que la compression donne aux couches de cette substance, n'étant pas connue, on ne peut faire à cet égard, que des hypothèses.

On sait que la densité des gaz croît proportionnellement à leur compression, lorsque la température reste la même. Mais cette loi ne paraît pas convenir aux corps liquides et solides: il est naturel de penser que ces corps résistent d'autant plus à la compression, qu'ils sont plus comprimés. C'est, en effet, ce que les expériences confirment; en sorte que le rapport de la différentielle de la pression, à la différentielle de la densité, au lieu d'être constant, comme dans les gaz, croît avec la densité. L'expression la plus simple de ce rapport supposé variable, est le produit de la densité par une constante. C'est la loi que j'ai adoptée, parce qu'elle réunit à l'avantage de représenter de la manière la plus simple, ce que nous savons sur la compression des corps, celui de se prêter facilement au calcul, dans la recherche de la figure de la Terre; mon objet dans ce calcul, n'étant que de montrer que cette manière de considérer la constitution intérieure de la Terre, peut se concilier avec tous les phénomènes qui dépendent de cette constitution, du moins si le sphéroïde terrestre a été primitivement fluide. Dans l'état solide. l'adhérence des molécules diminue extrêmement leur compression mutuelle, et elle empêcherait la masse entière de prendre la figure régulière qu'elle aurait dans l'état fluide, si elle s'en était primitivement écartée. Ainsi, dans cette hypothèse même sur la constitution de la Terre, comme dans toutes les autres, la fluidité primitive de la Terre me paraît nécessairement indiquée par la régularité de la pesanteur et de la figure de sa surface. Atora assa sol malagrafia assa se monte assa surface.

Toute l'Astronomie repose sur l'invariabilité de l'axe de rotation de la Terre à la surface du sphéroïde terrestre, et sur l'uniformité de cette rotation. La durée d'une révolution de la Terre, autour de son axe, est l'étalon du temps; il est donc bien important d'apprécier l'influence de toutes les causes qui peuvent altérer cet élément. L'axe terrestre se meut autour des pôles de l'écliptique; mais depuis l'époque où l'application du télescope aux instrumens astronomiques a donné le moyen d'observer avec précision, les latitudes terrestres, on n'a reconnu dans ces latitudes, aucune variation qui ne puisse être attribuée aux erreurs des observations; ce qui prouve que l'axe de rotation a, depuis cette époque, répondu à très peu près au même point de la surface terrestre; il paraît donc que cet axe est invariable. L'existence d'axes semblables dans les corps solides est connue depuis long-temps. On sait que chacun de ces corps a trois axes principaux rectangulaires, autour desquels il peut tourner uniformément, l'axe de rotation demeurant invariable. Mais cette propriété remarquable est-elle commune aux corps qui, comme la Terre, sont recouverts en partie, d'un fluide? La condition de l'équilibre du fluide s'ajoute alors aux conditions des axes principaux : elle change la figure de la surface, lorsque l'on fait changer l'axe de rotation. Il s'agit donc de savoir si parmi tous les changemens possibles, il en est un dans lequel l'axe de rotation et l'équilibre du fluide sont invariables. Pour cela, je fais voir que si l'on fait passer très près du centre de gravité du sphéroïde terrestre, un axe fixe autour duquel il puisse tourner librement; la mer pourra toujours prendre sur la surface du sphéroïde, un état constant d'équilibre. Je donne pour déterminer cet état, une méthode d'approximation, ordonnée suivant les puissances du rapport de la densité de la mer à la moyenne densité de la Terre, rapport qui n'étant que 1/5, rend l'approximation convergente. L'irrégularité de la profondeur de la mer et de son contour, ne permet pas d'obtenir cette approximation. Mais il suffit d'en reconnaître la possibilité, pour être assuré de l'existence d'un état d'équilibre de la mer. La position de l'axe fixe de rotation étant arbitraire; il est naturel de penser que parmi tous les changemens que l'on peut faire subir à cette position, il en est un dans lequel l'axe passe par le centre commun de gravité de la mer et du sphéroïde qu'elle recouvre, de manière que ce fluide étant en équilibre et congelé dans cet état, cet axe soit un axe principal de rotation de l'ensemble du sphéroïde terrestre et de la mer: il est visible qu'en rendant à la masse congelée, sa fluidité, l'axe sera toujours un axe invariable de la Terre entière. Je fais voir par l'analyse, qu'un tel axe est toujours possible, et je donne les équations qui déterminent sa position. En appliquant ces équations au cas où la mer recouvre en entier le sphéroïde, je parviens à ce théorème.

« Si l'on imagine la densité de chaque couche du sphéroïde terrestre, » diminuée de la densité de la mer; et si, par le centre de gravité de » ce sphéroïde imaginaire, on conçoit un axe principal de rotation de » ce sphéroïde; en faisant tourner la Terre autour de cet axe, la mer » étant en équilibre, cet axe sera l'axe principal de la Terre entière » dont le centre de gravité sera celui du sphéroïde imaginaire. »

Ainsi, la mer qui recouvre en partie le sphéroïde terrestre, nonseulement ne rend pas impossible, l'existence d'un axe principal, mais encore par sa mobilité et par les résistances que ses oscillations éprouvent, elle rendrait à la Terre, un état permanent d'équilibre, si des causes quelconques venaient à le troubler.

Si la mer était assez profonde pour recouvrir la surface du sphéroïde terrestre, en le supposant tourner successivement autour des trois axes principaux du sphéroïde imaginaire dont nous venons de parler; chacun de ces axes serait un axe principal de la Terre entière. Mais la stabilité de l'axe de rotation n'a lieu, comme dans un corps solide, que relativement aux deux axes principaux pour lesquels le moment d'inertie est un maximum ou un minimum. Il y a cependant entre un corps solide et la Terre, cette différence, savoir qu'en changeant d'axe de rotation, le corps solide ne change pas de figure; au lieu que par ce changement, la surface de la mer prend une autre figure. Les trois figures que prend cette surface, en tournant successivement avec une même vitesse angulaire de rotation, autour de chacun des trois axes de rotation du sphéroïde imaginaire, ont des rapports fort simples que je détermine; et il résulte de mon analyse, que le rayon moyen entre les rayons des trois surfaces de la mer, correspondans au même point de la surface du sphéroïde terrestre, est égal au rayon de la surface de la mer en équilibre sur

ce sphéroïde privé de tout mouvement de rotation.

J'ai discuté dans le cinquième livre, l'influence des causes intérieures telles que les volcans, les tremblemens de terre, les vents, les courans de la mer, etc., sur la durée de la rotation de la Terre; et j'ai fait voir au moyen du principe des aires, que cette influence est insensible, et qu'il faudrait pour produire un effet sensible, qu'en vertu de ces causes, des masses considérables eussent été transportées à de grandes distances; ce qui n'a point eu lieu depuis les temps historiques. Mais il existe une cause intérieure d'altération de la durée du jour, que l'on n'a point encore considérée, et qui, vu l'importance de cet élément, mérite une discussion spéciale. Cette cause est la chaleur du sphéroïde terrestre. Si, comme tout porte à le croire, la Terre entière a été primitivement fluide; ses dimensions ont diminué successivement avec sa température: sa vitesse angulaire de rotation a augmenté graduellement, et elle continuera de s'accroître, jusqu'à ce que la Terre soit parvenue à l'état constant de température moyenne de l'espace où elle se meut. Pour avoir une idée juste de cet accroissement de vitesse angulaire, que l'on imagine dans un espace d'une température donnée, un globe de matière homogène, tournant sur son axe dans un jour. Si l'on transporte ce globe dans un espace dont la température soit moindre d'un degré centésimal, et si l'on suppose que sa rotation ne soit altérée, ni par la résistance d'un milieu, ni par le frottement; ses dimensions diminueront par la diminution de la température; et lorsqu'à la longue, il aura pris

la température du nouvel espace, son rayon sera diminué d'une quantité que je supposerai être un cent-millième, ce qui a lieu à peu près pour un globe de verre, et ce que l'on peut admettre pour la Terre. Le poids de la chaleur a été inappréciable dans toutes les expériences que l'on a faites pour le mesurer; elle paraît donc, comme la lumière, n'apporter aucune variation sensible dans la masse des corps; ainsi, dans le nouvel espace, deux choses peuvent être supposées les mêmes que dans le premier, savoir, la masse du globe, et la somme des aires décrites dans un temps donné, par chacune de ses molécules rapportées au plan de son équateur. Les molécules se rapprochent du centre du globe, d'un cent-millième de leur distance à ce point. L'aire qu'elles décrivent sur le plan de l'équateur étant proportionnelle au carré de cette distance, diminuerait donc à fort peu près d'un cinquante-millième, si la vitesse angulaire de rotation n'augmentait pas ; d'où il suit que pour la constance de la somme des aires dans un temps donné, l'accroissement de cette vitesse, et par conséquent la diminution de la durée de la rotation doivent être d'un cinquante-millième: telle est donc la diminution finale de cette durée. Mais avant de parvenir à son état final, la température du globe diminue sans cesse, et plus lentement au centre qu'à la surface; en sorte que par les observations de cette diminution, comparées à la théorie de la chaleur, on pourrait déterminer l'époque où le globe a été transporté dans le nouvel espace. La Terre paraît être dans un état semblable. Cela résulte des observations thermométriques faites dans des mines profondes, et qui indiquent un accroissement de chaleur, très sensible à mesure que l'on pénètre dans l'intérieur de la Terre. La moyenne des accroissemens observés paraît être d'un degré centésimal pour un enfoncement de 32 mètres; mais un très grand nombre d'observations fera connaître exactement sa valeur qui peut n'être pas la même dans tous les climats (1) nomeonolne au moq , lamesone

<sup>(1)</sup> Imaginons au-dessous d'un plateau d'une grande étendue ét à la profondeur d'environ trois mille mètres, un vaste réservoir d'eau entretenue par les éaux pluviales. Elles acquièrent à cette profondeur, par la chaleur terrestre, une température à peu près égale à celle de l'eau bouillante. Supposons ensuite que par la pression des colonnes d'eau, adjacentes, ou par les vapeurs qui s'élèvent du réservoir, les eaux remontent jusqu'à la hauteur de la partie inférieure du plateau d'où elles s'éconlent ensuite; elles formeront une source d'eau chaude imprégnée des substances solubles des couches qu'elle aura traversées; ce qui donne une explication vraisemblable des eaux thermales.

Il était nécessaire pour avoir l'accroissement de la rotation de la Terre, de connaître la loi de diminution de la chaleur, du centre à la surface. C'est ce que j'ai fait pour un globe primitivement échauffé d'une manière quelconque, et de plus soumis à l'action échauffante d'une cause extérieure. La loi dont il s'agit, que j'ai publiée en 1819 dans le recueil de la Connaissance des Tems, et que M. Poisson à confirmée depuis par une savante analyse, est représentée par une suite infinie de termes qui ont pour facteurs, des quantités constantes successivement plus petites que l'unité, et dont les exposans croissent proportionnellement au temps. La longueur du temps fait ainsi disparaître ces termes, les uns après les autres; en sorte qu'avant l'établissement de la température finale, il n'y a de sensible, qu'un seul de ces termes qui produit l'accroissement de température dans l'intérieur du globe. Je suppose la Terre parvenue à cet état dont elle est, peut-être, encore fort éloignée. Mais ne cherchant ici qu'à présenter un aperçu de l'influence de la diminution de sa chaleur intérieure, sur la durée du jour; j'ai adopté cette hypothèse, et j'en ai conclu l'accroissement de la vitesse de rotation. Il fallait pour réduire cet accroissement en nombres, déterminer numériquement deux constantes arbitraires dépendantes, l'une, de la faculté conductrice de la Terre pour la chaleur, l'autre, de l'élévation de température de sa couche superficielle, au-dessus de la température de l'espace qui l'environne. J'ai déterminé la première constante, au moyen des variations de la chaleur annuelle à diverses profondeurs; et pour cela, j'ai fait usage des expériences de M. de Saussure, que ce savant a citées dans le n° 1422 de son voyage dans les Alpes. Dans ces expériences, la variation annuelle de la chaleur à la surface, a été réduite à un douzième, à la profondeur de 9m,6. J'ai supposé ensuite, que dans nos mines, l'accroissement de la chaleur est d'un degré centésimal, pour un enfoncement de 32 mètres; et que la dilatation linéaire des couches terrestres est d'un cent-millième pour chaque degré de température. Je trouve au moyen de ces données, que la durée du jour n'a pas augmenté d'un demi-centième de seconde centésimale, depuis deux mille ans ; ce qui est dû principalement à la grandeur du rayon terrestre.

A la vérité, j'ai supposé la Terre homogène, et il est incontestable que les densités de ses couches croissent de la surface au centre. Mais on doit observer ici que la quantité de chaleur et son mouvement seraient

les mêrces dans une substance hétérogène, si dans les parties correspondantes des deux corps, la chaleur et la propriété de la conduire étaient les mêmes. La matière peut être ici considérée comme un véhicule de la chaleur qui peut être le même dans des substances de densités différentes. Il n'en est pas ainsi des propriétés dynamiques qui dépendent de la masse des molécules. Ainsi, nous pouvons dans cet aperçu des effets de la chaleur terrestre sur la durée du jour, étendre à la Terre hétérogène, les données sur la chaleur, relatives à la Terre homogène. On trouve ainsi que l'accroissement de densité des couches du sphéroïde terrestre, diminue l'effet de la chaleur sur la durée du jour, effet qui depuis Hipparque, n'a pas augmenté cette durée, de  $\frac{1}{300}$ .

Le terme dont dépend l'accroissement de la chaleur intérieure de la Terre, n'ajoute pas maintenant un cinquième de degré, à la température moyenne de sa surface. Son anéantissement, qu'une très longue suite de siècles doit produire, ne fera donc disparaître aucune des espèces d'êtres organisés, actuellement existantes, du moins, tant que la chaleur propre du Soleil et sa distance à la Terre n'éprouveront point d'altération sensible.

Au reste, je suis fort éloigné de penser que les suppositions précédentes sont dans la nature : d'ailleurs, les valeurs observées des deux constantes dont j'ai parlé, dépendent de la nature du sol qui dans diverses contrées, n'a pas les mêmes qualités relatives à la chaleur. Mais l'aperçu que je viens de présenter, suffit pour faire voir que les phénomènes observés sur la chaleur de la Terre, peuvent se concilier avec le résultat que j'ai déduit de la comparaison de la théorie des inégalités séculaires de la Lune, avec les observations des anciennes éclipses, savoir que depuis Hipparque, la durée du jour n'a pas varié d'un centième de seconde.

Le formule (5) du ce et dutroisième livre devient ainsi as  $\sqrt{1}$  of  $\sqrt{1}$  service  $\sqrt{1}$   $\sqrt{1}$ 

## chapitre II. CHAPITRE

De la figure de la Terre.

2. La figure de chaque couche du sphéroïde terrestre étant à fort peu près sphérique; j'exprimerai comme dans le troisième livre de la Mécanique céleste, son rayon par a.(1+ay), a étant un très petit coefficient constant. Je désignerai par p la densité de cette couche, p étant fonction de a. Je nommerai V la somme des quotiens de chaque molécule du sphéroïde terrestre, divisée par sa distance à un point extérieur attiré; r étant la distance de ce point à l'origine des rayons terrestres, placée très près du centre de gravité de la Terre. Enfin, je nommerai \(\mu\) le cosinus de l'angle que r fait avec une droite invariable sur la surface du sphéroïde, et que je prendrai pour son axe; et je nommerai \(\omega\) l'angle que le plan passant par cet axe et par r, forme avec un méridien fixe sur la surface du sphéroïde. On peut supposer y développé dans une série de cette forme,

susb inp los inb y = Y(1) + Y(1) + etc.;

Y<sup>(n)</sup> étant une fonction de a, et de  $\mu$ ,  $\sqrt{1-\mu^2}$ . sin  $\omega$ ,  $\sqrt{1-\mu^2}$ . cos  $\omega$ , fonction rationnelle et entière relativement à ces trois dernières quantités, et telle que l'on a généralement

$$0 = \left\{ \frac{d \cdot \left[ (1 - \mu^2) \left( \frac{dY^{(1)}}{d\mu} \right) \right]}{d\mu} \right\} + \left( \frac{ddY^{(1)}}{d\omega^2} \right) + i \cdot i + 1 \cdot Y^{(1)}$$

La formule (5) du n° 14 du troisième livre devient ainsi

$$V = \frac{4\pi}{3r} \int \rho \cdot d \cdot a^3 + 4\alpha \pi \int \rho \cdot d \cdot \left( \frac{a^4 Y^{(1)}}{3r^2} + \frac{a^5 Y^{(2)}}{5 \cdot r^3} + \frac{a^6 Y^{(3)}}{7r^4} + \text{etc.} \right);$$

# étant le rapport de la circonférence au diamètre : les différentielles et les intégrales sont relatives à la variable a, et celles-ci sont prises depuis a nul, jusqu'à sa valeur à la surface du sphéroïde, valeur que je prendrai pour l'unité.

Concevons maintenant la mer en équilibre sur ce sphéroïde doué d'un mouvement de rotation. Soit  $\alpha \varphi$  le rapport de la force centrifuge à la pesanteur, à l'équateur; et désignons par V' la somme de toutes les molécules de la mer, divisées par leurs distances respectives au point attiré. Si l'on suppose ce point à la surface de la mer; on aura par les n° 23 et 29 du troisième livre, pour l'équation de l'équilibre de la mer,

constante = 
$$\frac{4}{5r}$$
,  $\pi$ .  $\int \rho d \cdot a^3 + 4\alpha \pi$ .  $\int \rho d \cdot \left(\frac{a^4 Y^{(1)}}{3r^2} + \frac{a^5 Y^{(2)}}{5r^3} + \frac{a^6 Y^{(3)}}{7r^4} + \text{etc.}\right)$   
+  $V' - \frac{\alpha \rho r^2}{2} \cdot \left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^3$ ; (1).

Pour déterminer V', je supposerai que le rayon mené de l'origine des rayons terrestres, à la surface de la mer, soit  $1 + \alpha y + \alpha y'$ , y étant la valeur de y à la surface du sphéroïde :  $\alpha y'$  sera à très peu près la profondeur de la mer. Je supposerai ensuite

$$y' = Y'^{(0)} + Y'^{(1)} + Y'^{(3)} + Y'^{(3)} + \text{etc.};$$

 $Y^{(i)}$  étant une fonction rationnelle et entière de  $\mu$ ,  $\sqrt{1-\mu^2}$  sin  $\omega$ ,  $\sqrt{1-\mu^2}$  cos  $\omega$ , assujettie à la même équation aux différences partielles que  $Y^{(i)}$ . On peut considérer la mer, comme égale à un sphéroïde dont le rayon est  $1 + \alpha y + \alpha y'$ , moins un second sphéroïde dont le rayon est  $1 + \alpha y$ , plus la partie de ce sphéroïde, qui se relève au-dessus du premier, et où, par conséquent,  $\alpha y'$  est négatif. La somme des molécules du premier sphéroïde, divisées par leurs distances au point attiré, est par le n° 11, du troisième livre, en prenant pour unité, la densité de la mer,

$$\frac{4\pi}{3r} + 4\alpha\pi \cdot \left(\frac{Y'^{(0)}}{r} + \frac{(\overline{Y}^{(1)} + Y'^{(1)})}{3r^2} + \frac{(\overline{Y}^{(2)} + Y'^{(2)})}{5r^3} + \text{etc.}\right),$$

 $\overline{Y}^{(1)}$ ,  $\overline{Y}^{(2)}$ , etc., étant ce que deviennent  $Y^{(1)}$ ,  $Y^{(2)}$ , etc., à la surface du sphéroïde terrestre. La même somme relative au second sphéroïde est

$$\frac{4\pi}{3r} + 4\alpha\pi \cdot \left(\frac{\overline{Y}^{(1)}}{3r^2} + \frac{\overline{Y}^{(2)}}{5r^3} + \frac{\overline{Y}^{(3)}}{7r^4} + \text{etc.}\right);$$

la différence de ces deux quantités est

$$40.\pi \cdot \left(\frac{Y'^{(0)}}{r} + \frac{Y'^{(1)}}{3r^2} + \frac{Y'^{(2)}}{5r^3} + \frac{Y'^{(3)}}{7r^4} + \text{ etc.}\right);$$

en nommant donc V" la somme des molécules du second sphéroïde, qui se relèvent au-dessus du premier, et divisées par leurs distances respectives au point attiré, on aura

$$V' = V'' + 4\alpha\pi \cdot \left(\frac{Y'^{(0)}}{r} + \frac{Y^{1(1)}}{3r^2} + \frac{Y'^{(2)}}{5r^3} + \text{etc.}\right)$$

L'équation précédente de l'équilibre de la mer deviendra ainsi

const. = 
$$\frac{4\pi}{3r} \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^3 + 4\alpha \pi \cdot \int \rho \cdot d \cdot \left(\frac{a^4 Y^{(1)}}{3r^2} + \frac{a^5 Y^{(2)}}{5r^3} + \frac{a^5 Y^{(3)}}{7r^4} + \text{etc.}\right)$$

$$+ 4\alpha \pi \cdot \left(\frac{Y'^{(0)}}{r} + \frac{Y'^{(1)}}{3r^2} + \frac{Y'^{(2)}}{5r^3} + \frac{Y'^{(3)}}{7r^4} + \text{etc.}\right), (2)$$

$$+ V'' - \frac{\alpha \varphi}{2} \cdot r^2 \cdot \left(u^2 - \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^3,$$

r devant être supposé après les intégrations, égal à  $1 + \alpha y + \alpha y'$ , et par conséquent égal à l'unité, dans les termes multipliés par  $\alpha$ ; puisqu'on néglige les termes de l'ordre  $\alpha^2$ .

Cette équation a cela de remarquable, savoir que la différentielle de son second membre, prise par rapport à r, et divisée par -dr, est l'expression de la pesanteur, comme il résulte du n° 33 du troisième livre; en nommant donc p la pesanteur, on aura

$$p = \frac{4\pi}{5r^2} \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^3 + 4\alpha\pi \cdot \int \rho \cdot d \cdot \left(\frac{2a^4 \cdot Y^{(1)}}{5r^3} + \frac{3a^5 \cdot Y^{(2)}}{5r^4} + \text{etc.}\right) + 4\alpha\pi \cdot \left(\frac{Y'^{(0)}}{r^2} + \frac{2Y'^{(1)}}{3r^3} + \frac{3Y'^{(2)}}{5r^4} + \text{etc.}\right) - \left(\frac{dV''}{dr}\right) + \alpha\phi \cdot r \cdot \left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \int \rho \cdot d \cdot a^3.$$
(3)

On a par le n° 10 du troisième livre, à la surface de la mer,

spheroide terrestre. I. (a) 
$$\frac{dV''}{dr} + \frac{1}{2}V''$$
. (a) I substeed the spheroide est

Cette équation remarquable étant très utile pour ce qui va suivre; je vais en rappeler ici la démonstration.

Si l'on conçoit une sphère du rayon a, et dont la densité soit exprimée par l'unité; la somme de ses molécules divisées par leurs distances respectives à un point extérieur attiré dont r est la distance à son centre,

sera par le n° 12 du premier livre, la masse de la sphère, divisée par r; en désignant donc par V, cette somme, on aura

$$V = \frac{4}{5}\pi \cdot \frac{a^3}{r}.$$

Maintenant, si l'on imagine une molécule dm très voisine de la surface de la sphère, et à la distance a' de son centre; sa distance au point attiré sera

$$\sqrt{r^2 - 2a'r \cdot \cos \gamma + a'^2},$$

 $\gamma$  étant l'angle compris entre r et a'. Le quotient de cette molécule divisée par sa distance au point attiré, sera

$$\frac{dm}{\sqrt{r^2-2a'r\cdot\cos\gamma+a'^2}}$$

Nommons V ce quotient; on aura

$$\left(\frac{dV}{dr}\right) = -\frac{dm.(r-a'.\cos\gamma)}{(r^2 - 2a'r.\cos\gamma + a'^2)^{\frac{3}{2}}};$$

ce qui donne

$$r\left(\frac{d\mathbf{V}}{dr}\right) + \frac{1}{2}\mathbf{V} = -\frac{dm.(r^2 - a'^2)}{2.\left[(r - a')^2 + 2a'r.(1 - \cos\gamma)\right]^{\frac{3}{2}}}$$

Si le point attiré est très près de la surface de la sphère, ainsi que la molécule dm, alors  $r^2 - a'^2$  est une quantité insensible que l'on peut négliger; et l'équation précédente devient

$$r\left(\frac{dV}{dr}\right) + \frac{1}{2}V = 0.$$

La même équation a lieu pour d'autres molécules situées comme dm, très près de la surface de la sphère; en nommant donc V'' la somme des V relatifs à ces diverses molécules, on aura

$$r\left(\frac{dV''}{dr}\right) + \frac{1}{2} \cdot V'' = 0;$$

et r étant très peu différent de a, on aura l'équation (a)

$$a.\left(\frac{dV''}{dr}\right) + \frac{1}{2}V'' = 0.$$

Le raisonnement précédent cesse d'avoir lieu, lorsque le point attiré est très près de la molécule dm; car alors  $\cos \gamma$  diffère très peu de l'unité, et la fonction

$$\frac{-dm \cdot (r^2 - a'^2)}{2 \cdot \left[ (r - a')^2 + 2a'r \cdot (1 - \cos \gamma) \right]^{\frac{3}{2}}}; \tag{f}$$

MÉCAN. CÉL. Tome V.

devient très grande par la petitesse de son diviseur, à moins que la molécule dm ne décroisse à mesure qu'elle approche du point attiré: si, par exemple, ce décroissement, à partir du contact de la molécule, avait pour facteur le carré  $r^2 - 2a^i r \cdot \cos \gamma + a'^2$  de la distance de ces deux points, la fonction précédente resterait toujours insensible.

Concevons un sphéroide très peu différent d'une sphère, et supposons le point attiré, à sa surface. Imaginons à ce point une sphère intérieure au sphéroïde, tangente à sa surface, et d'un rayon a très peu différent du rayon du sphéroïde. Alors, si l'on désigne par V'' la somme des molécules de l'excès du sphéroïde sur la sphère, divisées par leurs distances au point attiré; si l'on fixe l'origine des r au centre de cette sphère, et si dm est une de ces molécules; l'intégrale de la fonction (f) prise par rapport au système de ces molécules, pourra être supposée nulle; parce que les molécules dm sont nulles au point de contact, et que leur expression près de ce point, a pour facteur, le carré de leur distance à ce point. L'équation (a) subsiste donc pour ce point. Relativement à la sphère tangente, on a

$$r.\left(\frac{dV}{dr}\right) = -\frac{4}{3}\pi \cdot \frac{a^3}{r},$$

en supposant donc que V' exprime la somme de toutes les molécules du sphéroïde, divisées par leurs distances au point attiré, ce qui donne V' = V + V''; on aura en supposant le point attiré, au point de contact de la sphère et du sphéroïde,

$$a\left(\frac{dV'}{dr}\right) + \frac{1}{2}V' = -\frac{2}{3}\pi \cdot a^2;$$
 (b)

e'est l'équation que j'ai donnée dans le n° 10 du troisième livre. Ici l'origine de r est au centre de la sphère tangente. Fixons cette origine, à un point quelconque très proche du centre de gravité du sphéroïde, et désignons par  $a.(1+\alpha r)$  le rayon de ce sphéroïde,  $\alpha$  étant un très petit coefficient constant. L'attraction de ce sphéroïde dirigée vers l'origine de r est  $-\left(\frac{dV'}{dr}\right)$ , et il est facile de voir qu'elle est aux quantités près de l'ordre  $\alpha^2$ , la même, quelle que soit cette origine, pourvu que cette origine ne s'écarte que d'une quantité de l'ordre  $\alpha$ , du centre de gravité du sphéroïde; car cette attraction composée avec une force qui lui est

perpendiculaire et de l'ordre  $\alpha$ , produit la pesanteur totale, dont elle ne diffère par conséquent, que d'une quantité de l'ordre  $\alpha$ . Ainsi, l'équation précédente (b) subsiste en fixant l'origine de r, à un point quelconque situé fort près du centre de gravité du sphéroïde.

Telle est la démonstration que j'ai donnée de cette équation, dans l'endroit cité de la Mécanique céleste. Quelques géomètres ne l'ayant pas bien saisie, l'ont jugée inexacte. Lagrange, dans le tome VIII du Journal de l'Ecole Polytechnique, a démontré cette équation, par une analyse à peu près semblable à celle qui me l'avait fait découvrir (Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1775, page 83). C'est pour simplifier cette matière, que j'ai préféré de donner dans la Mécanique céleste, la démonstration précédente.

Si le point attiré est élevé d'une quantité  $\alpha ay'$  au-dessus de la surface du sphéroïde; V' étant de la forme  $\frac{4}{3}\pi \cdot \frac{a^3}{r} + \alpha R$ , il ne variera par ce déplacement du point, et en négligeant les quantités de l'ordre  $\alpha^2$ , que de la quantité  $-\frac{4}{3}\pi \cdot a^2\alpha \cdot y'$ . La différence partielle  $a\left(\frac{dV}{dr}\right)$  variera de la quantité  $\frac{8}{3}\pi \cdot a^2 \cdot ay'$ ; la variation du premier membre de l'équation (b) sera donc  $2\pi \cdot a^2 \cdot ay'$ ; et cette équation deviendra

$$a\left(\frac{dV'}{dr}\right) + \frac{1}{2}V' = -\frac{2\pi \cdot a^2}{3} + 2a^2\pi \cdot ay'.$$

Mais l'équation (a) subsistera toujours; parce que V" étant de l'ordre  $\alpha$ , ce déplacement ne peut y produire que des quantités de l'ordre  $\alpha^2$ .

Cela posé, si l'on substitue dans les équations (2) et (3),  $1 + \alpha y + \alpha y^{t}$ , au lieu de r, et si dans l'équation (3), on substitue  $-\frac{1}{2}V''$  au lieu de  $\left(\frac{dV''}{dr}\right)$ ; elles deviendront, en négligeant les termes de l'ordre  $\alpha^{*}$ ,

const. = 
$$a\bar{y} + ay' - \frac{3x}{f_{\rho}.d.a^3} \cdot f_{\rho}.d.(\frac{a^4Y^{(1)}}{3} + \frac{a^5Y^{(2)}}{5} + \frac{a^6Y^{(3)}}{7} + \text{etc.})$$
  
 $-\frac{3x}{f_{\rho}.d.a^3} \cdot (Y^{\rho(0)} + \frac{Y^{(1)}}{3} + \frac{Y^{(2)}}{5} + \frac{Y^{(3)}}{7} + \text{etc.})$   
 $-\frac{V''}{\frac{4}{3}\pi \cdot f_{\rho}.d.a^3} + \frac{a\phi}{2} \cdot (u^2 - \frac{1}{3});$  (4)

$$p = \frac{4}{5}\pi \cdot (1 - 2\alpha y - 2\alpha y') \cdot f \rho \cdot d \cdot a^{3} + 4\alpha \pi \cdot f \rho \cdot d \cdot \left(\frac{2^{4}Y^{(1)}}{3} + \frac{3a^{5}Y^{(2)}}{5} + \frac{4a^{6}Y^{(3)}}{7} + \text{etc.}\right)$$

$$+ \frac{1}{2}V'' + \alpha \phi \cdot \left(\mu^{2} - \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot f \rho \cdot d \cdot a^{3}$$

$$+ 4\alpha \pi \cdot \left(Y'^{(0)} + \frac{2Y'^{(1)}}{3} + \frac{3Y'^{(2)}}{5} + \text{etc.}\right). \tag{5}$$

Si l'on ajoute cette dernière équation, à la précédente multipliée par  $\frac{2}{5}\pi \int \rho .d.a^3$ ; on aura

$$p = \text{const.} - 2\alpha \pi . (\bar{y} + \gamma') . \int \rho . d. a^3 + 2\alpha \pi . \int \rho . d. (a^4 Y^{(1)} + a^5 Y^{(2)} + a^6 Y^{(3)} + \text{ etc.})$$

$$+2\alpha\pi.y'+\frac{5}{4}\alpha\varphi.(\mu^2-\frac{1}{3}).\frac{4}{3}\pi.f\rho.d.a^3.$$
 (6)

Si l'on suppose la Terre homogène, ou ρ constant, on aura

$$p = \text{constante} - 2\alpha\pi \cdot (\rho - 1) \cdot y' + \frac{5}{4} \alpha \phi \cdot (\mu^2 - \frac{1}{3}) \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot \rho;$$

et l'on doit observer que  $\frac{4}{3}\pi \cdot \rho$  est à très peu près la pesanteur à l'équateur. On a donc dans le cas où la mer a la même densité que le sphéroïde terrestre, ce qui donne  $\rho = 1$ ,

$$p = P \cdot (1 + \frac{5}{4} \alpha \varphi \cdot \mu^2),$$

P étant la pesanteur à l'équateur.

Cette valeur de p subsisterait encore, dans le cas où des plateaux d'une densité quelconque, et de hautes montagnes recouvriraient les continens. Ces corps ajouteraient à l'équation (1), un terme V''' qui serait la somme de leurs molécules divisée par leurs distances respectives au point attiré. En supposant ce point à la surface de la mer, on aura

$$\left(\frac{dV''}{dr}\right) + \frac{1}{2}V''' = 0.$$

Ainsi V''' disparaîtrait de l'expression de la pesanteur p, par le même procédé qui a fait disparaître V'' de cette expression : p aurait donc encore la valeur précédente : le terme V''' changerait donc la figure de

la mer, sans altérer la loi de la pesanteur. Il est bien remarquable que cette loi soit indépendante de cette figure qui peut avoir une infinité de formes, dépendantes de la manière dont la mer recouvre en partie, le sphéroïde terrestre, et des irrégularités de la surface des continens.

3. Pour déterminer la figure de la mer, lorsque celle du sphéroïde terrestre est donnée; la méthode la plus simple consiste à ordonner les approximations suivant les puissances du rapport de la densité de la mer, à la moyenne densité de la Terre, rapport égal à  $\frac{2}{11}$  à fort peu près. Nous allons donc considérer d'abord, la figure de la mer, en négligeant ce rapport, ou en supposant que la mer est un fluide infiniment rare. Cela revient à négliger dans l'équation (4), les termes qui ont  $\int \rho \, d \, d \, a^3$  au dénominateur, et qui n'ont pas  $\rho$  au numérateur. Cette équation donne alors en n'y négligeant, pour plus d'exactitude, que le terme dépendant de  $\nabla''$ ,

$$\alpha y' = \text{const.} - \alpha y + \frac{3\alpha}{f_{\rho}.d.a^{3}} \cdot \int \rho \cdot d. \left( \frac{a^{4}Y^{(1)}}{3} + \frac{a^{5}Y^{(2)}}{5} + \frac{a^{6}Y^{(3)}}{7} + \text{etc.} \right) + \frac{3\alpha}{f_{\rho}.d.a^{3}} \cdot \left( \frac{Y'^{(1)}}{3} + \frac{Y'^{(2)}}{5} + \frac{Y'^{(3)}}{7} + \text{etc.} \right) - \frac{\alpha \phi}{2} \cdot \left( \mu^{2} - \frac{1}{3} \right).$$

En substituant  $\overline{Y}^{(1)} + \overline{Y}^{(2)} + \text{etc. pour } \overline{y}$ , et  $Y'^{(2)} + Y'^{(1)} + Y'^{(2)} + \text{etc.}$  pour y', et comparant les termes semblables; on aura généralement

$$Y'^{(i)} \cdot \left( \mathbf{I} - \frac{3}{2i+1 \cdot (\rho \cdot d \cdot a^3)} \right) = -\overline{Y}^{(i)} + \frac{3 \cdot f_{\rho} \cdot d \cdot (a^{i+3}Y^{(i)})}{2i+1 \cdot (\rho \cdot d \cdot a^3)}$$

Dans le cas de i=2, il faut ajouter au second membre de cette équation, le terme  $-\frac{\alpha\varphi}{2} \cdot \left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right)$ .

L'équation (6) dans la quelle rien n'est négligé, donnera ensuite la pesanteur p à la surface de la mer.

Les expériences du pendule font voir que  $\overline{Y}^{(1)}$ ,  $\overline{Y}^{(3)}$ ,  $\overline{Y}^{(4)}$ , etc., sont des quantités très petites relativement à  $\overline{Y}^{(s)}$ , et que cette dernière fonction se réduit à fort peu près à  $-\overline{h}$ .  $\left(\mu^{s}-\frac{1}{3}\right)$ ,  $\overline{h}$  étant une constante ; ce qui donne aux couches du sphéroïde terrestre, la figure d'un ellipsoïde de révolution. Examinons donc ce cas particulièrement. On a alors par

ce qui précède, en faisant  $Y^{(2)}$  égal à  $-h\left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right)$ ,

$$\mathbf{Y}^{\prime(a)}.\left(\mathbf{I} - \frac{3}{5. f_{\theta}.d.a^{3}}\right) = \left(\overline{h} - \frac{3f_{\theta}.d.(a^{5}h)}{5. f_{\theta}.d.a^{3}} - \frac{\varphi}{2}\right).\left(\mu^{2} - \frac{1}{2}\right).$$

Ainsi en faisant

$$h' = \frac{\frac{\varphi}{2} - \bar{h} + \frac{3 \cdot f_{\rho} \cdot d \cdot (a^{5}h)}{5 \cdot f_{\rho} \cdot d \cdot a^{3}}}{1 - \frac{3}{5 \cdot f_{\rho} \cdot d \cdot a^{3}}};$$

on aura

$$\alpha y' = \alpha l - \alpha h' \mu^2;$$

l étant une constante. Il est facile de voir que h' serait nul si, la mer étant anéantie, la surface du sphéroïde était en équilibre, en devenant fluide. Si donc cette surface est moins aplatie que dans ce cas, h' sera positif, et la mer recouvrira l'équateur du sphéroïde. Sa profondeur sera  $al-ah'.\mu^2$ ; et si elle n'a pas un volume suffisant pour recouvrir le sphéroïde entier, elle s'étendra vers les deux pôles, à des latitudes égales. Soit  $\varepsilon$  le sinus de ces latitudes; la profondeur de la mer étant nulle à ces points; on aura

$$al = ah' \cdot \epsilon^2$$
;

et l'origine des rayons terrestres étant supposée au centre de gravité du sphéroïde terrestre, ce qui rend  $\overline{Y}^{(1)}$  et  $Y'^{(1)}$  nuls, la profondeur de la mer sera

$$ah'.(\epsilon^2-\mu^2).$$

Le volume de la mer sera  $\frac{8}{3} \alpha \pi \cdot h' \epsilon^3$ ; ce volume étant donné fera donc connaître  $\epsilon$ . l'équation (6) combinée avec l'expression précédente de h', donnera pour l'expression de la pesanteur à la surface de la mer,

$$P.\left\{1+\left[\frac{5}{2}\alpha\phi-\alpha(\bar{h}+h')\right].\mu^{2}\right\};$$

P étant cette pesanteur à l'équateur.

Si la surface du sphéroïde a un aplatissement plus grand que celui qui convient à son équilibre, en la supposant fluide; h' devient négatif, et alors, si la mer n'a pas un volume suffisant pour recouvrir le sphéroïde entier, elle se portera vers les deux pôles, et elle formera deux

mers distinctes, dont les masses pourront être dans un rapport quelconque. En faisant h' = -g, g étant positif, la profondeur de la mer boréale sera

$$ag.(\mu^2-\epsilon^2);$$

ε étant le sinus de la latitude des bords de cette mer. La profondeur de la mer située vers le pôle austral sera

$$\alpha g.(\mu^2-\epsilon'^2);$$

ε' étant ce que devient pour cette mer, la quantité ε. Les masses des deux mers seront respectivement

$$\frac{2\alpha\pi.g}{3}.(1-\epsilon)^2.(1+2\epsilon);\ \frac{2\alpha\pi g}{3}.(1-\epsilon')^2.(1+2\epsilon');$$

et la pesanteur P à leur surface sera, en désignant par P, la pesanteur aux pôles,

$$P.\left\{1-\left[\frac{5}{4}\alpha\varphi-\alpha(\overline{h}-g)\right]\cdot\left(1-\mu^{2}\right)\right\}.$$

Pour avoir une seconde approximation, il faut déterminer la valeur analytique de la fonction  $\frac{V''}{\frac{4}{3}\pi \cdot f_{l} \cdot d \cdot a^{3}}$  de l'équation (4), et l'ajouter à

l'expression de ay'. Or, on a

$$V'' = \alpha \cdot \int \frac{y_i \cdot d\mu' \cdot d\omega'}{\sqrt{2 \cdot (1 - \cos \cdot \gamma)}},$$

 $\gamma$ , étant ce que devient l'expression trouvée par une première approximation pour  $\gamma'$ , et dans laquelle on change  $\mu$  en  $\mu'$ ,  $\omega$  en  $\omega'$ ;  $\mu'$  et  $\omega'$  étant relatifs au point attirant, tandis que  $\mu$  et  $\omega$  se rapportent au point attiré.  $\gamma$  est l'angle compris entre les rayons terrestres menés à ces deux points, en sorte que l'on a

$$\cos \gamma = \mu \mu' + \sqrt{1 - \mu^2} \cdot \sqrt{1 - \mu'^2} \cdot \cos (\omega' - \omega).$$

L'intégrale précédente est relative à la surface entière des continens et des îles. Développons le radical

$$\frac{1}{\sqrt{r^2-2r.\cos\gamma+1}}$$

suivant les puissances de  $\frac{1}{r}$ . En nommant  $P^{(i)}$  le coefficient de  $\frac{1}{r^{1+1}}$  dans ce développement, on aura par le n° 23 du troisième livre, en supposant  $\lambda = \cos \gamma$ ,

$$\mathbf{P}^{(i)} = \frac{1.3.5...2\overline{i-1}}{1.2.3...i} \cdot \left(\lambda^{i} - \frac{i.\overline{i-1}}{2.2\overline{i-1}}, \lambda^{i-3} + \frac{i.\overline{i-1}.\overline{i-2}.\overline{i-3}}{2.4.2\overline{i-1}.2\overline{1-3}}\lambda^{i-4} - \text{etc.}\right).$$

Si l'on fait  $\frac{1}{r} = x$ ; P<sup>(i)</sup> devient le coefficient de  $x^i$ , dans le développe-

ment de  $(1-2\lambda x+x^2)^{-\frac{1}{2}}$ , fonction que l'on peut mettre sous cette forme

$$\frac{1}{\sqrt{1-\lambda^2}\cdot\sqrt{1+\frac{(x-\lambda)^2}{1-\lambda^2}}}.$$

Le coefficient de xi dans le développement de

 $\frac{1}{\sqrt{1+\frac{(x-\lambda)^2}{1-\lambda^2}}}$ 

est égal à

$$\frac{d^{i}}{\sqrt{1+\frac{(x-\lambda)^{2}}{1-\lambda^{2}}}},$$

$$\frac{1}{1,2,3,\ldots,i,dx^{i}}$$

x étant supposé nul après les différentiations. J'ai fait voir dans le n° 38 de la Théorie analytique des Probabilités, que l'on a,  $\zeta$  restant quelconque après les différentiations,

$$\frac{d^{i} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^{2}}}}{\frac{1}{1.1.3...i.d\zeta^{i}}} = \frac{1}{\pi \cdot (1-\zeta^{2})^{i+\frac{1}{2}}} \cdot \int d\varpi (\zeta + \cos\varpi)^{i};$$

l'intégrale étant prise depuis & nul jusqu'à & à la demi-circonférence 7. En faisant donc

$$\frac{x-\lambda}{\sqrt{1-\lambda^2}} = \zeta \cdot \sqrt{-1},$$

lorsque x est nul après les différentiations, ce qui donne mon el mais s

de la methode générale que j'ai la que dans les Mémoires de l'Academic des Sciences pour l'année 
$$\mathbf{r}$$
;  $\mathbf{r} = \lambda$  i développée avec étentine dans ma Théorie malytique des frobblités, que dans le cas de  $\mathbf{r}$ , un très grand nombre, á lagè  $\mathbf{r} = \mathbf{r}$  un  $\mathbf{r} = \mathbf{r}$  de  $\mathbf$ 

$$\frac{1}{\pi \cdot (\sqrt{-1})^{i}} \cdot f d\varpi \cdot (\lambda \sqrt{-1} + \sqrt{1 - \lambda^{a}} \cdot \cos \varpi)^{i}; \qquad (f)$$

Dans le cas de  $\lambda = 1$ , cette fonction se réduit à l'unité, comme cela doit être; car  $P^{(i)}$  devient alors le coefficient de  $x^i$  dans le développement de  $\frac{1}{1-x}$ . Mais pour peu que  $\lambda$  soit moindre que l'unité, la fonction précédente et par conséquent  $P^{(i)}$  devient moindre que l'unité; comme il est facile de le prouver.

L'intégrale (f) prise depuis  $\varpi = 0$  jusqu'à  $\varpi = \pi$ , est égale à cette même intégrale prise depuis  $\varpi = 0$  jusqu'à  $\varpi = \frac{\pi}{2}$ , plus à l'intégrale

$$\frac{1}{\varpi.(\sqrt{-1})^i}.\int d\varpi'.(\lambda.\sqrt{-1}-\sqrt{1-\lambda^2}.\cos\varpi')^{\frac{1}{2}}$$

prise depuis  $\varpi' = 0$ , jusqu'à  $\varpi' = \frac{\pi}{2}$ , comme on le voit en changeant  $\varpi$  en  $\pi - \varpi'$ , dans l'intégrale (f), lorsque  $\varpi$  surpasse  $\frac{\pi}{2}$ . Soit donc  $\gamma' = \frac{\pi}{2} - \gamma$ , ce qui donne  $\lambda = \sin \gamma'$ ; la fonction (f) devient

$$\frac{1}{\pi \cdot (\sqrt{-1})^{i}} \cdot \int d\varpi \left[ + \left( \sqrt{-1} \cdot \sin \gamma' + \cos \gamma' \cdot \cos \varpi \right)^{i} \right]; \quad (P)$$

l'intégrale étant prise depuis  $\varpi$  nul jusqu'à  $\varpi = \frac{\pi}{2}$ . On peut donner à cette fonction la forme suivante

$$\frac{1}{\pi \cdot (\sqrt{-1})^{i}} \cdot \int d\varpi \cdot \left\{ \frac{(\cos i\gamma' + \sqrt{-1} \cdot \sin i\gamma') \cdot [1 - 2 \cdot (\cos \gamma' - \sqrt{-1} \cdot \sin \gamma') \cos \gamma' \sin^{2} \frac{1}{2} \varpi]^{i}}{+ (-1)^{i} \cdot (\cos i\gamma' - \sqrt{-1} \cdot \sin i\gamma') \cdot [1 - 2 \cdot (\cos \gamma' + \sqrt{-1} \cdot \sin \gamma') \cdot \cos \gamma' \cdot \sin^{2} \frac{1}{2} \varpi]^{i}} \right\};$$
on a

a
$$\int d\boldsymbol{\omega} \cdot \left[\mathbf{1} - 2 \cdot (\cos \gamma' - \sqrt{-1} \cdot \sin \gamma') \cdot \cos \gamma' \cdot \sin^2 \cdot \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}\right]^4$$

$$= c^{i \cdot \log \left[\mathbf{1} - 2 \cdot (\cos \gamma' - \sqrt{-1} \cdot \sin \gamma') \cdot \cos \gamma' \cdot \sin^2 \cdot \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}\right]}$$

MÉCAN. CÉL. Tome V.

c étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité. Il résulte de la méthode générale que j'ai donnée dans les Mémoires de l'Académie des Sciences pour l'année 1782, et que j'ai développée avec étendue dans ma Théorie analytique des Probabilités, que dans le cas de i, un très grand nombre, cette intégrale devient à très peu près égale a celle-ci:

$$\int d\varpi \cdot c \frac{i}{2} \cdot (\cos \gamma' - \sqrt{-1} \cdot \sin \gamma') \cdot \cos \gamma' \cdot \varpi^2$$

l'intégrale étant prise depuis a nul, jusqu'à a infini. En faisant

$$\varpi \cdot \sqrt{\frac{i}{2} \cdot (\cos \gamma' - \sqrt{-1} \cdot \sin \gamma') \cdot \cos \gamma'} = t,$$

cette intégrale devient

obtoo is element in 
$$\frac{(\cos\frac{1}{2}\gamma' + \sqrt{-1} \cdot \sin\frac{1}{2}\gamma')}{\sqrt{\frac{i}{2} \cdot \cos\gamma'}} \cdot fdt \cdot c^{-t^2};$$
 of element is element in the state of t

l'intégrale étant prise depuis t nul, jusqu'à t infini, ce qui donne

$$\int dt.c^{-t^2} = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}.$$

De là il est facile de conclure que la fonction (f), valeur de  $P^{(i)}$ , est à fort peu près dans le cas de i égal à un très grand nombre pair,

$$\frac{2\cdot(-1)^2\cdot\cos(i+\frac{1}{2})\gamma^2}{\vdots};$$

$$\frac{1}{(1-\lambda^2)^4}\cdot\sqrt{2\pi \cdot i}$$
in the proof of the

et que dans le cas de i très grand et impair, cette valeur est à fort peu près

$$2.(-1)^{\frac{i-1}{2}}.\sin(i+\frac{1}{2}).\gamma'$$

$$2.(-1)^{\frac{1}{2}}.\sin(i+\frac{1}{2}).\gamma'$$

$$3.(-1)^{\frac{1}{2}}.\sin(i+\frac{1}{2}).\gamma'$$

$$3.(-1)^{\frac{1}$$

En restituant  $\frac{\pi}{2} - \gamma$ , pour  $\gamma'$ , ces deux expressions deviennent l'une et l'autre,

serie très convergente 
$$\frac{1}{\pi}$$
 de serie  $\frac{1}{\pi}$   $\frac{1}{\pi}$   $\frac{1}{\pi}$   $\frac{1}{\pi}$   $\frac{1}{\pi}$  de serie  $\frac{1}{$ 

 $\lambda$  étant supposé plus petit que l'unité, cette valeur de  $P^{(i)}$  est toujours fort approchée lorsque i est un très grand nombre : elle devient exacte, lorsque i est infini. Mais il est remarquable que l'expression donnée ci-dessus de  $P^{(i)}$ , par une suite de puissances de  $\lambda$ , et qui dans le cas de i un très grand nombre, est composée d'un grand nombre de termes et de facteurs, se réduise alors à une expression aussi simple.

Considérons présentement l'intégrale moissaixonque en simona a l

$$\alpha \cdot \int \frac{y_1 \cdot d\mu \cdot d\omega}{\sqrt{r^2 - 2\lambda r + 1}},$$

qui devient V", lorsque r=1. Le coefficient de  $\frac{1}{r^{i+1}}$  dans cette intégrale développée par rapport aux puissances de  $\frac{1}{r}$  est dans le cas où est un très grand nombre,

$$\frac{\alpha}{\sqrt{\frac{1}{2}, i\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y_1 \cdot d\mu' \cdot d\alpha' \cdot \cos\left[\left(i + \frac{1}{2}\right)\gamma - \frac{1}{2}\pi\right]}{\left(i - \lambda^2\right)^{\frac{1}{4}}}$$

En intégrant cette fonction par rapport à  $\mu'$ , on a

$$\frac{a}{\left(i+\frac{1}{2}\right)\cdot\sqrt{\frac{1}{2}\cdot i\pi}}\int_{-\frac{1}{2}}^{y_1.d\omega'\cdot\sin\left[\left(i+\frac{1}{2}\right)\cdot\gamma-\frac{1}{2}\cdot\pi\right]\cdot\left(\frac{d\omega'}{d\gamma}\right)}$$

$$-\frac{\alpha}{\left(i+\frac{1}{2}\right)\cdot\sqrt{\frac{1}{2}\cdot i\pi}}\int d\omega' \cdot d\mu' \cdot \sin\left[\left(i+\frac{1}{2}\right)\gamma - \frac{1}{4}\pi\right] \cdot \frac{d}{d\mu'} \cdot \left[\frac{y_1\left(\frac{d\mu'}{d\gamma}\right)}{\left(1-\lambda^2\right)^{\frac{1}{4}}}\right].$$

On voit ainsi que quel que soit y, on arrivera toujours par le dévelop-5.. pement du radical  $\frac{1}{\sqrt{r^2-2\lambda r+1}}$  suivant les puissances de  $\frac{1}{r}$ , à une série très convergente, à cause du diviseur  $\left(i+\frac{1}{2}\right)$ .  $\sqrt{\frac{1}{2}i\pi}$ . Le coefficient de  $\frac{1}{r^{l+1}}$  dans ce développement, est par le n° 23 du 3° Livre

$$2 \cdot \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot ... 2i - 1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot ... i}\right)^{2} \cdot \sum \cdot \left(\frac{i \cdot \overline{i - 1} \cdot \overline{i - 2} \cdot ... \overline{i - n + 1}}{i \cdot \overline{i + 1} \cdot \overline{i + 2} \cdot ... \overline{i + n}} \cdot \cos n \cdot (\omega - \omega') \cdot (1 - \omega^{2})^{\frac{1}{2}} \left(\mu^{i - n} - \frac{\overline{i - n} \cdot \overline{i - n - 1}}{2 \cdot 2i - 1} \cdot \mu^{i - n - 2} + \text{etc.}\right)\right)$$

$$+ \frac{1}{2} \cdot \frac{1}$$

le signe  $\Sigma$  comprenant toutes les valeurs de la fonction qu'il enveloppe, depuis n=0 jusqu'à n=i. Dans le cas de n=0, il ne faut prendre que la moitié de cette fonction.

La première approximation nous a donné y, sous cette forme

En la prenant négativement et en y changeant  $\mu$  en  $\mu'$ ; on aura la la valeur de  $\gamma_1$ , qui, substituée dans l'intégrale

no suo el suol tes 
$$\frac{1}{4}$$
 el seo  $\int_{1}^{1} \frac{y_1 \cdot d\mu' \cdot d\omega'}{\sqrt{r^2 - 2r\lambda + 1}}$  equa rapped el seo el suol de development el seo el

développée par rapport aux puissances de  $\frac{1}{r}$ , donne par une série très convergente, cette intégrale et par conséquent la valeur de V". On aura ainsi, au moyen de l'équation (4), une seconde approximation de la valeur de  $\alpha y'$ , ordonnée, comme la première, par une suite de fonctions de la forme  $Y'^{(i)}$ . On aura ensuite, au moyen de l'équation (6), une seconde approximation de la pesanteur p. Ces approximations seront suffisantes, vu le peu de densité de la mer et son peu de profondeur, comme on le verra bientôt.

Dans le cas où la Terre est un sphéroïde de révolution, il est facile de voir que la valeur de V" se simplifie, et se réduit à une suite de termes compris dans la forme

termes compris dans la forme
$$2\pi.Q^{(i)}.\int \alpha.Q^{(i)}.y_id\mu';$$

$$Q^{(i)} \text{ étant égal à}$$

$$1.3.5...2i-1$$

$$1.2.3...i$$

$$(\mu^i - \frac{i.i-1}{2.2i-1}.\mu^{i-a} + \text{etc.});$$

et  $Q^{(i)}$  étant ce que devient  $Q^{(i)}$ , lorsqu'on y change  $\mu$  en  $\mu'$ : i doit être étendu depuis zéro jusqu'à l'infini. Si l'on nomme  $\theta$  l'angle dont  $\mu$  est le cosinus, et  $\theta'$  l'angle dont  $\mu'$  est le cosinus; on aura, lorsque i est un grand nombre

$$= \frac{\cos(\overline{i + \frac{1}{2}} \cdot \theta' - \frac{1}{4}\pi)}{\sqrt{\frac{1}{2}i\pi} \cdot (1 - \mu'^2)^{\frac{1}{4}}}.$$

L'intégrale

$$2\pi \cdot Q^{(i)}$$
.  $\alpha \cdot \int Q'^{(i)} \cdot y_1 \cdot d\mu'$ 

deviendra à fort peu près

$$\frac{8\alpha}{i\cdot 2i+1} \cdot \frac{\cos\left(\overline{i+\frac{1}{2}}\cdot\theta-\frac{1}{4}\pi\right)}{\sqrt{\sin\theta}} \cdot \left\{ -\frac{y_1}{\cancel{y}} \cdot \sqrt{\frac{\sin\left(\theta'\right)}{\sin\theta}} \cdot \sin\left[\overline{i+\frac{1}{2}}\cdot\left(\theta'\right)-\frac{1}{4}\pi\right]}{\sqrt{\frac{1}{2}\sin\theta}} \right\}.$$

On voit par là, combien la valeur précédente de V" est convergente.

4. Considérons maintenant les variations des degrés et de la pesanteur à la surface des continens et des îles, ou, ce qui revient au même, à la surface du sphéroïde terrestre. Ces variations sont les seules que nous puissions observer. Pour avoir leur expression analytique, imaginons une atmosphère infiniment rare, d'une densité constante, très peu élevée, mais qui cependant embrasse toute la Terre et ses montagnes: soit  $\alpha y''$  l'élévation de ses points au-dessus de la surface du sphéroïde terrestre. L'équation (1) du n° 2 qui détermine la figure de la mer, déterminera la partie de la figure de l'atmosphère, qui s'élève au-dessus de la mer; car il est clair que la valeur de V' dans cette équation, étant de l'ordre  $\alpha$ , est aux quantités près de l'ordre  $\alpha$ , la même aux deux surfaces. Mais à la surface de la mer, r doit être changé dans  $1 + \alpha y' + \alpha y''$ ; tandis que relativement à la surface de l'atmosphère supposée, il doit être changé dans  $1 + \alpha y'' + \alpha y'''$ . Cela posé, si l'on retranche ces deux équations, l'une de l'autre, on aura

$$\alpha y'' - \alpha y' = \text{constante.}$$

Ainsi tous les points de la surface de cette atmosphère, qui correspondent à la surface de la mer, sont également élevés au-dessus de cette dernière surface; en sorte que ces deux surfaces sont à très peu près semblables.

Si l'on nomme p' la pesanteur à la surface de l'atmosphère, il est visible que cette pesanteur sera à la pesanteur p à la surface de la mer,

comme 
$$\frac{1}{(1+\alpha y+\alpha y'')^2}$$
 est à  $\frac{1}{(1+\alpha y+\alpha y'')^2}$ ; ce qui donne à très peu

près, en désignant  $\alpha y'' - \alpha y'$ , par  $\alpha l$ , quantité qui, comme on vient de le voir, est constante,

$$p'=p-2\alpha l.P;$$

Pétant la pesanteur à la surface de la mer, à l'équateur; ainsi la loi de la pesanteur est la même aux deux surfaces. On a vu dans le n° 2 que dans le cas où le sphéroïde terrestre est homogène et de même densité que la mer, on a

$$p = P \cdot \left(1 + \frac{5}{4} \cdot \alpha \varphi \cdot \mu^{a}\right);$$

on a donc alors

$$p' = P.(1 - 2\alpha l + \frac{5}{4}\alpha.\phi.\mu^2).$$

Pour avoir l'équation de la surface de l'atmosphère au-dessus des continens, nous nommerons  $V_i$  la somme des molécules de la mer, divisées par leurs distances respectives à un point de cette surface. Alors l'équation (1) du n° 2 deviendra celle de cette surface, en y changeant V' en  $V_i$ , et en y substituant  $1 + \alpha y + \alpha y''$  pour r. Or on a

$$V' = \alpha \int \frac{y' d\mu' d\omega'}{\sqrt{r^2 + 2r \cdot \cos \gamma + 1}},$$

l'intégrale étant prise pour toutes les valeurs de  $\mu'$  et de  $\omega'$  relatives à l'étendue de la mer, r devant être supposé égal à l'unité, et cos  $\gamma$  étant

$$\mu\mu' + \sqrt{1-\mu^a} \cdot \sqrt{1-\mu'^a} \cdot \cos(\omega-\omega')$$
.

En développant le radical de cette intégrale, par rapport aux puissances de  $\frac{1}{r}$ ; on voit, par ce qui précède, que V' est composé de termes de

la forme

6. 
$$(1-\mu^2)^2$$
.  $(\mu^{i-n}-\text{etc.})$ .  $(j'd\mu'd\omega'.(1-\mu'^2)^2$ .  $(\mu'^{i-n}-\text{etc.})$ .  $\cos n(\omega-\omega')$ .

La valeur de V, se compose des mêmes termes; on a donc

Cela posé, si l'on retranche l'une de l'autre, les équations aux deuxsurfaces, on aura

$$ay'' = al + ay';$$

pourvu que les coordonnées μ et ω de la fonction y' se rapportent au rayon du point de l'atmosphère, que nous considérons.

La surface du sphéroïde dont le rayon est 1 + ay + ay', est celle de la mer; et au-delà des limites de la mer, elle s'abaisse au-dessous de la surface du sphéroïde terrestre; l'élévation des points de cette seconde surface au-dessus de la première, sera donc - ay : c'est ce que l'on entend par l'élévation de ces points au-dessus du niveau de la mer. L'élévation des points correspondans de la surface de l'atmosphère, est ay". Les observations barométriques font connaître les quantités al et ay"; car on peut supposer que l'atmosphère dont nous venons de parler, est notre atmosphère elle-même réduite à sa moyenne densité.

Pour avoir l'expression de la pesanteur, il faut changer dans l'équation (1) du n° 2, V' dans V1, V1 représentant pour les points situés audessus des continens, la somme des molécules de la mer, divisées par leurs distances respectives au point de la surface de l'atmosphère, qui correspond aux continens, et substituer pour r, 1 + ay + ay". On peut supposer, pour plus de généralité, que V, comprend encore la somme semblable relative aux montagnes, et même aux cavités de la surface de la Terre, en observant que la partie de V, relative à ces cavités, est négative. La pesanteur p'est donnée par la différentielle du second membre de l'équation (1) divisée par - dr. Si l'on en re-

tranche l'équation (1) multipliée par 1, et si l'on observe que l'on a

$$\left(\frac{dV_i}{dr}\right) + \frac{1}{2}V_i = 0$$

on aura

$$p' = \text{const.} - 2\alpha\pi \cdot (\bar{y} + y'') \cdot \int \rho \cdot da^{3} + 2\alpha\pi \cdot \int \rho d. (a^{4}Y^{(1)} + \alpha^{5} \cdot Y^{(2)} + a^{5}Y^{(3)} + \text{etc.}) + \frac{5}{4} \cdot \alpha \rho \cdot P \cdot \mu^{2}.$$
(7)

En substituant ensuite au lieu de p,  $p'' = 2 \cdot \alpha P \cdot y''$ ; p'' étant la pesanteur à la surface du sphéroïde, on aura

$$p'' = \text{const.} - \frac{1}{2} P.(\alpha l - \alpha y'')$$

$$+ 2\alpha \pi \cdot \bar{y} \cdot \int a^3 \cdot d\rho \cdot - 2\alpha \pi \cdot \int d\rho \cdot (a^4 Y^{(1)} + a^5 Y^{(2)} + \text{etc.})$$

$$+ \frac{5}{4} \alpha \phi \cdot P \cdot \mu^2.$$
(8)

Cette expression de p'' embrasse l'attraction des montagnes, et généralement tous les effets d'attraction, dus aux irrégularités de la surface du sphéroïde terrestre, pourvu que le point attiré en soit fort éloigné; car cette condition est nécessaire à l'existence de l'équation

$$0 = \left(\frac{dV_1}{dr}\right) + \frac{1}{2}V_1,$$

qui fait disparaître ces effets.

Si le sphéroïde terrestre était homogène,  $d\rho$  serait nul, et l'on aurait cette expression remarquable,

$$p'' = P.(I - \frac{1}{2}\alpha(l - y'') + \frac{5}{4}\alpha\phi.\mu^2),$$

P étant la pesanteur à l'équateur au niveau de la mer. On peut, au moyen de cette équation, vérifier l'hypothèse de cette homogénéité; car alors, en ajoutant à toutes les valeurs de p'', déterminées par les expériences du pendule, la quantité  $\frac{1}{2}$ . P. (al - ap'') déterminée par les observations du baromètre; l'expression de la pesanteur ainsi corrigée, deviendrait P.  $(1 + \frac{5}{4}ap \mu^2)$ . L'accroissement de la pesanteur de l'équateur aux pôles, serait ainsi  $\frac{5}{4}ap \cdot \mu^2$ . Or on a

$$\frac{5}{4} \alpha \varphi = 0,004325;$$

cet accroissement serait donc  $0,004325 \cdot P\mu^2$ . Les expériences multipliées du pendule dans les deux hémisphères, indiquent bien un accroissement à très peu près proportionnel à  $\mu^2$ , ou au carré du sinus de la latitude; mais elles s'accordent à donner à  $\mu^2$ , un coefficient plus grand que le précédent, et à fort peu près égal à  $0,0054 \cdot P$ . L'hypothèse de l'homogénéité de la Terre est donc exclue par ces expériences : on voit même que l'hétérogénéité de ses couches doit s'étendre depuis la surface, au-delà des quantités de l'ordre  $\alpha$  ou de l'aplatissement de la Terre, afin que la quantité de l'équation (8)

$$2\alpha\pi.\bar{y}.\int a^3.d\rho - 2\alpha\pi.\int d\rho (a^4Y^{(1)} + a^5Y^{(2)} + etc.),$$

soit de l'ordre a, et devienne égale à

$$(0,0054.P - 0,004325.P).(\mu^2 - \frac{1}{3}).$$

5. Comparons maintenant l'analyse aux observations. L'équation (1) du n° 2 donne à la surface de l'atmosphère au-dessus des continens,

const.=
$$\frac{4}{3}\pi \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^3 \cdot (ay + ay'') - 4a\pi \int \rho \cdot d\left(\frac{a^4 Y^{(1)}}{3} + \frac{a^5 Y^{(2)}}{5} + \frac{a^6 Y^{(3)}}{7} + \text{etc.}\right)$$

$$- V_1 + \frac{a\phi}{2} \cdot P \cdot \left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right).$$

Si l'on ajoute cette équation multipliée par  $\frac{3}{2}$ , à l'équation (7) du n° précédent, on aura

$$p' = \text{const.} + 4\alpha\pi \cdot \int \rho \cdot d \cdot \left(\frac{a^5 Y^{(2)}}{5} + \frac{2a^6 Y^{(3)}}{7} + \text{etc.}\right)$$
$$-\frac{3}{2} V_1 + 2\alpha\phi \cdot P \cdot \left(\mu^2 - \frac{4}{3}\right).$$

En développant  $V_1$  suivant les puissances de  $\frac{1}{r}$ , on aura une expression de cette forme,

$$V_1 = \frac{U_1^{(0)}}{r} + \frac{U_1^{(1)}}{r^2} + \frac{U_1^{(2)}}{r^3} + \text{etc.},$$

 $U_1^{(i)}$  étant une fonction rationnelle et entière de  $\mu$ ,  $\sqrt{1-\mu^2}$  sin  $\omega$ , et  $\sqrt{1-\mu^2}$  cos  $\omega$ , assujettie à la même équation aux différences par-Mécan. cél.  $Tome\ V$ .

tielles que Y(1). L'équation précédente devient ainsi

$$p' = \text{const.} + 4\alpha\pi \cdot f\rho \cdot d \cdot \left(\frac{a^{5}Y^{(9)}}{5} + \frac{2a^{5} \cdot Y^{(5)}}{7} + \text{etc.}\right)$$
$$-\frac{3}{2} \cdot \left(U_{1}^{(1)} + U_{1}^{(9)} + U_{1}^{(9)} + \text{etc.}\right) + 2\alpha\phi \cdot \cdot \cdot \left(\mu_{1} - \frac{1}{3}\right).$$

Il résulte des nombreuses expériences du pendule, que l'on a à fort peu près

 $p = \text{const.} + \alpha q.P.\left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right),$ 

aq étant à très peu près égal à 0,0054. De là il suit que la fonction

$$4\alpha\pi.\int \rho.d.\left(\frac{2a^{6}.Y^{(3)}}{7}+\frac{3a^{7}.Y^{(1)}}{9}+\text{etc.}\right)-\frac{3}{2}\cdot(U_{1}^{(1)}+U_{1}^{(3)}+\text{etc.}),$$

est très petite relativement au terme  $\alpha q \cdot P \cdot \left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right)$ ; et que la fonction

 $4\alpha\pi . \int \rho . d\left(\frac{a^{5}Y^{(2)}}{5}\right) - \frac{3}{2}U_{\nu},$ 

est à fort peu près

$$(\alpha q - 2\alpha \varphi) \cdot P \cdot \left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right)$$
.

L'expression générale de cette fonction est de la forme

A. 
$$(\mu^{2} - \frac{1}{3}) + A^{(1)} \cdot \mu^{2} \sqrt{1 - \mu^{2}} \cdot \sin \omega + A^{(2)} \cdot \mu \cdot \sqrt{1 - \mu^{2}} \cdot \cos \omega + A^{(3)} \cdot (1 - \mu^{2}) \cdot \sin 2\omega + A^{(4)} \cdot (1 - \mu^{2}) \cdot \cos 2\omega.$$

Ainsi, les constantes A<sup>(1)</sup>, A<sup>(2)</sup>, A<sup>(3)</sup>, A<sup>(3)</sup> sont très petites relativement à la constante A, et l'on a à fort peu près

 $A = (\alpha q - 2\alpha \varphi).P.$ 

On a

$$\alpha \varphi = \frac{1}{289} = 0,003460,$$

et les expériences du pendule donnent à fort peu près

aq = 0,00540;

on aura ainsi

A = -0,00152.P.

On peut encore déterminer A au moyen des deux inégalités de la Lune, qui dépendent de l'aplatissement de la Terre. Il résulte du second chapitre du septième livre, que si l'on désigne par  $K \cdot \left(\mu^{2} - \frac{1}{3}\right)$  la partie de

$$\frac{4a\pi}{5}$$
.  $\rho.d.(a^5Y^{(a)}) + U_1^{(a)}$ ,

qui est indépendante de l'angle \omega; l'inégalité lunaire en latitude sera

$$\frac{K}{(g^2-1).M} \cdot \Pi^a \cdot \sin \lambda \cos \lambda \cdot \sin u;$$

u étant la longitude de la Lune; g-1, le rapport du moyen mouvement de ses nœuds à son moyen mouvement;  $\Pi$  sa parallaxe;  $\lambda$  l'obliquité de l'écliptique; et M, la masse de la Terre, à très peu près égale à P. Suivant M. Burg, cette inégalité est en secondes sexagésimales

$$-8''$$
, o. sin  $u$ ;

et la comparaison de quatre mille observations a conduit M. Burkhardt, au même résultat qui donne

$$K = -0,001558.P.$$

L'expression analytique de l'inégalité lunaire en longitude, qui dépend du sinus de la longitude du nœud de l'orbite lunaire, comparée par les mêmes astronomes, aux observations, donne la même valeur de K, qui me paraît être ainsi une des données les plus exactes et les plus précieuses de l'Astronomie théorique. Maintenant, il est facile de voir que si l'on nomme  $Q.(\mu^2 - \frac{1}{3})$ , la partie de  $U_1^{(a)}$ , indépendante de l'angle  $\omega$ , on a

$$K = A + \frac{5}{2}Q;$$

on a done

$$A = -0,001558.P - \frac{5}{2}Q.$$

Si l'on compare cette valeur de A, à la précédente conclue des expériences du pendule, on a

$$Q = -0,00015.P.$$

On sent combien les erreurs des observations et des expériences rendent cette valeur incertaine; mais elle prouve la petitesse de la masse de la mer, et son peu de profondeur.

Les mesures des degrés des méridiens, réduites au niveau de la mer ou de l'atmosphère supposée, nous offrent un troisième moyen pour obtenir A. L'équation (1) du n° 2 transportée à cette atmosphère, donne

$$(\alpha \bar{y} + \alpha y'').P = \text{const.} + 4\alpha \pi. \int \rho. d. \left(\frac{a^5 Y^{(4)}}{5} + \frac{a^6. Y^{(3)}}{7} + \text{etc.}\right) + U_1^{(4)} + U_1^{(3)} + \text{etc.}$$

$$-P.\frac{\alpha \bar{\phi}}{2}.\left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right),$$

l'origine des coordonnées étant au centre commun de gravité de la mer et du sphéroïde terrestre; ce qui fait disparaître les quantités Y<sup>(1)</sup> et U<sub>1</sub><sup>(1)</sup>, et les autres fonctions de même nature. Les mesures des degrés s'écartent peu de la figure d'un ellipsoïde de révolution. Elles présentent cependant de plus grandes anomalies, que les longueurs du pendule; ce qui tient en partie, aux erreurs dont les observations d'amplitude des arcs mesurés sont susceptibles, et qui relativement à l'arc mesuré, sont beaucoup plus considérables que les erreurs des expériences du pendule; et en partie, à ce que les petites irrégularités de la Terre, affectent plus les degrés que les longueurs du pendule, comme je l'ai fait voir dans le troisième livre. Mais lorsque l'on compare des degrés éloignés, tels que ceux de France et de l'équateur; l'influence de ces irrégularités devient moins sensible. La comparaison des degrés dont je viens de parler, a donné à M. Delambre

$$\alpha(\bar{y}+y'') = \text{const.} - 0,00324.(\mu^2 - \frac{1}{3}).$$

En comparant cette expression de  $\alpha y + \alpha y''$ , à la précédente, on voit que les quantités  $\overline{Y}^{(5)}$ ,  $\overline{Y}^{(4)}$ , etc.,  $U_1^{(1)}$ ,  $U_1^{(3)}$ ,  $U_1^{(4)}$ , etc. sont très petites, comme cela résulte pareillement des expériences du pendule. La première de ces expressions donne

$$-P.(\alpha \bar{h} + \alpha h'') = A + \frac{5}{2}Q - \frac{\alpha \varphi}{2}.P;$$

en désignant par

$$-\alpha h.\left(\mu^{s}-\frac{1}{3}\right), \quad -\alpha \overline{h}.\left(\mu^{s}-\frac{1}{3}\right), \quad -\alpha h''.\left(\mu^{s}-\frac{1}{3}\right),$$

les parties de  $\alpha Y$ ,  $\alpha \overline{Y}$  et  $U_{\bullet}^{(\bullet)}$ , qui sont indépendantes de  $\omega$ . On aura donc, en substituant pour  $-P.(\alpha \overline{h} + \alpha h'')$ , sa valeur -0.00324.P, que donnent les degrés du méridien, mesurés en France et à l'équateur,

$$A = -0,00151.P - \frac{5}{2}Q.$$

Les degrés du méridien, mesurés en France, comparés à ceux que l'on a mesurés dans l'Inde, donnent le même résultat. Je suppose que les degrés mesurés à la surface du sphéroïde terrestre, et réduits au niveau de l'atmosphère supposée, sont ceux de la surface de cette atmosphère. Pour le faire voir, il suffit de prouver que la direction de la pesanteur, est aux quantités près de l'ordre  $\alpha^2$ , la même à la surface du sphéroïde, et à la surface de l'atmosphère. L'angle que cette direction forme avec le rayon r, dans le sens du méridien, par exemple, est égal au rapport de la différentielle du second membre de l'équation (1) du n° 2, prise par rapport à  $\theta$  et divisée par  $d\theta$ , à cette même différentielle prise par rapport à r et divisée par  $d\theta$ , à cette même différentielle prise par rapport à r et divisée par dr; or il est visible que ce rapport est aux quantités près de l'ordre  $\alpha^2$ , le même à la surface du sphéroïde, qu'à celle de l'atmosphère.

Maintenant, si nous rassemblons les trois valeurs précédentes de A,

$$A = -0.00152.P$$
,  $A = -0.001558.P - \frac{5}{2}Q$ ,  $A = -0.00151.P - \frac{5}{2}Q$ ;

on voit par l'ensemble de ces valeurs, que Q est insensible, et qu'en le supposant nul, elles s'accordent aussi bien qu'on peut le désirer.

L'ellipticité ah+ah' de la surface de la mer, est, par ce qui précède,

Si l'on suppose la densit 
$$(Q_{\underline{\alpha}}^{\underline{t}} = pA)$$
 nier et orce du sphéroide terrestre égale à trois fois la densité de  $q$  mer, l'us pour unité, ce qui est à

En prenant pour A, le milieu des trois valeurs précédentes, on aura pour cette ellipticité,

$$0,00326 - \frac{5}{6}.Q,$$

ou 0,00326 en négligeant le terme  $-\frac{5}{6}$ . Q.

La précession des équinoxes donne des limites entre lesquelles l'ellipticité de la Terre entière, eu de l'atmosphère supposée, est comprise. On a par le n° 14 du cinquième livre, cette ellipticité égale à

$$0,0017301 + \frac{0,00259661. \int_{\rho} a^4 da}{(1 + 6.0,748493). \int_{\rho} a^2 da},$$

3(1+6) étant le rapport de la masse de la Lune divisée par le cube de sa moyenne distance à la Terre, à la masse du Soleil divisée par le cube de la moyenne distance de la Terre au Soleil. En supposant ce rapport égal à 2,57, comme il résulte par un milieu entre ses valeurs données par les phénomènes des marées, de la nutation, de la parallaxe lunaire, et de l'équation lunaire des tables du Soleil; en supposant ensuite, conformément à ce qui précède, l'ellipticité de la Terre, égale à 0,00326, on aura

$$\int \rho \cdot d \cdot a^3 = 1,1407 \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^5$$

Soit ( $\rho$ ) la densité de la surface, et supposons qu'elle augmente de la surface au centre, en progression arithmétique, en sorte que son expression soit ( $\rho$ ). (1 + e - ea); l'équation précédente donnera

$$e = 2,349$$
.

On aura, en nommant D la densité moyenne de la Terre,

$$D = \int \rho \cdot d \cdot a^3 = (\rho) \cdot \left(1 + \frac{1}{4}e\right);$$

substituant pour e, sa valeur précédente, on a

Si l'on suppose la densité de la première écorce du sphéroïde terrestre égale à trois fois la densité de la mer, prise pour unité, ce qui est à peu près la densité du granit; on aura

$$D = 4,761;$$

ce qui s'accorde avec la moyenne des valeurs données par les observations de Maskeline, sur l'attraction d'une montagne d'Ecosse, et par la belle expérience de Cavendish.

Le rayon du sphéroïde terrestre est

$$1-\alpha \bar{h}.(\mu^2-\frac{1}{5})+\alpha x;$$

 $\alpha x$  étant une quantité peu considérable par rapport à  $\alpha \bar{h}$ ; car cette quantité devient plus sensible, comme on l'a vu, dans l'expression de la pesanteur, où cependant l'expérience a montré qu'elle est presque nulle. Pareillement l'expression du rayon de la surface de la mer est

$$\alpha l - \alpha . (\bar{h} + h') . (\mu^2 - \frac{1}{3}) + \alpha x';$$

 $\alpha x'$  étant une quantité du même ordre que  $\alpha x$  dont elle dépend. Elle est, par conséquent, peu considérable relativement à  $\alpha \bar{h}$ . La profondeur de la mer est, à très peu près, la différence de ces deux rayons; elle est ainsi égale à

$$al-ah'\left(\mu^2-\frac{1}{3}\right)+ax'-ax.$$

A l'équateur, les continens ont une grande étendue sur laquelle cette expression devient négative. La mer y occupe une étendue encore plus grande sur laquelle la même expression est positive. Dans le premier cas,  $\alpha l + \frac{\alpha h'}{3}$  est moindre que la valeur de  $\alpha x - \alpha x'$ , correspondante à  $\mu$  nul. Dans le second cas, il est plus grand que cette valeur.  $\alpha l + \frac{\alpha h'}{3}$  est donc une quantité très petite de l'ordre de  $\alpha x$ . Très près du pôle boréal, où l'on a  $\mu = 1$ , la mer recouvre une partie du sphéroïde terrestre, et en laisse une autre partie à découvert. Dans le premier cas,  $\alpha l - \frac{2\alpha h'}{3}$  est plus grand que la valeur de  $\alpha x - \alpha x'$ , correspondante à  $\mu = 1$ . Dans le second cas, il est plus petit.  $\alpha l - \frac{2\alpha h'}{3}$  est donc une

quantité très petite de l'ordre de  $\alpha x$ ; donc  $\alpha l + \frac{1}{3}\alpha h'$  étant du même ordre, la différence  $\alpha h'$  de ces quantités sera du même ordre, ainsi que la constante  $\alpha l$ . Par conséquent, la mer est peu profonde, et ses profondeurs sont peu considérables, et du même ordre que les élévations des continens au-dessus du niveau de la mer. Mais de même que de très hautes montagnes s'élèvent sur quelques points des continens; de même il peut y avoir dans quelques points du bassin de la mer, de grandes profondeurs.

De là il suit que la surface du sphéroïde terrestre est à fort peu près elliptique; car l'équation de l'équilibre de la surface de la mer, et qui donne par ce qui précède,

$$\alpha(\bar{h}+h') = \frac{1}{2}\alpha\phi - \frac{(A+\frac{1}{2}Q)}{P},$$

deviendrait celle de l'équilibre de la surface du sphéroïde terrestre, supposée fluide, si la mer venait à disparaître; ce qui rendrait ah' et Q nuls. Ainsi ces quantités étant très petites, par ce que l'on vient de voir, la valeur de  $a\bar{h}$  diffère très peu de celle de l'équilibre de la surface du sphéroïde. Les expériences du pendule prouvent non-seulement que cette surface est à très peu près elliptique; mais encore que les diverses couches du sphéroïde terrestre ont à peu près une figure elliptique; car les quantités  $aY^{(3)}$ ,  $aY^{(4)}$ , etc. de l'expression du rayon de ces couches se feraient remarquer dans ces expériences, si elles étaient sensibles.

6. Je vais présentement considérer la figure de la Terre, en la supposant formée d'un seul fluide compressible. Pour cela, je reprends l'équation (1) du n° 29 du troisième Livre. En y supposant, comme on le peut pour simplifier, Y<sup>(\*)</sup> nul, et en comparant séparément les fonctions semblables; la différentielle de cette équation, prise par rapport à la quantité a considérée comme variable, donne

$$\frac{d\Pi}{\rho} = -4\pi \cdot \frac{da}{a^2} \cdot \int \rho a^2 da; \quad (i)$$

 $\Pi$  est ici la pression à la surface de niveau d'une couche du sphéroïde terrestre dont le rayon est a;  $\rho$  est la densité de cette couche, et  $\pi$  est le rapport de la circonférence au diamètre : l'intégrale doit être prise depuis a=0. Maintenant, si l'on suppose conformément à ce que j'ai

Poyer là defous: Plana, dans Corresp de Zach, J.5, p.68 et 185. dit dans le chapitre précédent,

$$\frac{d\pi}{d\rho} = 2k\rho; \quad \text{in the } A = (q)$$

2k étant une constante; on aura en intégrant de la common nou le

$$\Pi = k\rho^{2} - k(\rho)^{2},$$

( $\rho$ ) étant la densité à la surface où la pression  $\Pi$  est supposée nulle. L'équation (i) devient ainsi en faisant  $n^2 = \frac{2\pi}{h}$ ,

$$\frac{d\rho}{da} = -\frac{n^2}{a^2} \cdot \int \rho \cdot a^2 da. \quad (4)$$

Supposons  $\rho' = a\rho$ ; on aura

$$a^{a}d\rho = ad\rho' - \rho'da;$$

on aura donc

ce qui donne en différentiant ob notamps etted . Tanto a confuse ac

qui delermine une de ces 
$$0 = \sqrt{q^2 n} + \frac{dd\rho'}{da^2}$$
 intre est connue. L'allipticité du sphéroide terrestre de service sa figure, la v

L'intégrale de cette équation est mont sel possent es à aussantique le b

and a such timestate at the restriction are a soul sense shift and self-densities at 
$$\rho' = A \cdot \sin an + B \cdot \cos an$$
;

A et B étant deux constantes arbitraires; on aura donc

$$\rho = \frac{A}{a} \cdot \sin an + \frac{B}{a} \cdot \cos an.$$

La densité p n'étant point infinie au centre où a est nul, B doit être nul; par conséquent

$$\rho = \frac{\mathbf{A}}{a} \cdot \sin an$$

Telle est donc la loi de densité des couches du sphéroïde terrestre, relative à la loi supposée entre la pression et la densité. A la surface de la Terre, où nous supposerons a = 1, et la densité  $\rho$  égale à  $(\rho)$ , nous

MÉCAN. CÉL. Tome V.

aurons

dit dans le chapitre précédent, de la chapitre précédent, 
$$\frac{\left(\frac{d\rho}{da}\right)}{\left(\rho\right)} = A \cdot \sin n;$$
  $\frac{\left(\frac{d\rho}{da}\right)}{\left(\rho\right)} = \frac{n}{1 - \frac{n}{\tan n}}.$ 

Si l'on nomme D la moyenne densité de la Terre; on aura mand de

$$\int \rho a^2 da \stackrel{\square}{=} D \cdot \int a^2 da \stackrel{\square}{=} \frac{1}{3} D;$$

or l'équation

(¢) étant la densité à la surface où la pression II est su L'équation (i) devient ain 
$$ab_{pq}^{2}$$
  $a_{pq}$ 

donne à la surface

$$(\rho) \cdot \left(1 \xrightarrow{n} \frac{n}{\tan g n}\right) = n^* \cdot \int \rho a^* da;$$

on a donc

$$\frac{D}{(\rho)} = \frac{3}{n^2} \cdot \left(1 - \frac{n}{\tan g \, n}\right) = \frac{3q_0}{n^2}; \quad q_0 = \frac{1}{q} \text{ succeeding}$$

en faisant

$$q = 1 - \frac{n}{\tan n};$$
 on on one are no

 $\frac{D}{(\rho)}$  étant le rapport de la densité moyenne de la Terre, à la densité de sa surface;  $n^*$  étant  $\frac{2\pi}{k}$ . Cette équation donne entre k et D, une relation qui détermine une de ces quantités, lorsque l'autre est connue.

L'ellipticité du sphéroïde terrestre détermine sa figure, la variation de la pesanteur à sa surface, les mouvemens de son axe de rotation, et les inégalités lunaires dues à son aplatissement. On satisfait donc à tous ces phénomènes, en satisfaisant à l'ellipticité déterminée précédemment. Si l'on nomme h l'ellipticité de la couche du sphéroïde, dont le rayon est a, et dont  $\rho$  est la densité; on a par le  $n^{\circ}$  30 du troisième Livre,

$$\frac{ddh}{da^2} - \frac{6h}{a^2} + \frac{2\rho a}{\int \rho \cdot a^2 da} \cdot \left(\frac{adh + hda}{da}\right) = 0.$$

Si l'on met cette équation sous la forme

$$0 = \frac{d^2 \cdot (h \int \rho a^2 da)}{da^2} - \frac{6h \cdot \int \rho a^2 da}{a^2} - \frac{ha^2 d\rho}{da};$$

et si au lieu de  $\frac{d\rho}{da}$ , on substitue sa valeur  $-\frac{n^2}{a^2}$ .  $\int \rho' a da$ ; on aura

relative à la loi supposée entre, la pression et la densité. A la surface de la Terre, où shaig 
$$1.4^n + \frac{aba}{a} + \frac{6h}{a} + \frac{6$$

WECAN, CEL. Tome V.

Il est facile de voir que l'on satisfait à cette équation, en faisant

$$h. \int \rho' a da = H. \rho' \cdot \left(1 - \frac{3}{n^2 a^2}\right) + \frac{3H. d\rho'}{n^2 a da};$$

H étant une constante arbitraire, et en observant que

$$\frac{dd\rho'}{da^2} = -n^*\rho'.$$

Cette expression donne pour l'ellipticité h,

$$h = -H.\left(\frac{3}{a^2} + \frac{n^2 \cdot \tan g \, an}{an - \tan g \, an}\right);$$

ellipticité qui multipliée par a, devient nulle au centre du sphéroïde, où a est nul. On voit par le n° 30 du troisième Livre, que cette valeur de h est la seule admissible dans la question présente. Par le même numéro, l'ellipticité de la Terre est à la surface où a = 1,

$$\frac{2\phi \cdot h \cdot \int \rho' a da}{2h \cdot \int \rho' a da - \frac{2}{5} h(\rho) + \frac{2}{5} \cdot \int a^5 h d\rho}$$

les intégrales étant prises depuis a nul jusqu'à a=1;  $\alpha \varphi$  est le rapport de la force centrifuge à la pesanteur à l'équateur. En substituant au lieu de  $\frac{d\varphi}{da}$ , sa valeur  $\frac{n^2}{a^2} \cdot \int \rho' a da$ , et au lieu de  $h \int \rho' a da$ , sa valeur précédente; on aura

$$\int a^5 h d\rho = -n^2 H \cdot \int a^3 da \cdot \left( \rho' - \frac{3\rho'}{n^2 a^2} + \frac{3d\rho'}{n^2 a da} \right),$$

 $\rho'$  étant A. sin an. On trouvera ainsi à la surface de la Terre où a=1, l'ellipticité h du sphéroïde égale à

$$\frac{5}{2} \alpha \varphi \cdot \left(1 - \frac{3q}{n^2}\right)$$
$$3 - q - \frac{n^2}{q}$$

Je dois observer ici que M. Legendre a déterminé l'aplatissement de la Terre, dans le cas où la densité des couches est exprimée par  $\frac{A}{a}$  sin an.

(Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1789). En réunissant ces divers résultats, on a

$$q = 1 - \frac{n}{\tan g n};$$

$$D = \frac{3q}{n^2},$$
ellipticité de la Terre = 0,00865  $\cdot \frac{\left(1 - \frac{3q}{n^2}\right)}{3 - q - \frac{n^2}{q}},$ 

$$k = \frac{2\pi}{n^2}.$$

Si l'on suppose  $n = \frac{5}{6}\pi$ ,  $\pi$  étant le rapport de la circonférence au diamètre; on aura

$$q = 5,5345;$$
ellipticité =  $\frac{1}{306,6}$ ;
$$\frac{D}{(\rho)} = 2,4225.$$

A la surface, on a

 $\frac{d\Pi}{d\rho} = 2k(\rho) = \frac{g.(\rho)l}{i.(\rho)},$   $l \text{ étant la hauteur d'une colonne de la resse un de ses points : et } i(\rho) \text{ étant l'acceptant l'acceptan$ 

g étant la pesanteur, l étant la hauteur d'une colonne de la matière de cette surface, et qui presse un de ses points; et  $i(\rho)$  étant l'accroissement de densité du point pressé. g est égal à la masse de la Terre, divisée par le carré de son rayon pris pour unité; on a donc

$$g = \frac{4}{3} \pi.D.$$

Ensuite on a  $2k = \frac{4\pi}{n^2}$ ; on a ainsi

 $\frac{D}{(\rho)} = \frac{3i}{\ln^2} = \frac{3q}{n^2};$   $q = \frac{i}{I};$ 

done

la valeur de *i* relative à la matière de la surface du sphéroïde est donc ici 5,5345. *l*. L'existence d'une telle substance est très admissible.

Si la Terre était entièrement formée d'eau, et si l'on suppose conformément aux expériences de Canton, qu'à la température de 16°, la densité de l'eau augmente dans le rapport de 0,000044 à l'unité, par la pression d'une colonne verticale d'eau, de dix mètres; on aura

$$q = 28,012,$$
 $n = 3,0297,$ 
 $\frac{D}{(p)} = 9,0479,$ 
ellipticité  $= \frac{1}{359,54}$ .

Le coefficient du carré du sinus de la latitude, dans l'expression de la longueur du pendule, sera 0,00587. Ces résultats s'éloignent des observations, fort au-delà des erreurs dont elles sont susceptibles.

7. Pour comparer entre elles, les mesures, soit des degrés, soit de la pesanteur, on les rapporte au niveau de la mer, et l'on peut déterminer l'élévation du point du sphéroïde, où l'on observe, par la hauteur du baromètre. Pour avoir une idée juste de ce niveau, nous avons imaginé une atmosphère très rare, très peu élevée, mais cependant assez pour embrasser toute la Terre et ses montagnes. Nous avons prouvé que l'élévation de la surface de cette atmosphère, au-dessus de la surface de la mer est constante, et nous avons prolongé cette dernière surface au-dessous des continens, de manière qu'elle fût toujours à la même distance de la surface de l'atmosphère. C'est la surface de la mer, ainsi prolongée, qui constitue le niveau de la mer. Mais au lieu de rapporter les degrés et les expériences du pendule, à ce niveau; nous les rapporterons directement à la surface de l'atmosphère supposée.

Reprenons les équations trouvées ci-dessus.

$$P.(\alpha \bar{y} + \alpha y'') = \text{const.} + 4\alpha \pi. \int \rho. d. \left(\frac{a^{5}Y^{(a)}}{5} + \frac{a^{5}Y^{(3)}}{7} + \text{etc.}\right),$$

$$+ U_{1}^{(a)} + U_{1}^{(3)} + \text{etc.},$$

$$- \frac{\alpha \rho. P}{2} \cdot \left(\mu^{2} - \frac{1}{3}\right);$$

$$p' = \text{const.} + 4\alpha \pi. \int \rho. d. \left(\frac{a^{5}Y^{(a)}}{5} + \frac{2a^{6}Y^{(3)}}{7} + \text{etc.}\right),$$

$$- \frac{3}{2} \cdot \left(U_{1}^{(1)} + U_{1}^{(a)} + U_{1}^{(3)} + \text{etc.}\right) + 2\alpha \rho. P. \left(\mu^{2} - \frac{1}{3}\right).$$

Si l'on retranche cette dernière équation, de la précédente; si l'on néglige l'action de la mer, que nous avons vu être insensible, soit à raison de son peu de densité, soit à cause de son peu de profondeur, ce qui fait disparaître les quantités U,(1), U,(1), etc.; enfin, si l'on suppose les couches du sphéroïde, elliptiques; on a

$$p' - P \cdot (\alpha \bar{y} + \alpha y') = \frac{5}{2} \alpha \varphi \cdot P \cdot (\mu^2 - \frac{1}{3})$$

Les coefficiens de  $\mu^* - \frac{1}{3}$  dans  $\alpha \overline{y}$  et  $\alpha \overline{y}''$  sont  $-\alpha \overline{h}$  et  $-\alpha h''$ . Soit  $\alpha q$  le coefficient de  $\mu^* - \frac{1}{3}$ , dans l'expression de p'; on aura

Le coefficient du carré de sinus de la latitude, dans l'expression de la longueur du pendule, s.
$$\phi_{\alpha}$$
:  $\frac{1}{2} = (\frac{n}{4} + \bar{h})\alpha + p\alpha$  s'éloignant des observations, fort au-delè des cureurs dont elles sont susceptibles.

On doit observer que  $\alpha(\bar{h} + h'')$  est l'ellipticité de la surface de l'atmosphère supposée, et par conséquent celle de la surface de la mer, ces deux surfaces étant constamment à la même distance l'une de l'autre. A la surface du sphéroïde, la pesanteur p' doit être augmentée de la quantité  $2\alpha(l-\alpha r'')$ P. En nommant donc  $\alpha \bar{q}$  le coefficient de  $\mu^2 - \frac{1}{3}$  dans l'expression de la pesanteur à cette surface, on aura

$$2\alpha h'' = \alpha \bar{q} - \alpha q;$$

ce qui donnerait la différence ah" des ellipticités de l'atmosphère et du sphéroïde terrestre, si l'on connaissait par les expériences du pendule, les valeurs de q et de q. Mais il résulte de ces expériences faites la plupart, au niveau de la mer, ou peu au-dessus, que la valeur de ah" est très petite, et presque insensible, ce qui est conforme à ce que nous avons dit précédemment. La surface de l'atmosphère supposée, étant celle à laquelle on rapporte les mesures des degrés et de la pesanteur; il paraît naturel de corriger ces mesures, en ayant seulement égard à la distance des points où l'on observe, à cette surface; à moins que l'élévation de ces points ne soit assez rapide, pour que l'on soit assuré qu'ils n'appartiennent point à la partie elliptique du sphéroïde terrestre. Telle est la ville de Quito, où l'on a mesuré des degrés du méridien; et la longueur du pendule à secondes. Nous allons donc examiner l'effet de l'attraction d'un plateau élevé, sur la pesanteur.

on Si l'on conçoit une serie de couches circulaires, horizontales, et disposées de manière que leurs centres soient sur une même verticale; et que l'on place Quito au centre de la couche supérieure; en nommant e, la densité de ces couches, R le rayon de l'une d'elles, dont le centre est à la distance r de Quito; la somme des molécules de cette couche, divisées par leurs distances respectives à Quito, sera se la sera distances respectives à Quito, sera de la s

$$2\pi\rho_1.(\sqrt{R^2+r^2}-r).$$

R étant supposé fort grand relativement à r, cette fonction se réduit à La densité des Cordillières n'est donc qu'un cinquièmes cériq upq trot

movenne densité de la Terré (Tite A): 1988 différente de celle de l'eau,

elle reste donc toujours fort petite, si, comme on doit le supposer ici, Rest une petite fraction du rayon terrestre. Elle n'apporte ainsi qu'un terme insensible dans l'équation de l'équilibre de l'atmosphère, et par conséquent la somme de ces fonctions ne produit aucun changement sensible dans la valeur de la distance de Quito à la surface de l'atmosphère, distance que je désignerai par  $\alpha \gamma'''$ ; en sorte que  $\alpha l - \alpha \gamma'''$  est la hauteur de Quito au-dessus du niveau de la mer. L'attraction de la couche que nous venons de considérer, produit dans la pesanteur p, à Quito, un accroissement égal à la différentielle de la fonction précédente, prise par rapport à r et divisée par -dr; cet accroissement est à très peu près égal à 277p,; il est indépendant de R, et il peut être sensible pour toute la montagne, pour laquelle il devient  $2\pi\rho_i r'$ , r' étant la hauteur de la montagne au-dessus du niveau du sphéroïde terrestre. La rapidité avec laquelle le plateau s'élève, et le peu de différence entre les surfaces de la mer et du sphéroïde, rendent r' très peu différent de al-ay"; on peut donc l'obtenir par l'observation du baromètre. La pesanteur P de la Terre étant à fort peu près  $\frac{4}{3}\pi$ . D, D étant la moyenne densité de la Terre; l'accroissement de la pesanteur, dû à l'action de la montagne, sera

 $\frac{3}{2}$  P.  $\frac{\beta_1}{D}$ .  $(\alpha l - \alpha y''')$ .

Le rayon terrestre étant pris pour l'unité, on a relativement à Quito

$$al-ay'''=\frac{1}{2237};$$

la diminution de la pesanteur, depuis le niveau de la mer, est donc pour cette ville onn une meios soumes amol oup originant ob espaquib

Bouguer a conclu de ses expériences sur la longueur du pendule, cette diminution égale à P 1331; ce qui donne

 $2\pi\rho$ ,  $(\sqrt{R^2+r^2}-r)$ .

Refer tuppose fort grand relativement  $\frac{1}{a}r$ , cette fonction so reduit  $\frac{1}{a}r$ 

La densité des Cordillières n'est donc qu'un cinquième environ de la moyenne densité de la Terre. Elle est peu différente de celle de l'eau, qui, d'après l'expérience de Cavendish, est D.0,182. Le peu de densité de ces montagnes résulte encore du peu d'effet de leur attraction sur le fil-à-plomb dans les observations des astronomes français qui ont remarqué que ces montagnes sont très volcaniques, et qu'ainsi elles doivent avoir de grandes cavités dans leur intérieur.

sphere, distance que je designeni par  $sj^m$ ; en sonté que  $aj - aj^m$  est la hapteur de Quito au-dessus du riveau de la mer. L'attraction de la couche que nous venons de considérer, produit dans la pesanteur p, à Quito, un accroissement égal à la différentielle de la fonction précédente, prise par rapport à r et divisée par -air, cet accroissement est à tres peu près égal à  $a\pi p$ , ; il est indépendant de R. et il peut être sensible pour toute la montagne, pour laquelle il devient  $a\pi p$ , r étant la hauteur de la montagne au-dessus du niveau du sphéroïde torrestre. La rapidité avec laquelle le pateun s'élève, et le peu de différent de les surfaces de la mer et du sphéroïde, rendent r très peu différent de  $ab - ap^m$ ; en peut donc l'obtanir par l'observation du baromètre. La densité de la Terre étant à fort peu pres  $\frac{1}{3}\pi$ . D. D'étant la moyenne la montagne, sera patre et sur pres  $\frac{1}{3}\pi$  D. D'étant la moyenne als montagne, sera patre et sur pris pour l'unité; on a relativement à Quite et rayon terrestre étant pris pour l'unité; on a relativement à Quite en tous et au de contra cau de tous et au contra que de traire et au traire au contra contra cau de contra contra cau de contra contra cau de contra cau de contra co

relativement à ce troisieme axe; les co étant comptes du ménchen

#### CHAPITRE III.

De l'axe de rotation de la Terre.

8. Soit,  $a(1+\alpha y_1)$  le rayon d'une couche du sphéroïde terrestre, l'origine de ce rayon étant supposée au centre de gravité du sphéroïde;  $y_1$  étant fonction de a, du sinus de la latitude, que je désignerai par  $\mu_1$ , et de la longitude que je désignerai par  $\varpi_1$ . Je suppose  $y_1$  développé dans une suite de la forme

$$Y_{1}^{(1)} + Y_{1}^{(2)} + Y_{1}^{(3)} + etc.$$

Y,(i) étant assujetti à l'équation aux différences partielles

$$o = \left[ \frac{d \cdot (1 - \mu_1^2) \cdot \left( \frac{d Y_1^{(i)}}{d \mu_1} \right)}{d \mu_1} + \frac{\left( \frac{d d Y_1^{(i)}}{d \pi_1^2} \right)}{1 - \mu_1^2} + i \cdot \overline{i + 1} \cdot Y_1^{(i)} \right].$$

Transportons l'origine des rayons terrestres, à un point quelconque qui ne soit éloigné du centre de gravité du sphéroïde, que d'une quantité de l'ordre a; il est facile de voir que cela ne fait qu'augmenter Y, (1) de la quantité

$$Q\mu_1 + Q^{(1)} \cdot \sqrt{1 - \mu_1^2} \cdot \sin \varpi_1 + Q^{(2)} \cdot \sqrt{1 - \mu_1^2} \cdot \cos \varpi_1$$
 (a)

Concevons par cette nouvelle origine, un second axe parallèle au premier, et rapportons-y les variables  $\mu_1$  et  $\varpi_1$ . Elles ne différeront des précédentes, que de quantités de l'ordre  $\alpha$ ; en négligeant donc les quantités de l'ordre  $\alpha^2$ , les valeurs de  $Y_1^{(a)}$ ,  $Y_1^{(3)}$ , etc. seront les mêmes que les précédentes; seulement, la fonction  $Y_1^{(1)}$  sera augmentée de la quantité (a). Nous pourrons ainsi exprimer avec cette condition, le rayon d'une couche terrestre rapporté à ce second axe, par  $a \cdot (r + \alpha y_1)$ .

Concevons ensuite par la nouvelle origine, un troisième axe aboutissant à un point quelconque de la surface du sphéroïde, pour lequel  $\mu$ , et  $\varpi$ , soient cos A et  $\Pi$ . Soient  $\mu$  et  $\varpi$ , ce que deviennent  $\mu$ , et  $\varpi$ .

relativement à ce troisième axe; les ø étant comptés du méridien qui passe par les extrémités du second et du troisième axe. On aura par les formules de la Trigonométrie sphérique,

$$\mu = \cos A \cdot \mu_1 + \sin A \cdot \sqrt{1 - \mu_1^2} \cdot \cos (\varpi_1 - \Pi);$$

$$\sqrt{1 - \mu^2} \cdot \sin \varpi = \sqrt{1 - \mu_1^2} \cdot \sin (\varpi_1 - \Pi).$$

Ce qui donne

$$\sqrt{1-\mu^2}$$
.  $\cos \varpi = \cos A \cdot \sqrt{1-\mu_1^2}$ .  $\cos (\varpi_1 - \Pi) - \sin A \cdot \mu_1$ 

Désignons par  $\overline{x}, \overline{y}, \overline{z}$ , les trois coordonnées d'une molécule dm, de la couche du sphéroïde dont le rayon est  $a.(1+\alpha y_1)$ , rapportées, la première au troisième axe dont nous venons de parler; la seconde, au plan du méridien origine des  $\varpi$ , et la troisième au plan perpendiculaire à ce méridien. On aura

$$\bar{x} = a \cdot (1 + \alpha y_1) \cdot \mu,$$

$$\bar{y} = a \cdot (1 + \alpha y_1) \cdot \sqrt{1 - \mu^2} \cdot \cos \varpi,$$

$$\bar{z} = a \cdot (1 + \alpha y_1) \cdot \sqrt{1 - \mu^2} \cdot \sin \varpi.$$

On a ensuite en exprimant par p la densité de dm,

$$dm = \rho a^2 \cdot (1 + \alpha y_1)^2 \cdot d\mu_1 \cdot d\omega_1 \cdot d \cdot a \cdot (1 + \alpha y_1);$$

cette dernière caractéristique différentielle d étant uniquement relative à la variation de a. On aura donc

$$\int x \, \bar{y} \, dm = \frac{1}{5} \cdot \int \rho \, d\mu_1 \, d\omega_1 \, da^5 \cdot (1 + \alpha y_1)^5 \cdot \mu \cdot \sqrt{1 - \mu^2} \cdot \cos \varpi,$$

$$\int x \, \bar{z} \, dm = \frac{1}{5} \cdot \int \rho \, d\mu_1 \, d\omega_1 \, da^5 \cdot (1 + \alpha y_1)^5 \cdot \mu \cdot \sqrt{1 - \mu^2} \cdot \sin \varpi,$$

$$\int \bar{y} \, \bar{z} \, dm = \frac{1}{5} \cdot \int \rho \, d\mu_1 \, d\omega_1 \, da^5 \cdot (1 + \alpha y_1)^5 \cdot (1 - \mu^2) \cdot \sin \varpi \cdot \cos \varpi,$$

$$\int (\bar{y}^2 - \bar{z}^2) \cdot dm = \frac{1}{5} \cdot \int \rho \, d\mu_1 \, d\omega_1 \, da^5 \cdot (1 + \alpha y_1)^5 \cdot (1 - \mu^2) \cdot (\cos^2 \varpi - \sin^2 \varpi).$$
If we integral as defined the prior of the pri

Les intégrales doivent être prises depuis  $\mu_1 = -1$  jusqu'à  $\mu_1 = 1$ ; depuis  $\sigma_1 = 0$  jusqu'à  $\sigma_2 = 1$ . En

substituant pour  $\mu$ ,  $\sqrt{1-\mu^2}$ ,  $\sin \varpi$ ,  $\sqrt{1-\mu^2}$ .  $\cos \varpi$ , leurs valeurs précédentes en  $\mu_1$  et  $\varpi_1$ , on aura

$$f\bar{x}\,\bar{y}.dm = \alpha. \int_{\rho} d\mu_{1}.d\omega_{1}.d\omega^{5}y_{1}.\begin{cases} \frac{\pi}{2}.\sin A.\cos A.\left(\frac{1}{3} - \mu_{1}^{2}\right) \\ +\cos 2A.\mu_{1}.\sqrt{1 - \mu_{1}^{2}}.\cos (\omega_{1} - \Pi) \\ +\frac{1}{2}.\sin A.\cos A.(1 - \mu_{1}^{2}).\cos (2\omega_{1} - 2\Pi) \end{cases}$$

$$f\bar{x}\,\bar{z}.dm = \alpha \int_{\rho} d\mu_{1}.d\omega_{1}.d\omega^{5}.y_{1}.\begin{cases} \cos A.\mu_{1}.\sqrt{1 - \mu_{1}^{2}}.\sin (\omega_{1} - \Pi) \\ +\frac{1}{2}.\sin A.(1 - \mu_{1}^{2}).\sin (2\omega_{1} - 2\Pi) \end{cases}$$

$$f\bar{y}\,\bar{z}.dm = \alpha.\int_{\rho} d\mu_{1}.d\omega_{1}.d\omega^{5}.y_{1}.\begin{cases} \frac{1}{2}.\cos A.(1 - \mu_{1}^{2}).\sin (2\omega_{1} - 2\Pi) \\ -\sin A.\mu_{1}.\sqrt{1 - \mu_{1}^{2}}.\sin (\omega_{1} - \Pi) \end{cases}$$

$$f(\bar{y}^{2} - \bar{z}^{2}).dm = \alpha.\int_{\rho} d\mu_{1}.d\omega_{1}.d\omega^{5}.y_{1}.\begin{cases} \frac{1}{2}.\sin A.(3\mu_{1}^{3} - 1) \\ -2.\sin A.\cos A.\mu_{1}.\sqrt{1 - \mu_{1}^{2}}.\cos (\omega_{1} - \Pi) \end{cases}$$

$$+\frac{1}{2}.\sin A.\cos A.\mu_{1}.\sqrt{1 - \mu_{1}^{2}}.\cos (\omega_{1} - \Pi)$$

$$+\frac{1}{2}.\sin A.\cos A.\mu_{1}.\sqrt{1 - \mu_{1}^{2}}.\cos (\omega_{1} - \Pi)$$

$$+\frac{1}{2}.\sin A.\cos A.\mu_{1}.\sqrt{1 - \mu_{1}^{2}}.\cos (\omega_{1} - \Pi)$$

Dans ces équations, les coefficiens de  $\rho$ .  $d\mu_1 d\varpi_1$ . d. d. d. sont compris dans la forme  $Y_1^{(a)}$ ; il faut donc par le n° 17 du troisième Livre, ne considérer dans  $y_1$ , que le terme  $Y_1^{(a)}$ . L'expression générale de ce terme est

$$h^{(0)} \cdot \left(\mu_1^2 - \frac{1}{3}\right) + h^{(1)} \cdot \mu_1 \cdot \sqrt{1 - \mu_1^2} \cdot \sin \varpi_1 + h^{(2)} \cdot \mu_1 \cdot \sqrt{1 - \mu_1^2} \cdot \cos \varpi_1 + h^{(3)} \cdot (1 - \mu_1^2) \cdot \sin 2\varpi_1 + h^{(4)} \cdot (1 - \mu_1^2) \cdot \cos 2\varpi_1;$$

h(0), h(1), h(1), h(1), h(1) étant des fonctions de a. On trouvera ainsi

$$\int x \, y \, .dm = -\frac{4\pi}{15} \cdot \alpha \cdot \sin 2A \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^5 h^{(4)}$$

$$+ \frac{4\pi}{15} \cdot \alpha \cdot \cos 2A \cdot \left\{ \begin{array}{c} \sin \Pi \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^5 h^{(4)} \\ + \cos \Pi \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^5 h^{(4)} \end{array} \right\}$$

$$+ \frac{4\pi}{15} \cdot \alpha \cdot \sin 2A \cdot \left\{ \begin{array}{c} \sin 2\Pi \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^5 h^{(3)} \\ + \cos 2\Pi \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^5 h^{(4)} \end{array} \right\};$$

$$\int \overline{x} \, \overline{z} \, .dm = \frac{4\pi . \alpha}{15} . \cos A \cdot \left\{ \begin{array}{c} \cos \Pi . \int \rho . d . a^5 h^{(1)} \\ -\sin \Pi . \int \rho . d . a^5 h^{(2)} \end{array} \right\} \\
+ \frac{8\pi . \alpha}{15} . \sin A \, \overline{z} \left\{ \begin{array}{c} \cos 2\Pi . \int \rho . d . a^5 h^{(2)} \\ -\sin 2\Pi . \int \rho . d . a^5 h^{(2)} \end{array} \right\} , \\
\int \overline{y} \, \overline{z} . dm = \frac{8\pi . \alpha}{15} . \cos \cdot \left\{ \begin{array}{c} \cos 2\Pi . \int \rho . d . a^5 h^{(2)} \\ -\sin 2\Pi . \int \rho . d . a^5 h^{(2)} \end{array} \right\} , \\
-\frac{4\pi . \alpha}{15} . \sin A \, \overline{z} \left\{ \begin{array}{c} \cos \Pi . \int \rho . d . a^5 h^{(1)} \\ -\sin \Pi . \int \rho . d . a^5 h^{(2)} \end{array} \right\} , \\
\int (\overline{y}^2 - \overline{z}^2) . dm = \frac{8\pi . \alpha}{15} . \sin^2 A . \int \rho . d . a^5 h^{(2)} \\
-\frac{8\pi . \alpha}{15} . \sin A . \cos A \cdot \left\{ \begin{array}{c} \sin \Pi . \int \rho . d . a^5 h^{(1)} \\ +\cos \Pi . \int \rho . d . a^5 h^{(2)} \end{array} \right\} , \\
+\frac{8\pi . \alpha}{15} . (\mathbf{1} + \cos^2 A) . \left\{ \begin{array}{c} \sin 2\Pi . \int \rho . d . a^5 h^{(3)} \\ +\cos 2\Pi . \int \rho . d . a^5 h^{(4)} \end{array} \right\} .$$

Maintenant, si nous imaginons que l'axe du sphéroïde auquel nous venons de rapporter les coordonnées  $\overline{x}$ ,  $\overline{y}$ ,  $\overline{z}$ , soit fixe dans le sphéroïde et dans l'espace, de manière cependant que le sphéroïde tourne librement autour de lui; et si nous concevons ce sphéroïde recouvert en tout ou en partie, par la mer; on voit par le chapitre précédent, que le fluide peut toujours prendre un état d'équilibre, qu'il est possible d'obtenir par des approximations successives.

Je suppose la mer parvenue à cet état : elle forme alors avec le sphéroïde terrestre, un ensemble dont toutes les parties sont immobiles entre elles, et peuvent être supposées invariablement unies. Je nomme  $\alpha$ .  $H^{(o)}$ ,  $\alpha$ .  $H^{(i)}$ ,  $\alpha$ . H<sup>(i)</sup>, les valeurs précédentes de  $\int \overline{x} \, \overline{y} \, . dm$ ,  $\int \overline{x} \, \overline{z} \, . dm$ ,  $\int \overline{y} \, \overline{z} \, . dm$ ,  $\int (\overline{y}^2 - \overline{z}^2) \, . dm$ : je nomme pareillement  $\alpha$ .  $H^{(o)}$ ,  $\alpha$ .  $H^{(i)}$ ,  $\alpha$ .  $H^{(i)}$ ,  $\alpha$ .  $H^{(i)}$ , les valeurs des mêmes intégrales rapportées à la mer. On aura relativement à la Terre entière,

$$\int \overline{x} \, \overline{y} \, .dm = \alpha \cdot (\mathbf{H}^{(0)} + \mathbf{H}^{\prime(0)}), \quad \int \overline{x} \, \overline{z} \, .dm = \alpha \cdot (\mathbf{H}^{(1)} + \mathbf{H}^{\prime(1)}), 
\int \overline{y} \, \overline{z} \, .dm = \alpha \cdot (\mathbf{H}^{(2)} + \mathbf{H}^{\prime(2)}); \quad \int (\overline{y}^2 - \overline{z}^2) \, .dm = \alpha \cdot (\mathbf{H}^{(3)} + \mathbf{H}^{\prime(3)}).$$

Maintenant, si l'on change le plan des y et des z, de manière qu'en

passant toujours par l'axe des  $\overline{x}$ , il forme un angle arbitraire  $\varepsilon$  avec ce plan: en nommant v' et z' les coordonnées rapportées à ce nouveau plan, on aura  $\bar{y}' = \bar{y} \cdot \cos \varepsilon - \bar{z} \cdot \sin \varepsilon$ 

$$\bar{y}' = \bar{y} \cdot \cos \varepsilon - \bar{z} \cdot \sin \varepsilon,$$
  
 $\bar{z}' = \bar{z} \cdot \cos \varepsilon + \bar{y} \cdot \sin \varepsilon;$ 

ce qui donne

$$\int \overline{x} \, \overline{y}' \cdot dm = \alpha \cdot (\mathbf{H}^{(0)} + \mathbf{H}'^{(0)}) \cdot \cos \varepsilon - \alpha \cdot (\mathbf{H}^{(1)} + \mathbf{H}'^{(1)}) \cdot \sin \varepsilon,$$

$$\int \overline{x} \, \overline{z}' \cdot dm = \alpha \cdot (\mathbf{H}^{(1)} + \mathbf{H}'^{(1)}) \cdot \cos \varepsilon + \alpha \cdot (\mathbf{H}^{(0)} + \mathbf{H}'^{(0)}) \cdot \sin \varepsilon,$$

$$\int \overline{y}' \, \overline{z}' \cdot dm = \alpha \cdot (\mathbf{H}^{(0)} + \mathbf{H}'^{(0)}) \cdot (\cos^2 \varepsilon - \sin^2 \varepsilon)$$

$$+ \alpha \cdot (\mathbf{H}^{(3)} + \mathbf{H}'^{(3)}) \cdot \sin \varepsilon \cdot \cos \varepsilon.$$

L'axe des x sera un axe principal de rotation, autour duquel la Terre tournera librement, si l'on satisfait aux trois équations

$$\int \overline{x} \, \overline{y}' \cdot dm = 0$$
,  $\int \overline{x} \, \overline{z}' \cdot dm = 0$ ,  $\int \overline{y}' \, \overline{z}' \cdot dm = 0$ .

Les deux premières donnent

$$H^{(0)} + H^{(0)} = 0, H^{(1)} + H^{(1)} = 0.$$

La troisième donne

tang 
$$2\epsilon = -\frac{2.(H^{(2)} + H'^{(2)})}{H^{(3)} + H'^{(3)}}$$
.

Pour que le centre de gravité de la Terre soit libre, et dans l'axe principal de rotation, il faut que l'on ait pour toute la Terre,

$$\int x.dm = 0$$
,  $\int \overline{y}'.dm = 0$ ,  $\int \overline{z}'.dm = 0$ ;

or on a pour le sphéroïde terrestre

$$\int \overline{x} \cdot dm = \frac{1}{4} \cdot \int \rho \cdot d\mu_1 \cdot d\varpi_1 \cdot d \cdot a^4 \cdot (1 + \alpha y_1)^4 \cdot \mu,$$

$$\int \overline{y} \cdot dm = \frac{1}{4} \cdot \int \rho \cdot d\mu_1 \cdot d\varpi_1 \cdot d \cdot a^4 \cdot (1 + \alpha y_1)^4 \cdot \sqrt{1 - \mu^4} \cdot \cos \varpi;$$

$$\int \overline{z} \cdot dm = \frac{1}{4} \cdot \int \rho \cdot d\mu_1 \cdot d\varpi_1 \cdot d \cdot a^4 \cdot (1 + \alpha y_1)^4 \cdot \sqrt{1 - \mu_1^4} \cdot \sin \varpi.$$

En substituant pour  $\mu$ ,  $\sqrt{1-\mu^2}$ ,  $\sin \varpi$ ;  $\sqrt{1-\mu^2}$ .  $\cos \varpi$ , leurs valeurs en  $\mu$ , et  $\varpi$ , on aura

$$\begin{split} & \int \overline{x}.dm = \alpha. \int \rho.d\mu_1.d\varpi_1.d.a^4y_1. [\cos A.\mu_1 + \sin A.\sqrt{1 - \mu_1^2}.\cos(\varpi_1 - \Pi)], \\ & \int \overline{y}.dm = \alpha. \int \rho.d\mu_1.d\varpi_1.d.a^4y_1. [\cos A.\sqrt{1 - \mu_1^2}.\cos(\varpi_1 - \Pi) - \sin A.\mu_1], \\ & \int \overline{z}.dm = \alpha. \int \rho.d\mu_1.d\varpi_1.d.a^4y_1.\sqrt{1 - \mu_1^2}.\sin(\varpi_1 - \Pi). \end{split}$$

Les coefficiens de  $\rho.d\mu_1.d\varpi_1.d.a^4y_1$ , étant compris dans la forme  $Y_1^{(1)}$ , il ne faut, par le n° cité du troisième livre de la Mécanique céleste, considérer dans  $y_1$  que la quantité  $Y_1^{(1)}$ . L'expression générale de cette fonction est

$$q^{(0)} \cdot \mu_1 + q^{(1)} \cdot \sqrt{1 - \mu_1^2} \cdot \sin \varpi_1 + q^{(2)} \cdot \sqrt{1 - \mu_1^2} \cdot \cos \varpi_1$$

Il faut, par ce qui précède, augmenter Y<sup>(1)</sup>, de la fonction (a). On aura ainsi relativement au sphéroïde terrestre,

$$\int \overline{x} \cdot dm = \frac{4}{3} \alpha \pi \cdot \cos A \cdot (\int \rho \cdot d \cdot a^4 q^{(0)} + Q^{(0)} \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^4) \\
+ \frac{4}{3} \alpha \pi \cdot \sin A \cdot \left\{ \sin \Pi \cdot (\int \rho \cdot d \cdot a^4 q^{(0)} + Q^{(0)} \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^4) \right\} \\
+ \cos \Pi \cdot (\int \rho \cdot d \cdot a^4 q^{(0)} + Q^{(0)} \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^4) \right\} \\
\int \overline{y} \cdot dm = \frac{4}{3} \alpha \pi \cdot \cos A \cdot \left\{ \sin \Pi \cdot (\int \rho \cdot d \cdot a^4 q^{(0)} + Q^{(0)} \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^4) \right\} \\
- \frac{4}{3} \alpha \pi \cdot \sin A \cdot \left[ \int \rho \cdot d \cdot a^4 q^{(0)} + Q^{(0)} \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^4 \right] \right\} \\
- \frac{4}{3} \alpha \pi \cdot \sin A \cdot \left[ \int \rho \cdot d \cdot a^4 q^{(0)} + Q^{(0)} \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^4 \right] \right\} \\
- \int \overline{z} \cdot dm = \frac{4}{3} \alpha \pi \cdot \left\{ \cos \Pi \cdot \left[ \int \rho \cdot d \cdot a^4 q^{(0)} + Q^{(0)} \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^4 \right] \right\} \\
- \sin \Pi \cdot \left[ \int \rho \cdot d \cdot a^4 q^{(0)} + Q^{(0)} \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^4 \right] \right\}.$$

Soient  $\alpha L^{(o)}$ ,  $\alpha L^{(i)}$ ,  $\alpha L^{(a)}$ , ces trois valeurs de fx.dm, fy.dm, fz.dm; et désignons par  $\alpha L'^{(o)}$ ,  $\alpha L'^{(i)}$ ,  $\alpha L'^{(a)}$ , les mêmes intégrales relatives à la mer. La condition que l'axe principal passe par le centre de gravité de la Terre entière et soit l'origine des rayons terrestres, donnera les trois équations

ces trois équations réunies aux précédentes

$$H^{(o)} + H'^{(o)} = 0$$
,  $H^{(1)} + H'^{(1)} = 0$ ,  
 $\tan 2\varepsilon = -\frac{2(H^{(a)} + H'^{(a)})}{H^{(3)} + H'^{(3)}}$ ,

détermineront les six indéterminées A, H,  $\varepsilon$ , Q, Q<sup>(1)</sup>, Q<sup>(2)</sup>; et alors l'axe de rotation sera un axe principal, et passera par le centre de gravité de la Terre. L'existence d'un pareil axe est donc toujours possible, et les observations prouvent que tel est l'axe actuel de rotation de la Terre.

On a relativement à la mer,

$$\int \overline{x} \overline{y} . dm = \int \overline{x} \overline{y} . \alpha y' . d\mu_1 . d\varpi_1$$

 $\alpha y'$  étant sa profondeur; mais les intégrales relatives à  $\mu_1$  et  $\varpi_1$  ne peuvent être prises depuis  $\mu_1 = -1$  jusqu'à  $\mu_1 = 1$ , et depuis  $\varpi_1 = 0$ , jusqu'à  $\varpi_1 = 2\pi$ , que dans le cas où la mer recouvre entièrement le sphéroïde terrestre. Considérons ce cas particulièrement : alors, il ne faut substituer pour  $\alpha y'$ , que sa partie  $\alpha Y'^{(2)}$ . L'équation (4) du n° 2 du chapitre précédent donne

$$\mathbf{Y}^{\prime(2)} = \frac{-\overline{\mathbf{Y}}^{(2)} + \frac{3 \cdot f_{\rho} \cdot d \cdot a^{5} \mathbf{Y}^{(2)}}{5 \cdot f_{\rho} \cdot d \cdot a^{3}} - \frac{\varphi}{2} \cdot (\mu^{2} - \frac{1}{5})}{1 - \frac{3}{5 \cdot f_{\rho} \cdot d \cdot a^{3}}},$$

les quantités  $Y'^{(2)}$ ,  $\overline{Y}^{(2)}$ ,  $Y^{(2)}$ ,  $Y^{(2)}$ , se rapportant ici à l'axe des  $\mu$ . Mais rapportées à l'axe des  $\mu_1$ , elles restent les mêmes: elles ne sont que des manières différentes d'exprimer les fonctions du rayon terrestre et du rayon de chaque couche du sphéroïde, comprises dans la forme  $\alpha Y^{(2)}$ , ou assujetties à la même équation aux différences partielles. La partie de  $Y'^{(2)}$ , dépendante de  $\varphi$ , ne produit aucun terme dans  $H'^{(2)}$ ,  $H'^{(1)}$ ,  $H'^{(2)}$ , dépendante de  $\varphi$ , ne produit aucun terme dans  $H'^{(2)}$ ,  $H'^{(1)}$ ,  $H'^{(2)}$ . Pour le faire voir, considérons la valeur de  $H^{(2)}$ , ou l'intégrale  $\int \overline{x} \overline{y} \cdot Y'^{(2)} \cdot d\mu_1 \cdot d\varpi_1$ . Il est facile de voir que l'on peut donner à cette intégrale, cette forme  $\int \overline{x} \overline{y} \cdot Y'^{(2)} \cdot d\mu_1 \cdot d\varpi_1$ ; les limites des intégrales relatives à  $\mu$  et  $\varpi$ , étant comme pour  $\mu_1$  et  $\varpi_1$ ,  $\mu = -1$ ,  $\mu = 1$ ,  $\varpi = 0$ ,  $\varpi = 2\pi$ . Alors en substituant dans l'intégrale

$$\int \overline{x} \overline{y} \cdot \mathbf{Y}^{(2)} \cdot d\mu \cdot d\varpi$$
,  $\mu \sqrt{1 - \mu^2} \cdot \cos \varpi$ , pour  $\overline{x} \overline{y}$ , et  $\frac{-\frac{\varphi}{2} \cdot \left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right)}{1 - \frac{3}{5 \cdot f_1 \cdot d \cdot a^3}}$ ,

pour Y'(a); on voit que cette intégrale est nulle; ainsi cette partie de Y'(a) ne produit aucun terme dans H'(o), et l'on trouverait de la même manière qu'elle n'en produit aucun dans H'(1), H'(a), et H'(3). L'autre partie de Y'(a) peut être exprimée par

$$h'^{(0)} \cdot (\mu_1^2 - \frac{1}{3}) + h'^{(1)} \cdot \mu_1 \cdot \sqrt{1 - \mu_1^2} \cdot \sin \varpi_1 + h'^{(2)} \cdot \sqrt{1 - \mu_1^2} \cdot \cos \varpi_1 + h'^{(3)} \cdot (1 - \mu_1^2) \cdot \sin 2\varpi_1 + h'^{(4)} \cdot (1 - \mu_1^2) \cdot \cos 2\varpi_1;$$

et l'on aura

$$h'^{(i)} = \frac{-\bar{h}^{(i)} + \frac{3 \cdot \int_{\rho} \cdot d \cdot a^{5} h^{(j)}}{5 \cdot \int_{\rho} \cdot d \cdot a^{3}}}{1 - \frac{3}{5 \cdot \int_{\rho} \cdot d \cdot a^{3}}}; \quad (i)$$

en faisant successivement, s=0, s=1, s=2, s=3, s=4. Cela posé; les équations

$$H^{(0)} + H^{(0)} = 0$$
,  $H^{(1)} + H^{(1)} = 0$ ,

donnent les suivantes

$$o = \sin 2A \cdot \begin{cases} h'^{(o)} + \int \rho \cdot d \cdot a^5 h^{(o)} \\ -\sin 2\Pi \cdot (h'^{(3)} + \int \rho \cdot d \cdot a^5 h^{(3)}) \\ -\cos 2\Pi \cdot (h'^{(4)} + \int \rho \cdot d \cdot a^5 h^{(4)}) \end{cases}$$

$$-\cos 2A \cdot \begin{cases} \sin \Pi \cdot (h'^{(1)} + \int \rho \cdot d \cdot a^5 h^{(1)}) \\ +\cos \Pi \cdot (h'^{(4)} + \int \rho \cdot d \cdot a^5 h^{(4)}) \end{cases}$$

$$o = \cos A \cdot \begin{cases} \cos \Pi \cdot (h'^{(4)} + \int \rho \cdot d \cdot a^5 h^{(4)}) \\ -\sin \Pi \cdot (h'^{(5)} + \int \rho \cdot d \cdot a^5 h^{(4)}) \end{cases}$$

$$+ 2 \sin A \cdot \begin{cases} \cos 2\Pi \cdot (h'^{(4)} + \int \rho \cdot d \cdot a^5 h^{(4)}) \\ -\sin 2\Pi \cdot (h'^{(4)} + \int \rho \cdot d \cdot a^5 h^{(4)}) \end{cases}$$

Désignons par f et g, les coefficiens de  $\sin 2A$  et de  $\cos 2A$ , dans la première de ces deux équations; et par m et n, les coefficiens de  $\sin A$ 

et de cos A dans la seconde; on aura

$$\tan \mathbf{A} = -\frac{n}{m},$$

ce qui donne

$$\sin 2A = \frac{-2mn}{m^2 + n^2}; \cos 2A = \frac{m^2 - n^2}{m^2 + n^2};$$

d'où l'on tire

$$0 = -2mnf + (m^2 - n^2) \cdot g$$

En substituant pour f, g, m, n, leurs valeurs, et faisant

$$\tan \Pi = u$$
,

on trouve après les réductions, une équation du troisième degré en u, et qui conséquemment, a une racine réelle. Cette équation coïncide avec l'équation du troisième degré en u, que nous avons donnée dans le n° 27 du premier Livre, relativement aux axes principaux des corps solides.

On remplira la condition que l'axe de rotation passe par le centre de gravité de la Terre entière, en observant que l'équation (4) du n° 2 du chapitre précédent donne

$$Y'^{(1)} = \frac{-\overline{Y}^{(1)} + \frac{\int_{\rho} .d. a^{4}Y^{(1)}}{\int_{\rho} .d. a^{3}}}{1 - \frac{1}{\int_{\rho} .d. a^{3}}};$$

en désignant donc l'expression de Y'(1) par

$$q'^{(0)} \cdot \mu_1 + q'^{(1)} \cdot \sqrt{1 - \mu_1^2} \cdot \sin \varpi_1 + q'^{(2)} \cdot \sqrt{1 - \mu_1^2} \cdot \cos \varpi_1;$$

on aura

$$q'^{(i)} = \frac{-q'^{(i)} + \frac{f_{\rho} \cdot d \cdot a^{4}q^{(i)}}{f_{\rho} \cdot d \cdot a^{3}}}{1 - \frac{1}{f_{\rho} \cdot d \cdot a^{3}}}; \quad (i^{l})$$

MÉCAN. CÉL. Tome V.

en faisant successivement s = 0, s = 1, s = 2. On aura ainsi pour toute la Terre,

$$\int \overline{x} \cdot dm = \frac{4}{3} \alpha \pi \cdot \cos A \cdot \left\{ \int \rho \cdot d \cdot a^4 q^{(o)} + q'^{(o)} + Q^{(o)} \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^4 \right\} 
+ \frac{4}{3} \alpha \pi \cdot \sin A \cdot \left\{ \sin \Pi \cdot \left( \int \rho \cdot d \cdot a^4 q^{(1)} + q'^{(1)} + Q^{(1)} \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^4 \right) \right\} 
+ \cos \Pi \cdot \left( \int \rho \cdot d \cdot a^4 q^{(2)} + q'^{(2)} + Q^{(2)} \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^4 \right) \right\} 
\int \overline{y} \cdot dm = \frac{4}{3} \alpha \pi \cdot \cos A \cdot \left\{ \sin \Pi \cdot \left( \int \rho \cdot d \cdot a^4 q^{(1)} + q'^{(1)} + Q^{(1)} \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^4 \right) \right\} 
+ \cos \Pi \cdot \left( \int \rho \cdot d \cdot a^4 q^{(2)} + q'^{(2)} + Q^{(2)} \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^4 \right) \right\} 
- \frac{4}{3} \alpha \pi \cdot \sin A \cdot \left\{ \left( \int \rho \cdot d \cdot a^4 q^{(2)} + q'^{(2)} + Q^{(2)} \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^4 \right) \right\} 
\int \overline{z} \cdot dm = \frac{4}{3} \alpha \pi \cdot \left\{ \cos \Pi \cdot \left( \int \rho \cdot d \cdot a^4 q^{(1)} + q'^{(1)} + Q^{(1)} \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^4 \right) \right\} 
- \sin \Pi \cdot \left( \int \rho \cdot d \cdot a^4 q^{(2)} + q'^{(2)} + Q^{(2)} \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^4 \right) \right\}.$$

Les conditions nécessaires pour que l'axe de rotation passe par le centre de gravité de la Terre, sont que ces trois valeurs de  $\int \overline{x} . dm$ ,  $\int \overline{y} . dm$ ,  $\int \overline{z} . dm$ , soient nulles; en les égalant donc à zéro, on déterminera les trois constantes  $Q^{(o)}$ ,  $Q^{(1)}$  et  $Q^{(2)}$ . Ainsi le sphéroïde terrestre recouvert en entier par la mer en équilibre, a un axe de rotation passant par le centre commun de gravité du sphéroïde et de la mer et autour duquel le sphéroïde tourne d'une manière uniforme.

L'analyse précédente conduit à un théorème fort simple sur la détermination de cet axe. En effet, l'équation précédente (i), donne, en observant que l'on peut mettre  $\bar{h}^{(j)}$ , sous la forme  $\int d. a^5 h^{(j)}$ 

$$h'^{(i)} + \int \rho \cdot d \cdot a^5 h^{(i)} = \frac{\int (\rho - 1) \cdot d \cdot a^5 h^{(i)}}{1 - \frac{3}{5 \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^3}},$$

s devant être supposé successivement égal à 0, 1, 2, 3, 4. En substituant les diverses valeurs du premier membre de cette équation, dans les trois équations qui déterminent les quantités A,  $\Pi$  et  $\varepsilon$ , on voit que ces équations déterminent l'axe principal du sphéroïde terrestre, lorsqu'on suppose les densités  $\rho$  de ses couches, diminuées de l'unité ou de la densité de la mer.

Pareillement l'équation (i') donne

$$q^{\prime(i)} + f_{\rho} \cdot d \cdot a^{4}q^{(i)} = \frac{f(\rho - 1) \cdot d \cdot a^{4}q^{(i)}}{1 - \frac{1}{f_{\rho} \cdot d \cdot a^{3}}}$$

Si l'on fixe l'origine des coordonnées, au centre de gravité du sphéroïde terrestre modifié par la diminution précédente de ses couches, on aura  $q^{(i)} = 0$ ; les expressions de  $f\overline{x}.dm$ ,  $f\overline{y}.dm$ ,  $f\overline{z}.dm$ , égalées à zéro, donneront ainsi  $Q^{(o)}$ ,  $Q^{(i)}$ ,  $Q^{(i)}$ , nuls. Ainsi le centre de gravité de la Terre entière est le centre de gravité du sphéroïde terrestre ainsi modifié. De là résulte ce théorème:

« Si l'on conçoit la densité des couches du sphéroïde terrestre, diminuée » de la densité de la mer; et si par le centre de gravité de ce sphéroïde » imaginaire, on conçoit un axe principal de rotation de ce sphéroïde; » en faisant tourner autour de cet axe, le vrai sphéroïde terrestre et la » mer, ce fluide étant en équilibre; cet axe sera un axe principal de » rotation de la Terre entière dont le centre de gravité sera celui du » sphéroïde imaginaire. »

Ainsi, la Terre a pour axes principaux, les trois axes principaux de rotation du sphéroïde imaginaire; du moins, si la mer est assez profonde, pour qu'étant en équilibre, en tournant autour de chacun de ces axes, elle recouvre entièrement le sphéroïde terrestre. Mais il y a entre un corps solide et la Terre, cette différence, savoir, qu'en changeant d'axe principal de rotation, la figure du solide reste constante; au lieu que la Terre change de figure, en changeant d'axe principal. Les trois figures que prend sa surface, en changeant d'axe principal de rotation, ont entre elles des rapports simples et intéressans à connaître.

Considérons d'abord la mer en équilibre et tournant autour d'un de ces trois axes principaux, que je nommerai premier axe principal. Le rayon de la surface de la mer sera

$$1 + \alpha l + \alpha . (\overline{Y}^{(1)} + Y'^{(1)}) + \alpha . (\overline{Y}^{(2)} + Y'^{(2)}) + \alpha . (\overline{Y}^{(3)} + Y'^{(3)}) + \text{etc.},$$

l'origine de ce rayon étant au centre de gravité de la Terre entière.  $\alpha l$  est la profondeur moyenne de la mer, et l'on a en nommant  $\alpha m$ , la masse de ce fluide,

$$\alpha . \int l. d\mu_1 . d\varpi_1 = \alpha m.$$

龙

 $\mu_1$  étant le sinus de la latitude, et  $\varpi_1$  la longitude rapportée à ce premier axe principal. Les intégrales devant être prises depuis  $\mu_1 = -1$  jusqu'à  $\mu_1 = 1$ , et depuis  $\varpi_1 = 0$  jusqu'à  $\varpi_1 = 2\pi$ ; on aura

$$4\pi \cdot \alpha l = \alpha m$$
.

On a ensuite par le n° 3 du chapitre précédent,

$$Y'^{(i)} = \frac{-\overline{Y}^{(i)} + \frac{3f_{\rho}.d.(a^{i+3},Y^{(i)})}{(2i+1).f_{\rho}.d.a^{3}}}{1 - \frac{3}{(2i+1).f_{\rho}.d.a^{3}}};$$

et dans le cas de i=2, on a

$$\mathbf{Y}^{\prime(a)} = \frac{-\overline{\mathbf{Y}}^{(a)} + \frac{3f\rho \cdot d \cdot (a^{5}\mathbf{Y}^{(a)})}{5 \cdot f\rho \cdot d \cdot a^{8}} - \frac{\varphi}{2} \cdot (\mu_{1}^{2} - \frac{1}{\overline{3}})}{1 - \frac{3}{5 \cdot f\rho \cdot d \cdot a^{3}}}.$$

On aura ainsi

$$\mathbf{Y}^{\prime(i)} + \mathbf{\bar{Y}}^{(i)} = \frac{3 \cdot (f_{\ell} - 1) \cdot d \cdot (a^{i+3} \mathbf{Y}^{(i)})}{(2i+1) \cdot f_{\ell} \cdot d \cdot a^{3} - 3},$$

et dans le cas de i=2,

$$\mathbf{Y}^{/(2)} + \overline{\mathbf{Y}}^{(2)} = \frac{3 \cdot (\int \rho - 1) \cdot d \cdot (a^5 \mathbf{Y}^{(2)}) - \frac{5}{2} \phi \cdot (\mu_1^2 - \frac{1}{3}) \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^3}{5 \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^3 - 3},$$

nommons u la fonction

$$\frac{3.(f_{\rho}-1).d.(a^{4}Y^{(1)})}{3.f_{\rho}.d.a^{3}-3} + \frac{3.f(\rho-1).d.(a^{5}Y^{(a)})}{5.f_{\rho}.d.a^{3}-3} + \frac{3.f(\rho-1).d.(a^{6}Y^{(3)})}{7.f_{\rho}.d.a^{3}-3} + \text{etc.}$$

Le rayon de la surface de la mer sera

$$1 + \alpha l + \alpha u - \frac{\frac{5}{2} \alpha \varphi \cdot (\mu_1^2 - \frac{1}{3}) \cdot \int_{\rho} \cdot d \cdot a^3}{5 \cdot \int_{\rho} \cdot d \cdot a^3 - 3}.$$

Supposons maintenant la mer en équilibre tourner avec le sphéroïde terrestre, autour du second axe principal; en nommant  $\mu$  le sinus de la latitude rapportée à cet axe, nous aurons pour l'expression du rayon

de la surface de la mer

$$1 + \alpha l + \alpha u - \frac{\frac{5}{2}\alpha\varphi.(\mu^2 - \frac{1}{3}).f_{\rho}.d.a^3}{5.f_{\rho}.d.a^3 - 3};$$

car il est clair que les valeurs de al et de au, correspondantes aux mêmes points de la surface du sphéroïde terrestre, restent les mêmes dans les deux situations d'équilibre.

On rapportera  $\mu$ , au premier axe principal, en observant que dans la valeur de  $\mu$  en  $\mu_1$ , donnée au commencement de ce chapitre, on doit supposer  $A = \frac{\pi}{2}$ , ce qui donne

$$\mu^2 - \frac{1}{3} = \frac{(1 - \mu_1^2)}{2} \cdot \cos(2\varpi_1 - 2\Pi) - \frac{1}{2} \left(\mu_1^2 - \frac{1}{3}\right).$$

Ainsi dans la seconde situation d'équilibre de la mer, le rayon de sa surface sera

$$1 + \alpha l + \alpha u + \frac{5}{4} \cdot \alpha \varphi \cdot \left[ \mu_1^2 - \frac{1}{3} - (1 - \mu_1^2) \cdot \cos(2\pi u_1 - 2\Pi) \right] \\ - \frac{5}{5 \cdot \int_{\mathcal{P}} \cdot d \cdot \alpha^3 - 3}$$

On trouve de la même manière que la mer étant supposée en équilibre et tourner autour du troisième axe principal du sphéroïde imaginaire, le rayon de sa surface est

$$1 + \alpha l + \alpha u + \frac{\frac{5}{4} \cdot \alpha \varphi \cdot \left[ \mu_1^2 - \frac{1}{3} + (1 - \mu_1^2) \cdot \cos(2\pi u - 2\Pi) \right]}{5 \cdot \int_{\mathcal{C}} d \cdot a^3 - 3}.$$

Ainsi la moyenne de ces trois rayons est

$$1 + \alpha l + \alpha u;$$

elle est indépendante de la force centrifuge  $\alpha \varphi$ , et la même que le rayon de la mer en équilibre sur le sphéroïde terrestre sans mouvement de rotation.

L'action du Soleil et de la Lune influe sur la figure de la mer qui, par là, varie à chaque instant. Parmi ces variations d'où naissent le flux et le reflux de la mer, quelques-unes sont constantes : d'autres s'exécutent avec une grande lenteur. Celles qui sont rigoureusement constantes, concourent avec la force centrifuge, à produire la figure permanente de la mer. Les variations très lentes changent insensible-

ment cette figure; et vu leur lenteur et la tendance de la mer à se mettre promptement en équilibre, on peut supposer qu'à chaque instant, cette

figure est celle qui correspond à cet équilibre.

Soit v le complément de la déclinaison d'un astre L, 4 son ascension droite, et f sa distance au centre de la Terre, r étant celle d'une molécule dm de la surface de la mer, dont \theta et \infty sont le complément de la latitude, et la longitude; il faut par le n° 23 du troisième Livre, ajouter au second membre de l'équation (1) du n° 2 du chapitre précédent, la quantité

$$\frac{L}{f^3} \cdot (P^{(2)} + \frac{1}{f} \cdot P^{(3)} + \text{etc.});$$

la fonction

$$\frac{1}{f} \cdot \left( 1 + \frac{1}{f} \cdot P^{(1)} + \frac{1}{f^2} \cdot P^{(2)} + \text{etc.} \right)$$

étant le développement en série ordonnée par rapport aux puissances  $de^{\frac{1}{f}}$ , du radical

$$\frac{1}{\sqrt{f^2 - 2fr \cdot [\cos v \cdot \cos \theta + \sin v \cdot \sin \theta \cdot \cos (nt + \varepsilon + \varpi - \psi)] + r^2}};$$

nt étant le mouvement de rotation de la Terre. On a généralement

$$0 = \left\{ \frac{d \cdot \left[ (1 - \mu^2) \cdot \left( \frac{dP^{(i)}}{d\mu} \right) \right]}{d\mu} \right\} + \frac{\left( \frac{ddP^{(i)}}{d\varpi^2} \right)}{1 - \mu^2} + i \cdot i + 1 \cdot P^{(i)}.$$

Si l'on n'a égard qu'aux variations croissantes avec une grande lenteur par rapport au mouvement de rotation de la Terre, on aura

$$P^{(2)} = \frac{9r^2}{4} \cdot \left(\cos^2 \varphi - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right)$$

On peut négliger les termes dépendans de  $\frac{1}{f_4}$ ,  $\frac{1}{f_3}$ , etc., vu la petitesse de ces fractions. L'action de l'astre L ajoutera donc au second membre de l'équation (1) du n° 2, cette valeur de P(2) multipliée par  $\frac{L}{f^3}$ , ce qui revient à diminuer dans cette équation, le facteur  $\alpha \varphi$ , de la quantité quantite in horizon a segment of the contraction of the contraction of  $\frac{9L}{2f^3}$ . ( $\cos^2 \alpha \rightarrow \frac{1}{5}$ ). I formula the segment of the contraction of the contracti

$$\frac{9L}{2f^3} \cdot \left(\cos^2 \varphi - \frac{1}{3}\right).$$

L'analyse précédente subsistera donc toujours; et si la mer recouvrait entièrement le sphéroïde terrestre, la Terre aurait toujours pour axes principaux, ceux du sphéroïde terrestre dans lequel les densités des couches seraient diminuées de la densité de la mer. On doit observer ici que la quantité

$$\frac{9L}{2f^3} \cdot \left(\cos^2 \rho - \frac{1}{3}\right),$$

n'est qu'une fraction extrêmement petite de la valeur de aq.

Lorsque la mer ne recouvre point entièrement le sphéroide; on peut toujours, par le chapitre précédent, déterminer la profondeur ay de la mer en équilibre, par une approximation ordonnée suivant les puissances de  $\frac{1}{(\rho)}$ ,  $(\rho)$  étant la moyenne densité de la Terre, celle de la mer étant prise pour l'unité. La valeur de  $\int x y \cdot dm$ , devient relativement à la mer,  $\alpha \lceil \gamma' \cdot d\mu_1 \cdot d\varpi_1 \cdot \mu \cdot \sqrt{1 - \mu^2 \cdot \cos \varpi}$ . En substituant pour  $\gamma'$ , l'expression donnée par le chapitre précédent, et pour \u03c0 et \u22c0 leurs valeurs en  $\mu_1$  et  $\varpi_1$ ; l'intégrale précédente étendue à toutes les valeurs de  $\mu$ , et de  $\varpi$ , comprises dans les limites de la mer, donnera la valeur de  $\int x \gamma \cdot dm$ , relative à ce fluide, par une série ordonnée suivant les puissances de  $\frac{1}{(p)}$ , le premier terme de cette série, ayant pour facteur l'unité, le second terme ayant pour facteur  $\frac{1}{(\rho)}$ , et ainsi de suite. En ajoutant cette valeur à celle de  $\int x y \cdot dm$ , relative au sphéroïde terrestre, et qui a pour facteur (p) et égalant leur somme à zéro; on aura une équation dont le premier membre sera une série ordonnée par rapport aux puissances descendantes de (p), le second membre étant zéro. Les équations

$$\int \overline{x} \, \overline{z} \, . \, dm = 0$$
,  $\int \overline{y}' \, \overline{z} \, . \, dm = 0$ ,  $\int \overline{x} \, . \, dm = 0$ ,  $\int \overline{z} \, . \, dm = 0$ ,  $\int \overline{y} \, . \, dm = 0$ ,

donneront des équations semblables; et l'on en conclura par les moyens connus de l'Algèbre, les valeurs indéterminées A,  $\Pi$ ,  $\varepsilon$ ,  $Q^{(o)}$ ,  $Q^{(1)}$ ,  $Q^{(o)}$ , en séries ordonnées comme y', par rapport aux puissances descendantes de  $(\rho)$ ; ce qui déterminera l'axe principal de rotation. Mais il suffit ici d'en faire voir la possibilité.

#### CHAPITRE IV.

De la chaleur de la Terre, et de la diminution de la durée du jour par son refroidissement.

9. Soit V la chaleur d'un point quelconque d'une masse homogène, déterminé par les coordonnées orthogonales x, y, z; on a l'équation générale

 $\left(\frac{ddV}{dx^2}\right) + \left(\frac{ddV}{dy^2}\right) + \left(\frac{ddV}{dz^2}\right) = k \cdot \left(\frac{dV}{dt}\right); \quad (1)$ 

dt est l'élément du temps, et k est une constante dépendante des propriétés de la substance, relatives à la chaleur. Lorsque la masse est parvenue à son état final de température;  $\left(\frac{dV}{dt}\right)$  est nul, et alors l'équation précédente devient celle que j'ai trouvée, relativement à l'attraction des sphéroïdes, V exprimant dans ce cas, la somme des molécules du corps attirant, divisées respectivement par leurs distances au point attiré. On peut donc déterminer par l'analyse exposée dans le troisième livre de la Mécanique céleste, l'état final de la température d'une sphère échauffée d'une manière quelconque, à l'extérieur. Ce qui complète l'analogie de la théorie de la chaleur avec celle de l'attraction des sphéroïdes, est qu'il existe à la surface, des équations de la même nature. A la surface d'une sphère dont r est le rayon, on a

$$-\left(\frac{d\mathbf{V}}{dr}\right) = f\mathbf{V} - fl; \quad (2)$$

f étant une constante, et l étant une fonction dépendante de l'action échauffante des causes extérieures. Cette équation répond à l'équation à la surface des sphéroïdes attirans, que l'on trouve dans le n° 10 du troisième livre cité.

M. Fourier a donné le premier les équations fondamentales (1) et (2), dans l'excellente pièce qui a remporté le prix proposé par l'Institut sur

la théorie de la chaleur: j'en donnerai la démonstration, dans un autre livre. J'observerai ici que les quantités f et k, peuvent n'être pas rigoureusement constantes, et varier avec la température V; mais on peut sans erreur sensible, les supposer constantes, tant que l'on ne considère que de petites variations de température.

J'ai transformé l'équation (1), en coordonnées relatives à la distance r d'une molécule du globe à son centre ; à la longitude  $\varpi$  de cette molécule, et au sinus  $\mu$  de sa latitude. Elle devient alors

$$kr^{2} \cdot \left(\frac{dV}{dt}\right) = r\left(\frac{d^{2} \cdot (rV)}{dr^{2}}\right) + \left(\frac{\frac{ddV}{d\varpi^{2}}}{1-\mu^{2}}\right) + \left[\frac{d(1-\mu^{2}) \cdot \left(\frac{dV}{d\mu}\right)}{d\mu}\right] \dots (3).$$

En supposant ensuite V exprimé par une suite de termes de la forme  $c^{-n}Y^{(i)}.q^{(i)}$ , c étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité, et  $Y^{(i)}$  étant une fonction rationnelle et entière de l'ordre i, en  $\mu$ ,  $\sqrt{1-\mu^a}$ . sin  $\varpi$ , et  $\sqrt{1-\mu^a}$ . cos  $\varpi$ , genre de fonctions dont j'ai fait un grand usage dans la théorie des attractions des sphéroïdes, et qui sont telles que l'on a

$$o = \frac{\left(\frac{dd\mathbf{Y}^{(i)}}{d\omega^2}\right)}{1-\mu^2} + \left[\frac{d(\mathbf{1}-\mu\mu)\cdot\left(\frac{d\mathbf{Y}^{(i)}}{d\mu}\right)}{d\mu}\right] + i\cdot\overline{i+1}\cdot\mathbf{Y}^{(i)};$$

on aura

$$o = r \cdot \frac{d^2 \cdot rq^{(i)}}{dr^2} + knr^2 \cdot q^{(i)} - i \cdot \overline{i+1} \cdot q^{(i)}.$$

Pour intégrer cette équation, soit

$$r\sqrt{nk}=z$$
,  $rq^{(i)}=q'$ ;

elle devient

asimply is moved 
$$0 = \frac{ddq'}{dz^2} + q' - \frac{i \cdot \overline{i+1} \cdot q'}{z^2}.$$

Faisons, en observant qu'ici la caractéristique  $\Sigma$  embrasse tous les termes depuis s nul jusqu'à l'infini,

$$q' = \frac{\Lambda}{\sqrt{nk}} \cdot \Sigma \cdot \left[ \frac{F^{(i)}}{z^{2i}} \cdot \sin(z+\theta) + \frac{F^{(i)}}{z^{2i+1}} \cdot \cos(z+\theta) \right];$$

MÉCAN. CÉL. Tome V.

TO

growth purpose par the

Legendre, 1789, p. 409

C.3. J. 1823, p. 250.

A et  $\theta$  étant deux constantes arbitraires. En substituant cette valeur, dans l'équation différentielle précédente, et comparant séparément les termes multipliés par  $\frac{\sin (z+\theta)}{z^{2}}$ , et ceux qui sont multipliés par  $\frac{\cos (z+\theta)}{z^{2}+1}$ ; on formera les deux équations

$$2 \cdot (2s-1) \cdot \mathbf{F}^{(i-1)} = (i-2s+2) \cdot (i+2s-1) \cdot \mathbf{F}^{(i-1)},$$

$$4s \cdot \mathbf{F}^{(i)} = -(i-2s+1) \cdot (i+2s) \cdot \mathbf{F}^{(i-1)};$$

ce qui donne

$$\mathbf{F}^{(i)} = \underbrace{-\frac{(i-2s+1).(i-2s+2).(i+2s-1).(i+2s)}{4.2s.(2s-1)}}_{\mathbf{F}^{(i-1)}};$$

d'où l'on tire en intégrant et faisant comme on le peut, F(0) = 1;

$$\mathbf{F}^{(i)} = \pm \frac{(i-2s+1).(i-2s+2)....(i+2s)}{2^{2s}.1.2.3...2s};$$

le signe + a lieu si s est pair, et le signe -, s'il est impair. L'expression précédente de  $F'^{(r-1)}$  donne

$$F^{(s)} = \frac{(i-2s).(i+2s+1)}{2.(2s+1)}.F^{(s)}.$$

On aura ainsi

$$q^{(i)} = A \cdot \Sigma \cdot \left[ \frac{F^{(i)}}{z^{2i+1}} \cdot \sin(z+\theta) + \frac{F'^{(i)}}{z^{2i+2}} \cdot \cos(z+\theta) \right].$$

i étant ici un nombre entier positif, cette valeur de  $q^{(i)}$  n'est composée que d'un nombre fini de termes. Pour en exclure, comme on doit le faire, ceux qui deviennent infinis lorsque r est nul,  $q^{(i)}$  étant toujours fini, même au centre; il faut faire  $\theta$  nul, si i est pair, et  $\theta = \frac{\pi}{2}$ , si i est impair,  $\pi$  étant la demi-circonférence dont le rayon est l'unité.

L'équation (2) donne à la surface où nous supposerons que r devient a

$$-\frac{dq^{(i)}}{dr} = fq^{(i)}.$$

En désignant a Vnk par s, et nommant Z et Z', les coefficiens de

A. sinz, et de A. cosz, dans lesquels on change z en &, on aura

$$o = \sin \epsilon \cdot \left[ fZ + \frac{\epsilon}{a} \cdot \left( \frac{dZ}{d\epsilon} \right) - \frac{\epsilon}{a} \cdot Z' \right] \dots (4),$$

$$+ \cos \epsilon \cdot \left[ fZ' + \frac{\epsilon}{a} \cdot \left( \frac{dZ'}{d\epsilon} \right) + \frac{\epsilon}{a} \cdot Z \right].$$

Cette équation est transcendante : elle donne pour & et par conséquent pour n, une infinité de valeurs auxquelles correspondent autant de fonctions de la forme Y(1), et qui sont déterminées par l'état initial de la chaleur du globe.

L'équation précédente a pour une de ses racines, e=0, et la valeur correspondante de  $q^{(i)}$  est  $\beta r^i$ ,  $\beta$  étant une constante arbitraire.

Si l'on développe la partie de la fonction l, de l'équation (2), qui est indépendante du temps, dans une suite de la forme

Y'(i) étant assujetti à la même équation aux différences partielles que Y(i); l'équation (2) donnera en comparant les fonctions semblables,

-roo ellectroni — 
$$i\beta . a^{i-1} . Y^{(i)} = f\beta . a^{i}Y^{(i)} - fY^{(i)}$$
, is inconsection

ce qui donne

be terms 
$$\beta = \frac{1}{a^i} \cdot \left(\frac{i}{af}\right);$$

ainsi la partie de la chaleur V d'un point du globe, indépendante du temps, et qui finit par être sa température finale, est

$$Y'^{(0)} + \frac{1}{1 + \frac{1}{af}} \cdot \frac{r}{a} \cdot Y'^{(1)} + \frac{1}{1 + \frac{2}{af}} \cdot \frac{r^2}{a^2} \cdot Y'^{(2)} + \text{etc.}$$

On peut observer ici que cette partie de V, varie très lentement pour la Terre, près de la surface, à cause de la grandeur du rayon a. Sa variation est insensible dans les mines les plus profondes; ainsi l'accroissement observé dans la chaleur des mines, à mesure que l'on y descend, n'en dépend point, et paraît indiquer que le globe terrestre n'est point encore parvenu à son état final de température.

On représente assez bien la température moyenne des climats, en la faisant proportionnelle au produit de vingt-sept degrés centésimaux, par le carré du cosinus de la latitude. En supposant donc que la valeur de Y<sup>(a)</sup> relative à la chaleur initiale de la Terre, a déjà disparu, en sorte qu'il n'y ait de sensible maintenant, que la fonction de ce genre, relative à la chaleur solaire; on aura

$$Y^{\prime(2)} = 27^{\circ} \cdot (\frac{1}{3} - \mu^{2}).$$

La grandeur du rayon terrestre réduit à très peu près l'équation (4) à celle-ci,

$$o = Z \cdot \sin \varepsilon + Z' \cdot \cos \varepsilon.$$

En y supposant successivement, i=0, i=1, i=2, etc., on verra facilement que la plus petite valeur de  $\varepsilon$ , autre que  $\varepsilon=0$ , est  $\pi$  dans le cas de i nul,  $\pi$  étant le rapport de la circonférence au diamètre : elle est comprise entre  $\pi$  et  $\frac{3}{2}\pi$ , dans le cas de i=1; entre  $\frac{3}{2}\pi$  et  $2\pi$ , lorsque i=2; entre  $2\pi$  et  $\frac{5}{2}\pi$ , lorsque i=3, et ainsi du reste. Pour une même valeur de i, les exponentielles  $c^{-n}$  disparaîtront par l'accroissement du temps, les unes après les autres; l'exponentielle correspondante à la plus petite valeur de n et de  $\varepsilon$ , disparaissant la dernière. Pareillement, tous les termes correspondans à ces plus petites valeurs, disparaîtront dans l'ordre de grandeur de i, en sorte qu'avant l'établissement de la température finale, il ne restera de sensible, que le terme

Je supposerai ici, la Terre parvenue à cet état. ε est, comme on l'a vu, égal à π; mais l'équation (4) donne plus exactement,

d'où l'on tire 
$$n = \frac{\pi^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{af}\right)}{a^2 k},$$
 et 
$$V = \frac{A}{r} \cdot c^{-r\delta} \cdot \sin \frac{r}{a} \cdot \pi \cdot \left(1 - \frac{1}{af}\right).$$

Cette équation donne à la surface, où r = a, la partie de la chaleur, relative à l'exponentielle  $c^{-n}$ , égale à

simple et qui peut s'étendre à beaucoup d'autres cas. Le lunds que l'état initial 
$$e^{i\pi} \Gamma^{o} \frac{\pi}{\tau^{o}}$$
 ur soit exprimé par la fonction

L'accroissement de la chaleur, à la profondeur z' au-dessous de la surface, est, par le théorème de Taylor,  $-z'\left(\frac{dV}{dr}\right)$ , et en vertu de l'équation (2), ce terme devient fz'. V, en ne considérant dans la valeur de V à la surface, que la partie de la chaleur, qui est indépendante de l'action des causes échauffantes à l'extérieur. Il est remarquable que cet accroissement fz'. V de la chaleur, soit indépendant du rayon du globe, et de la manière dont il est échauffé intérieurement, et qu'il ne dépende que de la chaleur des couches voisines de la surface, et de la manière dont elles perdent leur chaleur. Dans le cas présent, si l'on nomme h la valeur de V, à l'origine du temps t, à la surface; on aura

$$\frac{A\pi}{a^2f}=h$$
,  $\frac{A\pi}{a^2f}=0$ 

et par conséquent

$$V = \frac{ha^2 f}{\pi \cdot r} \cdot c^{-\frac{\pi^2 t}{a^2 k} \cdot \left(1 - \frac{1}{af}\right)^2} \cdot \sin \frac{r}{a} \cdot \pi \cdot \left(1 - \frac{1}{af}\right).$$

Au centre, où r est nul, cette expression donne à fort peu près

$$V = af.h.c^{-\frac{\pi^2t}{a^2k}\cdot\left(1-\frac{1}{af}\right)^2};$$

la température est donc à ce point, incomparablement plus grande qu'à la surface. L'accroissement de température, à une petite profondeur z', comptée de la surface, est

$$fz'h.c^{-\frac{\pi^2t}{a^2k}\cdot\left(1-\frac{1}{af}\right)^2}$$

J'observerai ici que l'analyse par laquelle je viens d'intégrer l'équation (3), s'applique aux équations générales du mouvement des fluides; et que c'est ainsi que j'ai déterminé dans le quatrième livre, les oscillations d'un fluide qui recouvre une sphère immobile, et qui est attiré par un astre en mouvement.

Les valeurs de Y<sup>(o)</sup>, Y<sup>(i)</sup>, Y<sup>(i)</sup>, etc. sont déterminées par l'état initial de la chaleur de la sphère. Je vais donner pour cet objet, une méthode simple et qui peut s'étendre à beaucoup d'autres cas.

Je suppose que l'état initial de la chaleur soit exprimé par la fonction

$$U^{(0)} + U^{(1)} + U^{(2)} \dots + U^{(i)} + \text{etc.};$$

U<sup>(i)</sup> étant une fonction rationnelle et entière de  $\mu$ ,  $\sqrt{1-\mu^2}$ .  $\sin \varpi$ , et  $\sqrt{1-\mu^2}$ .  $\cos \varpi$ , assujettie à la même équation aux différences partielles que Y<sup>(i)</sup>, c'est-à-dire telle que l'on ait

$$o = \begin{bmatrix} d.(1-\mu^{i})\left(\frac{d\mathbf{U}^{(i)}}{d\mu}\right) \\ d\mu \end{bmatrix} + \frac{\left(\frac{dd\mathbf{U}^{(i)}}{d\varpi^{2}}\right)}{1-\mu^{2}} + i.\overline{i+1}.\mathbf{U}^{(i)}:$$

les coefficiens arbitraires de  $U^{(i)}$ , étant ici, des fonctions de r. Soit  $\varphi(r)$  un de ces coefficiens, et  $r\varphi(r) = q'$ ; on aura par ce qui précède.

$$0 = \frac{d^2 \cdot q'}{dr^2} + kn^2q' - \frac{i \cdot \overline{i+1} \cdot q'}{r^2}.$$

En supposant t nul dans l'expression de V, il est facile de voir que l'on aura

$$r.\phi(r) = A^{(0)} \cdot q'^{(0)} + A^{(1)} \cdot q'^{(1)} + A^{(2)} \cdot q'^{(2)} + \text{etc.},$$

 $q'^{(o)}, q'^{(i)}, q'^{(a)}$ , etc., étant les valeurs de q' correspondantes aux diverses racines de l'équation (4);  $A^{(o)}, A^{(i)}$ , etc., sont les arbitraires qui multiplient ces valeurs, et qu'il s'agit de déterminer. Pour cela, on multipliera l'équation précédente par  $dr.q'^{(o)}$ , et l'on prendra l'intégrale depuis r nul jusqu'à r=a, ce qui donne

$$\int dr. q'^{(0)} r \phi(r) = \mathbf{A}^{(0)} \cdot \int q'^{(0)} dr + \mathbf{A}^{(1)} \cdot \int q'^{(0)} q'^{(1)} dr + \text{etc.}$$

Maintenant on a

$$\int g^{(0)} q'^{(1)} dr = 0.$$

Pour le faire voir, nous observerons que l'on a,  $q'^{(o)}$  et  $q'^{(i)}$  étant nuls avec r, and a mointain et au de sup de

$$\int \left(\frac{q'(0) \cdot ddq'(0)}{dr} - \frac{q'(0) \cdot ddq'(0)}{dr}\right) = \frac{q'(0) \cdot dq'(0) \cdot \frac{1}{r} \cdot \frac{q'(0) \cdot dq'(0)}{r} \cdot \frac{1}{r} \cdot \frac{1}{r$$

Le premier membre de cette équation devient, en y substituant pour  $\frac{ddq'^{(0)}}{dr}$ , et  $\frac{ddq'^{(1)}}{dr}$ , leurs valeurs qui résultent de l'équation différentielle en q',

 $\int q'^{(0)}q'^{(1)} \cdot kdr \cdot (n^{(0)2} - n^{(1)2});$ 

 $n^{(0)}$  et  $n^{(1)}$  étant les valeurs de n relatives aux racines de l'équation (4) correspondantes à  $q'^{(0)}$  et  $q'^{(1)}$ . De plus, à la surface, on a

$$\frac{q'^{(\circ)} \cdot dq'^{(\circ)}}{dr} - \frac{q'^{(\circ)}dq'^{(\circ)}}{dr} = 0;$$

car l'équation à la surface

$$-\frac{dq^{(i)}}{dr} = fq^{(i)}$$

donne les deux suivantes

$$\frac{dq^{\prime(0)}}{dr} = \left(\frac{1}{r} - f\right) \cdot q^{\prime(0)}, \quad \frac{dq^{\prime(1)}}{dr} = \left(\frac{1}{r} - f\right) \cdot q^{\prime(1)};$$

on a done

$$0 = \int q'^{(0)}q'^{(1)} \cdot dr \cdot (kn^{(0)} - kn^{(1)}).$$

De là, il est aisé de voir que l'on a

$$A^{(\circ)} \cdot \int q'^{(\circ)} q'^{(\circ)} dr = \int dr \cdot r q'^{(\circ)} \cdot \varphi(r),$$

ce qui donne

$$\mathbf{A}^{(0)} = \frac{\int dr \cdot rq'^{(0)} \cdot \varphi(r)}{\int q'^{(0)} \cdot dr},$$

les intégrales étant prises depuis r=0 jusqu'à r=a. En changeant  $q'^{(0)}$  en  $q'^{(1)}$ ,  $q'^{(2)}$ , etc., on aura les valeurs de  $A^{(1)}$ ,  $A^{(2)}$ , etc.; d'où l'on tire le théorème suivant:

Si l'on forme la quantité

$$c^{-a(r)} \cdot \frac{q'(r)}{r} \cdot \frac{fq'(r) \cdot dr \cdot rU(r)}{f(q'(r))^2 \cdot dr}$$

 $n^{(i)}$  n'étant point nul, et les intégrales étant prises depuis r nul jusqu'à r égal au rayon a de la sphère; si l'on désigne ensuite par  $Q^{(i)}$  la somme de toutes les quantités correspondantes à s = 0, s = 1, etc., jusqu'à s infini; l'expression de la chaleur V après un temps quelconque t, sera

la somme des valeurs de  $Q^{(i)}$  correspondantes à i = 0, i = 1, etc.,

jusqu'à i infini.

Dans le cas où l'état initial de la chaleur, ne dépend que de r,  $U^{(i)}$  est nul, lorsque i est égal à l'unité, ou plus grand; l'expression de la chaleur se réduit alors à  $Q^{(i)}$ ; et l'on a le résultat intéressant que

M. Fourier a donné le premier, pour ce cas.

J'ai supposé l'état initial de la chaleur, développé sous la forme  $U^{(0)} + U^{(1)} + \text{etc.}$ : ce développement est aussi naturel à admettre que tout autre. Il est facile d'ailleurs par le procédé du n° 16 du troisième Livre, de donner cette forme à toute fonction rationnelle et entière des coordonnées orthogonales. On pourrait aisément par l'analyse de ce troisième Livre, obtenir cette forme, au moyen d'intégrales définies; mais comme cela ne conduit à aucun résultat utile, nous nous abstiendrons de nous en occuper.

On aura ainsi égard à la partie de l de l'équation (2), qui est indépendante des fonctions périodiques du temps, et que nous avons exprimée par  $Y'^{(0)} + Y'^{(1)} +$  etc. On a vu qu'il en résulte dans la température finale, la chaleur

$$Y'^{(0)} + \frac{r}{a} \cdot \frac{Y'^{(0)}}{1 + \frac{1}{af}} + \frac{r^2}{a^2} \cdot \frac{Y'^{(2)}}{1 + \frac{2}{af}} + \text{etc.}$$

Il est facile d'en conclure par l'analyse précédente, que si l'on forme la quantité

$$c^{-n^{(i)} \cdot t} \cdot \frac{q'^{(i)}}{r} \cdot fq'^{(i)} dr \cdot \left[ rU^{(i)} - \frac{r^{i+1} \cdot Y'^{(i)}}{a^{(i)} \cdot \left(1 + \frac{i}{af}\right)} \right];$$

 $n^{(i)}$  n'étant point nul, et les intégrales étant prises depuis r nul jusqu'à r égal au rayon a de la sphère; si l'on désigne ensuite par  $Q^{(i)}$  la somme de toutes les quantités correspondantes à s=0, s=1, jusqu'à s= infini; l'expression de la chaleur V après un temps quelconque, sera la somme de toutes les valeurs de

$$a^{(j)}$$
 n'étant point nul, et  $(\frac{(i)^{\gamma}Y}{i}, \frac{(i)^{\gamma}}{(i)_{a}} + (i)Q$  ises depuis r nul jusqu'i r egal au rayon a de la spl $\frac{i}{f_{a}} + i$  l'on designe ensuite par  $Q^{(i)}$  la somme de toutes les quantités correspondantes à  $s = 0$ ,  $s = 1$ , etc., jusqu'in circles is s'ensuit etc., jusqu'in circles is s'ensuit etc.

correspondantes à i=0, i=1, etc., jusqu'à i infini.

J'ose espérer que les géomètres verront avec quelque intérêt, cette nouvelle application de l'analyse par laquelle j'ai déterminé la figure des corps célestes et la loi de la pesanteur à leur surface.

10. Je vais maintenant considérer la diminution de la durée du jour, due au refroidissement de la Terre : pour cela, je supposerai que la densité des couches terrestres, croît de la surface au centre, et que cependant leurs propriétés pour contenir et pour émettre la chaleur, sont les mêmes que si elles étaient homogènes, en sorte que l'expression précédente de V leur soit applicable. Je supposerai de plus, ces couches fluides, ou du moins assez molles, pour qu'elles prennent sans résistance, la figure que la compression tend à leur donner. La masse de la couche dont  $\rho$  est la densité, dont r est le rayon et dr l'épaisseur à l'origine du temps t, est proportionnelle à  $\rho r^{\rho}dr$ . Après le temps t, elle sera proportionnelle à

$$(\rho + \delta \rho) \cdot (r + \delta r) \cdot d(r + \delta r);$$

la caractéristique d' servant à exprimer les variations relatives au temps. En égalant ces deux expressions de la masse de la couche, et négligeant le carré de d', on aura

$$d(r^2\delta r) + \frac{\delta\rho}{\rho} r^2 dr = 0.$$

Pour avoir la valeur de  $\delta \rho$ , je supposerai que pour un degré centigrade de diminution dans la température, pris pour unité de température, la densité  $\rho$  de la couche augmente de  $i\rho$ , i étant une très petite fraction que je supposerai la même à toutes les températures et pour toutes les couches terrestres. En exprimant par  $\delta V$ , la diminution de la chaleur de la couche après le temps t, on aura

$$\delta \rho = i \rho . \delta V;$$

on aura donc

$$d.(r^2 \delta r) + i \delta V. r^2 dr = 0;$$

et en intégrant

$$r^2 \delta r = -i \int \delta V \cdot r^2 dr$$
 of a means are no

Maintenant, si l'on désigne par  $\varphi$  la vitesse angulaire de rotation de la Terre, à l'origine du temps; la somme des aires décrites par toutes ses

molécules, pendant une unité de temps, sera proportionnelle à  $\varphi f \rho r^4 dr$ ; sa variation sera donc proportionnelle à la variation

$$S\varphi S \rho r^4 dr + \varphi . S \rho . r^4 dr + 4\varphi S \rho r^3 \delta r . dr + \varphi S \rho r^4 d . \delta r$$

En substituant pour  $\delta r$  et  $d\delta r$ , leurs valeurs tirées des équations précédentes, cette variation devient

En égalant à zéro cette fonction, en vertu du principe de l'égalité des aires; on aura

aura
$$\frac{\delta \varphi}{\varphi} = \frac{2i \cdot \int (\rho r dr \cdot \int \delta \nabla \cdot r^2 dr)}{\int \rho r^4 dr} \cdot \dots (5).$$

J'adopterai pour p, l'expression la plus simple d'une densité variable, celle d'une densité croissante en progression arithmétique, ce qui donne

$$\rho = (\rho) \cdot \left(1 + e - \frac{er}{a}\right),$$

e étant une constante, et (ρ) étant la densité à la surface. On a par ce qui précède,

$$\delta V = \frac{a^2 f h}{\pi r} \cdot \left[ I - c^{-\frac{\pi^2 t}{a^2 h} \cdot \left( I - \frac{1}{a f} \right)^2} \right] \cdot \sin \pi \cdot \frac{r}{a} \cdot \left( I - \frac{1}{a f} \right),$$

ou à fort peu près

$$\delta V = \frac{f h \pi}{k r} \cdot t \cdot \sin \frac{r}{a} \pi \cdot \left( 1 - \frac{1}{a f} \right).$$

On a ensuite, en intégrant depuis r nul jusqu'à r=a,

$$2f(\rho r dr \int \delta V. r^{2} dr = (1+e)(\rho) a^{2}. \int \delta V. r^{2} dr$$

$$- (1+e)(\rho) \int \delta V. r^{4} dr$$

$$- \frac{2a^{2}}{3} e(\rho). \int \delta V r^{2} dr$$

$$+ \frac{2}{3} \frac{c}{a}. (\rho). \int \delta V. r^{5} dr.$$

On a généralement à fort peu près,

$$\int \frac{r'dr}{a^{s+1}} \cdot \sin \frac{r}{a} \cdot \pi \left( 1 - \frac{1}{af} \right) = \frac{1}{\pi} \cdot \left( 1 - \frac{s \cdot s - 1}{\pi^2} + \frac{s \cdot s - 1}{\pi^4} \cdot \frac{s - 2 \cdot s - 3}{\pi^4} - \text{etc.} \right);$$

cela posé, la formule (5) devient is and an about all nove most

$$\frac{\delta \varphi}{\varphi} = \frac{10 \cdot ihf \cdot t}{ak\pi^2} \cdot \frac{\left[3 - e\left(1 - \frac{8}{\pi^2}\right)\right]}{1 + \frac{1}{6}e};$$

ainsi la valeur de  $\frac{\delta \varphi}{\varphi}$  est plus petite que dans le cas de e nul, ou d'une densité constante.

Essayons présentement de déterminer les constantes de cette valeur. En prenant un milieu entre les résultats des observations thermométriques, faites dans un grand nombre de mines profondes, je trouve que la température augmente d'un degré centésimal, pour 32 mètres de profondeur; ce qui donne en faisant t nul à l'époque actuelle,

$$32^{m\hat{e}t} \cdot fh = 1^{\circ}$$

J'ai déterminé la valeur de k, au moyen de la diminution de la variation annuelle de la chaleur, à mesure que l'on pénètre dans la première couche terrestre, phénomène dont M. Fourier a établi les lois; et dont on a ainsi l'expression la plus simple. Pour cela, je représente la variation de l'action de la chaleur solaire à la surface par  $\ell$  sin mt, mt étant la longitude moyenne du Soleil. En nommant donc z', la distance d'un point intérieur de la Terre, à sa surface; l'équation (1) donnera, en observant que z' est très petit par rapport au rayon a,

The second set of the contains 
$$\left(\frac{ddV'}{dz'^2}\right) = k\left(\frac{dV'}{dt}\right)$$
,

V'étant la partie de la chaleur, due au terme précédent de l'action solaire. L'équation (2) à la surface donne

$$\left(\frac{dV'}{dz'}\right) = fV' - f\mathcal{E}.\sin mt.$$

On satisfait à ces deux équations, par les deux suivantes

$$V' = \frac{f\varepsilon \cdot \sin\theta}{\sqrt{\frac{km}{2}}} \cdot c^{-z' \cdot \sqrt{\frac{km}{2}}} \cdot \sin\left(m - z' \cdot \sqrt{\frac{km}{2}} - \theta\right),$$

$$\tan\theta = \frac{\sqrt{\frac{km}{2}}}{f + \sqrt{\frac{km}{2}}}.$$

Pour avoir la valeur de km, j'ai fait usage des expériences de M. de Saussure, que ce savant a consignées dans le n° 1422 de son Voyage dans les Alpes. Il résulte de ces expériences qu'à la profondeur de 9mes, 6 le coefficient de la variation annuelle est réduit au douzième environ, de sa valeur à la surface; ce qui donne

densité constante.

Essayons précentement de 
$$\frac{1}{12} = \frac{\sqrt{km}}{2} \sqrt{1000}$$
 Distributes de cette valeur, le prenant un milieux entre le resultats des observations thermome in

$$km = 2 \left( \frac{\text{logarithme hyperbolique de } 12}{9^{met}, 6} \right)^2$$
.

La valeur précédente de  $\frac{\delta \varphi}{\varphi}$  devient ainsi

$$\frac{\delta \varphi}{\varphi} = \frac{10.i.mt}{32^{m\acute{e}t}a.\pi^2} \cdot \frac{(9^{m\acute{e}t}, 6)^2}{2.(\log.\text{hyp. 12})^2} \cdot \frac{\left[3 - e\left(1 - \frac{8}{\pi^2}\right)\right]}{1 + \frac{1}{6}e}.$$

Pour une année, mt est à fort peu près égal à 27. Dans la supposition de la Terre homogène, où e est nul, en évaluant a en mètres, et en supposant, i égale à 0,00003; on aura après un intervalle de mille ans,

$$\frac{\delta \varphi}{\varphi} = \frac{1}{474}$$

ce qui donne en secondes centésimales, la variation de la durée du jour en deux mille ans égale à 1/237.

On a vu précédemment que pour satisfaire à l'ensemble des phénomènes, e ne doit pas être supposé nul; mais qu'il est à fort peu près égal à 2,349; alors, la variation de la durée du jour est moindre que la précédente, et égale à  $\frac{1}{387}$ .

Je reprends l'équation

$$32^{met}$$
.  $fh = 1^{\circ}$ .

h exprime la température que le terme dépendant de la chaleur propre de la Terre ajoute à la température de sa surface. Cet accroissement de température est donc

 $h = \frac{1^{\circ}}{32^{met} f}$ 

Pour déterminer f, j'observe que le maximum de la chaleur annuelle n'a lieu qu'après le solstice d'été. A l'époque de ce maximum, on a

$$\sin\left(mt-\theta\right)=1;$$

ce qui donne

$$mt = \frac{\pi}{2} + \theta.$$

L'ensemble des observations thermométriques faites chaque jour à Paris, pendant quinze années consécutives, donne à fort peu près

$$\tan \theta = 0.6$$
.

L'équation

$$\tan\theta = \frac{\sqrt{\frac{km}{2}}}{f + \sqrt{\frac{km}{2}}}$$

donnera donc

$$f = \frac{2}{3} \cdot \sqrt{\frac{km}{2}}.$$

Substituant pour  $\sqrt{\frac{km}{2}}$ , sa valeur,  $\frac{\log \text{ hyp. 12}}{9^{met}, 6}$ ; on aura pour f une valeur qui donne

$$h = \frac{1^{\circ}}{5,8}$$
.

Pour déterminer f, j'observe que le maximum de la chaleur auquelle n'a lieu qu'après le solstice d'été. A l'époque de ce maximum, on a

 $\sin(mt - \theta) =$ 

 $mt = \frac{\pi}{2} + 6$ 

L'ensemble des observations thermométriques faites chaque jour à Paris, pendant quinze années consécutives, donne à fort peu près

L'équation

tang 0 = \frac{1}{2} \tangle \text{dim} \text{dim} \text{dim} \text{dim} \text{dim} \text{dim} \text{dim}

lonnera donc

Perm who above  $\frac{1}{8} = \frac{2}{8} \cdot \sqrt{\frac{km}{8}}$  and  $\frac{1}{8} \cdot \sqrt{\frac{km}{8}}$  and  $\frac{1$ 

Substituant pour View, sa valeur 16g. hyp. 12; on aura pour f une valeur qui donne

 $h = \frac{10}{5.8}$ 

the quir deline in accounts conficuences, to work the to which we

On a un procedeminary car pour attachers à l'expansité des paracmènes, e un dest pas être supparse non rese qu'il en e fert peu pire égat à 2,540; mars, la sansetme de la durée du jour est manutre que le missioner et école à

Je reprends Péquation

3000 fh = 1

à expense la température que le terme dépendent de la chaleur propre de la Terre ajoute à la température de sa susfice. Cet actrossement de température est donc

A ## 32-17

MECAN. CÉL. Tome V.

LIVEE XII.

TRAITÉ

IMPRIMERIE DE HUZARD-COURCIER

DE

## MÉCANIQUE CÉLESTE.

LIVRE XII.

AVRIL 1823.

## TRAITE

IMPRIMERIE DE HUZARD-COURCIER.

DE

### MÉCANIQUE CÉLESTE.

LIVRE XII.

AVRIL 1823.

#### LIVRE XII.

DE L'ATTRACTION ET DE LA RÉPULSION DES SPHÈRES, ET DES LOIS DE L'ÉQUILIBRE ET DU MOUVEMENT DES FLUIDES ÉLASTIQUES.

# CHAPITRE Ier.

Notice historique des Recherches des Géomètres sur cet objet.

determiner cor my differione, je smis partivles formules

1. Newton considéra le premier l'attraction des corps sphériques. Il démontra dans son ouvrage des Principes mathématiques de la Philosophie naturelle, publié en 1687, ces deux propriétés remarquables de la loi d'attraction réciproque au carré de la distance; l'une, que la sphère attire un point situé au-dehors, comme si toute sa masse était réunie à son centre; l'autre, qu'un point situé au-dedans d'une couche sphérique, et même d'une couche elliptique dont la surface intérieure est semblable à la surface extérieure, et semblablement située, est également attiré de toutes parts, ou ne reçoit aucun mouvement, des attractions qu'il éprouve. Il paraît par une lettre de Newton à Halley, que ce fut en 1685 qu'il découvrit ces propriétés. Ses premières réflexions sur le système du monde remontent à l'année 1666. En étendant jusqu'à la Lune, la pesanteur terrestre, et en la supposant diminuée à cette distance, dans le rapport du carré du rayon de l'orbe lunaire, au carré du rayon de la Terre, il la compara avec la force centrifuge du mouvement de la Lune; mais trompé par une fausse mesure du degré terrestre, il trouva ces deux forces inégales, et il en conclut que d'autres forces devaient se joindre à la pesanteur, pour retenir la Lune dans son orbite.

MÉCAN. CÉL. Tome V.

En considérant la pesanteur, comme la résultante des attractions de toutes les molécules de la Terre, il pouvait soupçonner que la loi d'attraction réciproque au carré de la distance, quoique vraie à très peu près, à une distance aussi considérable que celle de la Lune, était modifiée à la petite distance des points de la surface de la Terre à son centre; et c'est ce qui a lieu, en effet, pour d'autres lois d'attraction. Mais on ne voit pas que Newton ait fait cette réflexion; et ce n'est que vers 1685, qu'il s'occupa de la pesanteur à la surface et dans l'intérieur de la Terre. Il fit voir qu'au-dessus de la surface, elle suit la loi inverse du carré de la distance : mais que, loin de suivre cette loi dans l'intérieur de la Terre, comme on le supposait, elle diminue à mesure que l'on approche du centre, où elle devient nulle.

J'ai fait voir dans le second Livre, que parmi toutes les lois d'attraction décroissante à l'infini par la distance, la loi de la nature est la seule qui jouisse des deux propriétés que Newton lui a reconnues. Dans toute autre loi, l'attraction des sphères est modifiée par leurs dimensions. Pour déterminer ces modifications, je suis parti des formules que j'ai données dans le livre cité, sur l'attraction des couches sphériques. J'en ai déduit, sous une forme très simple, les expressions générales de l'attraction des sphères, sur des points placés au-dedans ou au-dehors, et les unes sur les autres. La comparaison de ces expressions conduit à ce théorème qui donne l'attraction d'une sphère sur les points intérieurs, lorsqu'on a son attraction sur les points situés au-dehors, et récipro-

quement, quelle que soit la loi de l'attraction.

« Si l'on imagine dans l'intérieur d'une sphère, une petite sphère qui » lui soit concentrique; l'attraction de la grande sphère, sur un point » placé à la surface de la petite, est à l'attraction de la petite sphère » sur un point placé à la surface de la grande, comme la grande surface » est à la petite surface. Ainsi les actions de chacune des sphères sur

» la surface entière de l'autre, sont égales. »

Les mêmes expressions s'appliquent évidemment aux sphères dont les molécules se repoussent et sont contenues par des enveloppes. Newton a supposé entre les molécules d'air, une force répulsive réciproque à leur distance. Mais en appliquant à ce cas, mes formules; je trouve que la pression à l'intérieur et à la surface, suit une loi bien différente de la loi générale des fluides élastiques, suivant laquelle la pression, à températures égales, est proportionnelle à la densité. Aussi Newton n'admet-il

la répulsion qu'une molécule doit exercer ainsi sur les autres, que dans une très petite étendue; mais l'explication qu'il donne, de ce défaut de continuité, est bien peu satisfaisante. Il faut sans doute admettre entre les molécules de l'air, une loi de répulsion, qui ne soit sensible qu'à des distances imperceptibles. La difficulté consiste à déduire de ce genre de forces, les lois générales que présentent les fluides élastiques. Je crois y être parvenu, en appliquant à cet objet, les formules dont je viens de parler.

Je suppose que les molécules des gaz sont à une distance telle que leur attraction mutuelle soit insensible; ce qui me paraît être la propriété caractéristique de ces fluides, et même des vapeurs, de celles, du moins, qu'une légère compression ne réduit point en partie, à l'état liquide Je suppose ensuite que ces molécules retiennent par leur attraction, le calorique; et que leur répulsion mutuelle est due à la répulsion des molécules du calorique, répulsion évidemment indiquée par l'accroissement du ressort des gaz, quand leur température augmente. Je suppose enfin, que cette répulsion n'est sensible qu'à des distances imperceptibles. Je fais voir que dans ces suppositions, la pression dans l'intérieur et à la surface d'une sphère formée d'un pareil fluide, est égale au produit du carré du nombre de ses molécules contenues dans un espace donné, pris pour unité, par exemple, d'un litre, par le carré du calorique renfermé dans une quelconque de ces molécules, et par un facteur constant. Ce résultat étant indépendant du rayon de la sphère, il est facile d'en conclure qu'il a lieu, quelle que soit la figure de l'enveloppe qui contient le gaz. Maintenant si dans la diametrial incidend

J'imagine ensuite l'espace pris pour unité, à une température donnée et contenant un gaz à la même température. Il est clair qu'une molécule quelconque de ce gaz sera atteinte à chaque instant, par les rayons caloriques émanés des corps environnans. Elle éteindra une partie de ces rayons; mais il faudra pour le maintien de la température, qu'elle remplace ces rayons éteints, par son rayonnement propre. La molécule, dans tout autre espace à la même température, sera atteinte à chaque instant, par la même quantité de rayons caloriques : elle en éteindra la même partie qu'elle remplacera par son rayonnement. Cette quantité est donc une fonction de la température, indépendante de la nature des corps environnans; et l'extinction sera le produit de cette fonction, par une constante dépendante de la nature de la molécule ou du gaz. J'ob-

serverai ici que la quantité de rayons caloriques émanés des corps environnans et qui forme la chaleur de l'espace, est, à cause de l'extrême vitesse que l'on doit supposer à ces rayons, une partie insensible de la chaleur contenue dans les corps; comme on l'a reconnu d'ailleurs, par les expériences faites pour condenser cette chaleur. Maintenant, j'observe que chaque molécule du gaz, étant supposée retenir par l'attraction, son calorique; le rayonnement de ce calorique ne peut être dû qu'à la répulsion du calorique des molécules qui l'environnent. Quelle que soit la manière dont cette répulsion détache des parcelles du calorique de la molécule, et la fait rayonner; il est visible que ce rayonnement sera en raison composée du calorique contenu dans les molécules environnantes, et du calorique propre à la molécule. D'ailleurs cette raison composée est, comme on le verra dans la suite, proportionnelle à la pression qu'éprouve ce dernier calorique, pression à laquelle il est naturel de supposer le rayonnement de la molécule, proportionnel (\*). Le calorique contenu dans les molécules environnantes est proportionnel au produit du calorique de chacune d'elles, par leur nombre. Ainsi le rayonnement d'une molécule du gaz, est proportionnel au produit du nombre des molécules de ce gaz, contenues dans l'espace pris pour unité, par le carré de son calorique. En égalant ce rayonnement, à l'extinction qui, comme on vient de le voir, est le produit d'une constante, par la fonction de température, dont j'ai parlé; on voit que le nombre des molécules du gaz, multiplié par le carré du calorique d'une quelconque de ces molécules, est proportionnel à cette fonction. Maintenant, si dans l'expression donnée ci-dessus, de la pression du gaz, on substitue au produit du nombre des molécules, par le carré du calorique propre à chaque molécule, la fonction de la température, multipliée par un facteur constant; on aura cette pression,

<sup>(\*)</sup> Dans un état d'immobilité parfaite des molécules du gaz, supposées sphériques, les molécules de leur calorique seraient pareillement immobiles. Mais cet état mathématiquement possible, me paraît aussi impossible physiquement, que l'équilibre d'une aiguille verticale appuyée sur sa-pointe : dans un fluide aussi mobile qu'un gaz, la plus légère agitation doit troubler l'équilibre des molécules et de leur calorique. Alors des parcelles du calorique de chaque molécule, ne doivent-elles pas s'en détacher à chaque instant? La figure des molécules peut encore avoir sur leur rayonnement, une grande influence.

proportionnelle au produit de cette fonction, par le nombre des molécules de gaz, renfermées dans l'espace pris pour unité.

Cette proportionnalité donne les deux lois générales des gaz. On voit d'abord que la température restant la même, la pression est proportionnelle au nombre des molécules du gaz, et par conséquent, à sa densité; ce qui est la loi de Mariote. On voit ensuite, que la pression restant la même, ce nombre est réciproque à la fonction de température dont il s'agit, fonction qui, comme on l'a vu, est indépendante de la nature du gaz; d'où résulte la belle loi que MM. Dalton et Gay-Lussac nous ont fait connaître, et suivant laquelle, sous la même pression, le même volume des divers gaz se dilate également par un accroissement égal de température.

On peut se demander ici, ce que l'on doit entendre par le mot température. Si l'on imagine un espace vide dont l'enveloppe soit partout et constamment à la même température; tous les points de la surface intérieure de cette enveloppe, se renverront réciproquement des rayons caloriques qui rempliront l'espace vide, d'un fluide calorique très rare et mû suivant toutes les directions. On prouve facilement que la densité de ce calorique est la même dans tous les points de l'espace. Cette densité croît avec la température de l'enveloppe : elle est la fonction de température, dont nous venons de parler. Il est naturel de la prendre pour la température elle-même, dont on aura ainsi une idée claire et simple. Sous une pression constante, la densité d'un gaz, étant, comme on l'a vu, réciproque à cette fonction de la température; son volume est proportionnel à cette fonction, et par conséquent à la densité du calorique de l'espace; la température est alors représentée par ce volume, et ses variations sont représentées par les variations du volume d'un gaz soumis à une pression constante. Le thermomètre d'air devient ainsi le vrai thermomètre qui doit servir de module aux autres, du moins dans les limites de pression et de densité, où ce fluide obéit très sensiblement aux lois générales des fluides élastiques.

Un corps en équilibre de température dans un espace, et transporté dans un autre espace où la densité du calorique est la même, y conservera la même température. Si le nouvel espace a une densité différente de calorique, la température du corps changera jusqu'à ce que le calorique qu'il rayonne soit égal au calorique qu'il absorbe. En général, la

température d'un corps est la densité du calorique de l'espace où cette égalité a lieu.

Suivant les expériences de M. Gay-Lussac, si l'on prend pour unité, le volume d'un gaz à zéro de température, ou à la température de la glace fondante; ce volume devient 1,375, à la température de 100°, ou à la température de l'eau bouillante sous la pression barométrique o<sup>m</sup>,76. La densité du calorique de l'espace, à zéro de température, est donc représentée par 100° o,375 ou par 266° 23.

Chaque molécule d'un corps est soumise à l'action de ces trois forces; 1°. l'attraction des molécules environnantes; 2°. l'attraction du calorique des mêmes molécules, plus leur attraction sur son calorique; 3°. la répulsion de son calorique par le calorique de ces molécules. Les deux premières forces tendent à rapprocher les molécules entre elles : la troisième tend à les écarter. Les trois états, solide, liquide et gazeux, dépendent de l'efficacité respective de ces forces. Dans l'état solide, la première force est la plus grande : l'influence de la figure des molécules est très considérable, et elles sont unies dans le sens de leur plus grande attraction. L'accroissement du calorique diminue cette influence, en dilatant les corps; et lorsque cet accroissement devient tel que cette influence soit très petite, ou nulle; la seconde force prédomine, et le corps prend l'état liquide. Les molécules intérieures sont alors mobiles entre elles; mais l'attraction de chaque molécule par les molécules qui l'environnent et par leur calorique, retient leur ensemble dans le même espace, à l'exception des molécules de la surface, que le calorique enlève sous la forme de vapeurs, jusqu'à ce que la pression de ces vapeurs arrête cet effet. Ensin, quand par un nouvel accroissement de calorique, la troisième force l'emporte sur les deux autres; toutes les molécules du liquide, à l'intérieur comme à la surface, s'écartent entre elles : le liquide prend subitement un volume et une force expansive très considérables; et il se dissiperait en vapeurs, s'il n'était pas fortement contenu par les parois du vase ou du tube qui le renferme. C'est à cet état de gaz très comprimé, que M. Cagnard-Latour a réduit l'eau, l'alcool, l'éther, etc. Dans cet état, les deux premières forces sont encore sensibles; mais la densité du fluide ne satisfait point à da loi de Mariote. On verra dans la suite, que pour y satisfaire, ainsi qu'à la loi de MM. Dalton et Gay-Lussac, il est nécessaire que

le fluide soit réduit à l'état aériforme, dans lequel la troisième force devient la seule sensible (\*). Dans cet état, la densité du gaz contenu dans un vase, est partout la même, excepté dans les points très voisins des parois, à une distance égale ou plus petite que le rayon de la sphère d'activité sensible des forces attractives et répulsives.

On doit faire ici une remarque importante. Les phénomènes de chaleur que présentent les passages des corps, de l'état solide à l'état liquide, et de l'état liquide à l'état de vapeurs, ont fait distinguer dans les molécules, deux espèces de chaleur; l'une libre, ou sensible au thermomètre; l'autre insensible au thermomètre, ou latente. Une quantité considérable de calorique est absorbée dans ces passages et devient latente; mais elle reparaît dans le retour des vapeurs à l'état liquide, et de l'état liquide à l'état solide. Le calorique absolu d'un corps est la somme de son calorique libre et de son calorique latent. C'est uniquement au calorique libre, ou qui exerce une action sur le thermomètre, qu'il faut attribuer les résultats dont j'ai parlé. On sait que la température des gaz augmente par leur compression, et l'on conçoit que cela doit être; car le rayonnement d'une molécule de gaz étant, comme on l'a vu, proportionnel au produit de la densité du gaz, par le carré du calorique libre de la molécule; ce rayonnement et par conséquent la température de l'espace dans lequel la molécule serait en équilibre de température, doit croître avec cette densité. Mais la vitesse observée du son, et les expériences sur le calorique abandonné par l'air sous diverses pressions en se refroidissant, indiquent un accroissement de calorique latent, par le seul effet de la compression. Il faut donc ajouter aux suppositions que nous avons faites, la considération de la chaleur latente. En modifiant ainsi les hypothèses, d'après l'expérience, on peut découvrir la loi générale des phénomènes, et la r ses vibrations. Dans le mélange de plusieurs galuslands un arthur

Dans le mélange de divers gaz qui n'exercent point d'action d'affinité

<sup>(\*)</sup> Ne peut-on pas admettre avec vraisemblance, que le calorique des molécules aériennes exerce sur le calorique des molécules d'un corps réduit en parties très fines, une force répulsive d'autant plus grande, que ces molécules se rapprochent plus de la ténuité des molécules de l'air, ce qui doit contribuer à soulever ces parties et à les retenir pendant long-temps dans l'atmosphère? n'est-ce pas ainsi que les vapeurs vésiculaires qui forment les nuages, s'y maintiennent suspendues?

les uns sur les autres, leurs molécules finissent par être mêlées de manière que la plus petite portion du mélange renferme chacun de ces gaz, dans la même proportion que le mélange entier. Chaque molécule de gaz, étant suspendue dans l'espace, par l'action répulsive du calorique des molécules environnantes sur son propre calorique; et cette action étant alors égale dans tous les sens; elle est dans un état stable d'équilibre. Je donne l'expression analytique de la pression que le gaz composé exerce sur les parois de l'espace qui le contient, et celle du rayonnement de chaque molécule de gaz. Il en résulte qu'à températures égales, la pression de ce mélange est comme pour un gaz simple, proportionnelle à sa densité. Il en résulte encore que l'accroissement de son volume, par un accroissement de température, la pression restant la même, est égal à celui d'un gaz simple. Enfin, la pression que le mélange exerce sur les parois, est à températures égales, la somme des pressions que chacun des gaz exercerait séparément, s'il existait seul dans le même espace. On peut donc concevoir le mélange, comme un gaz simple dont chaque molécule serait un groupe infiniment petit de molécules des divers gaz, mêlées dans la même proportion que dans le mélange total. Cette manière de considérer le mélange dans l'état d'équilibre, peut encore s'étendre à l'état de mouvement.

En appliquant les considérations précédentes, au mouvement des gaz; je donne les équations différentielles de ce mouvement. Elles different essentiellement des formules connues, en ce qu'elles contiennent les forces qui résultent du développement de la chaleur par l'accroissement de densité des diverses parties des gaz en mouvement. Ces forces n'ont aucune influence sensible sur les mouvemens de l'air considéré en masse, tels que ses oscillations produites par les attractions du Soleil et de la Lune sur l'atmosphère; mais elles ont une influence considérable sur ses vibrations. Dans le mélange de plusieurs gaz, les molécules d'un gaz ne sont pas assujetties aux mêmes forces, que les molécules d'un autre gaz; mais ces molécules s'entraînent mutuellement, comme si le gaz composé était formé d'une infinité de groupes dans lesquels les molécules des gaz seraient en même proportion que dans le mélange, et de plus, liées fixement entre elles. Il arrive ici la même chose que pour un corps solide formé de substances magnétiques et non magnétiques : l'adhérence mutuelle des molécules fait que les molécules non magnétiques sont entraînées par l'action d'un aimant, avec les molécules magnétiques. On a vu que dans le mélange des gaz, les molécules de chaque gaz tendent par la répulsion réciproque de leur calorique, à se répandre également dans toutes les parties de l'espace. Cette tendance d'un ordre de forces, très supérieur à celui des forces qui font vibrer les molécules des gaz, les empêche de se séparer dans leurs mouvemens.

L'application la plus importante que l'on ait faite, des équations du mouvement des fluides élastiques, est relative à la vitesse du son dans l'atmosphère. Newton est le premier qui s'en soit occupé, dans son ouvrage des Principes mathématiques de la Philosophie naturelle : sa théorie, quoique imparfaite, est un monument de son génie. Il considère une ligne iudéfinie de molécules aériennes; et en la supposant primitivement ébranlée dans une petite étendue, il détermine, dans une hypothèse particulière d'ébranlement, la manière dont cet ébranlement se propage, et le temps qu'il emploie à parvenir à une distance quelconque de son origine; ce qui lui donne la vitesse horizontale du son, ou l'espace qu'il parcourt dans une seconde sexagésimale, espace qu'il trouve égal à la racine carrée du produit du double de la hauteur dont la pesanteur fait tomber les corps, dans la première seconde, par la hauteur d'une colonne d'air, qui ferait équilibre à la colonne de mercure du baromètre, et qui aurait partout la même densité, qu'au bas de la colonne. Le raisonnement par lequel Newton établit ce théorème, a paru généralement obscur aux géomètres. Quelques-uns même l'ont trouvé inexact, parce qu'en l'appliquant à des ébranlemens primitifs, physiquement impossibles, ils sont parvenus à la même expression de la vitesse. Mais Lagrange a fait voir que cela tenait aux fonctions arbitraires introduites par l'intégration des équations aux différences partielles du mouvement de l'air, fonctions d'une telle nature, qu'il en résulte la même expression de la vitesse du son. Ainsi, l'objection faite au raisonnement de Newton, loin d'en montrer l'inexactitude, en prouvait la généralité. Lagrange est le premier qui ait déduit cette expression, des équations analytiques aux différences partielles de ce mouvement. Euler et lui ont étendu leurs recherches au cas où l'air a trois dimensions; et ils ont trouvé que la vitesse est la même que dans le cas d'une seule dimension. J'ai reconnu que le cas où l'air n'aurait que deux dimensions, donne encore la même vitesse, quoique dans ce cas, l'intégration des équations différentielles soit impossible. Mais la comparaison de la formule Newtonienne de la vitesse du son,

avec les observations, en a prouvé l'inexactitude. La différence qui s'élève au sixième de la vitesse totale, indique évidemment que deux forces jusqu'alors ignorées, influent sur la vitesse du son. Newton et les géomètres qui l'ont suivi, attribuaient cette différence aux molécules étrangères que l'air tient en suspension. Mais, il est facile de voir que ces molécules elles-mêmes entrent en vibration, comme si elles faisaient partie de l'atmosphère. Le progrès de la Physique et de la Chimie nous a fait connaître une force qui se développe dans les vibrations des gaz, et qui augmente leur ressort. Cette force est la chaleur; et j'ai remarqué le premier, qu'en y ayant égard, on avait l'explication véritable de la différence observée. M. Poisson a développé ma remarque, dans un savant mémoire sur la Théorie du Son, inséré dans le Journal de l'École Polythecnique. Enfin, je suis parvenu au théorème suivant, que j'ai publié dans les Annales de Physique et de Chimie de l'année 1816.

« La vitesse du son est égale au produit de la vitesse que donne la formule Newtonienne, par la racine carrée du rapport de la chaleur spécifique de l'air sous une pression constante, à sa chaleur spécifique sous un volume constant. »

La première de ces deux chaleurs spécifiques surpasse la seconde : il faut employer une plus grande quantité de calorique, pour élever d'un degré la température d'un volume d'air, lorsqu'il reste soumis à la même pression, que lorsqu'il est contenu dans le même espace; et c'est la raison pour laquelle il développe du calorique, par le seul effet de la compression. Ainsi le rapport précédent surpassant l'unité, il augmente la vitesse du son conclue de la formule de Newton. Pour déterminer par l'expérience, ce rapport; il faut se rapprocher le plus qu'il est possible, de ce qui a lieu dans les vibrations aériennes. La durée de la vibration d'une molécule d'air, est au-dessous d'une tierce sexagésimale. Dans ce court intervalle, le calorique absolu de la molécule peut être supposé constant; car il ne peut se perdre que par le rayonnement de la molécule, ou par sa communication aux molécules voisines; et pour rendre cette perte sensible, il faut un temps beaucoup plus long qu'une tierce. MM. Clément et Desormes, ont les premiers, par un procédé ingénieux, imité ce qui se passe à cet égard, dans les vibrations de l'air. Ensuite, MM. Gay-Lussac et Welter ont fait, par un moyen encore plus précis, un grand nombre d'expériences de ce

genre, qui donnent le rapport des deux chaleurs spécifiques, égal à 1,3750. Ainsi le produit de la formule Newtonienne par la racine carrée de ce nombre, est la vitesse du son.

Pour comparer cette vitesse à la nature, il fallait en répéter l'expérience d'une manière très précise, et en ayant égard à la pression de l'atmosphère, à sa température, et à son état hygrométrique; car si les observations précises font naître les théories, la précision des théories provoque à son tour la précision des observations. L'expérience faite en 1738, par les académiciens français, quoique la meilleure, laissait beaucoup à désirer sous ces rapports. Le Bureau des Longitudes a bien voulu sur ma proposition, répéter cette expérience dont le résultat ne diffère que de trois mètres, de celui de ma formule.

Les nombreuses expériences de MM. Gay-Lussac et Welter, s'étendent depuis la température de —10°, jusqu'à celle de 40°, et depuis la pression de deux atmosphères, jusqu'à la pression d'un vingtième de l'atmosphère: elles donnent le rapport des deux chaleurs spécifiques de l'air. à très peu près constant dans ces grands intervalles. Par la nature de ces expériences, le rapport qu'elles déterminent est toujours un peu moindre que le véritable, et la différence doit augmenter, quand la pression diminue. De nouvelles expériences feront connaître s'il faut attribuer à cela, les anomalies observées. Mais si la constance de ce rapport n'est pas rigoureuse, elle est du moins fort approchée, et l'on peut l'adopter sans erreur sensible, dans les calculs sur l'action de la chaleur de l'air et des gaz. Il en résulte que ma formule de la vitesse du son, s'étend à toutes les élévations au-dessus du niveau de la mer; et c'est ce que confirme l'expérience de cette vitesse, faite par les Savans français et espagnols envoyés au Pérou en 1740, pour y mesurer un degré du méridien. Ils ont trouvé à Quito, élevé de 2800 mètres audessus du niveau de la mer, la vitesse du son que l'on a déterminée à ce niveau.

Si l'on suppose le rapport des deux chaleurs spécifiques des gaz, rigoureusement constant; on obtient la chaleur absolue de leurs molécules, exprimée par une fonction arbitraire dont la forme la plus simple est une constante, plus une autre constante divisée par la densité du gaz, et multipliée par sa pression élevée à une puissance égale au rapport de la chaleur spécifique de ce gaz sous un volume constant, à sa chaleur spécifique sous une pression constante. Cette expression fort simple

satisfait à très peu près aux diverses expériences que l'on a faites jusqu'à présent sur les phènomènes de chaleur des gaz, dans leur compression et dans leur refroidissement, et des vapeurs, en passant à l'état liquide.

Les principes précédens appliqués aux atmosphères donnent les lois de leur équilibre et de leur pression aux diverses hauteurs, ainsi que la vitesse du son dans toutes les directions. Les molécules atmosphériques sont contenues par l'attraction du corps qu'elles environnent. Elles s'étendent au-dessus de sa surface, jusqu'à une limite qu'il est impossible d'assigner, et qui dépend du poids de chaque molécule, de la force répulsive de son calorique, et du décroissement de la température. Mais on conçoit facilement l'existence de cette limite. Si l'on considère la lumière du Soleil, comme produite par les vibrations qu'il excite dans une atmosphère qui l'entoure; mes formules donnent sa vitesse qui n'est pas un sept-centième de celle que l'on observe. Il faut donc, si la lumière consiste dans les vibrations d'un fluide éthéré, que ce fluide soit comprimé dans les espaces célestes, par des forces bien supérieures à celles qui retiennent les atmosphères. Nous ne voyons rien dans ces

espaces, qui puisse produire une semblable compression.

Les physiciens qui se sont occupés avec le plus de succès, de la théorie de la chaleur, ont admis l'émission du calorique par les molécules des corps. Ils ont expliqué par là, d'une manière heureuse, l'égalité de température, dans tous les points d'un espace dont toutes les parties de l'enveloppe sont à la même température, et la réflexion du froid par les miroirs concaves. Ils ont déterminé les lois de la propagation de la chaleur, dans les corps solides. Les phénomènes les ont conduits à distinguer deux espèces de chaleur; l'une libre, et l'autre latente. La théorie précédente ajoute à ces suppositions, celle du calorique retenu dans chaque molécule par l'attraction de cette molécule, et celle de la répulsion de ce calorique par le calorique des molécules environnantes. Ces deux suppositions me paraissent évidemment indiquées par la force répulsive des gaz et par l'augmentation que cette force reçoit d'un accroissement de température. Ma théorie étend aux molécules des gaz, le rayonnement admis par les physiciens. Mais pour satisfaire aux lois de Mariote et de MM. Dalton et Gay-Lussac, ce rayonnement doit être proportionnel à la compression que le calorique libre d'une molécule de gaz éprouve de la force répulsive du calorique libre des molécules qui l'environnent. Il paraît donc naturel d'admettre, conformément à

ma théorie, cette force répulsive, comme la cause du rayonnement des molécules des corps. Au moyen de ces suppositions, les phénomènes de l'expansion, de la chaleur, et des vibrations des gaz, sont ramenés à des forces attractives et répulsives qui ne sont sensibles qu'à des distances imperceptibles. Dans ma théorie de l'action capillaire, j'ai ramené à de semblables forces, les effets de la capillarité. Tous les phénomènes terrestres dépendent de ce genre de forces, comme les phénomènes célestes dépendent de la gravitation universelle. Leur considération me paraît devoir être maintenant, le principal objet de la Philosophie mathématique. Il me semble même utile de l'introduire dans les démonstrations de la Mécanique, en abandonnant les considérations abstraites de lignes sans masse flexibles ou inflexibles, et de corps parfaitement durs. Quelques essais m'ont fait voir qu'en se rapprochant ainsi de la nature, on pouvait donner à ces démonstrations, autant de simplicité et beaucoup plus de clarté que par les méthodes usitées jusqu'à ce jour.

Medit Home White Charles Water part the Benningsectors have

o participate de la calenda de

second the land to the leading the control of the sound o

an theorie; cette force regulare, comme la cause du

#### CHAPITRE II.

Sur l'attraction des Sphères, et sur la répulsion des fluides élastiques.

2. Newton a démontré ces deux propriétés remarquables de la loi d'attraction réciproque au carré de la distance; l'une, que la sphère attire un point situé au dehors, comme si toute sa masse était réunie à son centre; l'autre, qu'un point situé au dedans d'une couche sphérique, ne reçoit de son attraction, aucun mouvement. J'ai fait voir dans le second Livre, que parmi toutes les lois d'attraction décroissante à l'infini, par la distance, la loi de la nature est la seule qui jouisse de ces propriétés: dans toute autre loi d'attraction, l'action des sphères est modifiée par leurs dimensions. Pour déterminer ces modifications, je partirai des formules que j'ai données dans le n° 12 du second Livre, en conservant les mêmes dénominations. J'ai trouvé l'attraction d'une couche sphérique dont u est le rayon, et r est la distance d'un point extérieur à son centre, égale à la différentielle prise par rapport à r, et divisée par dr, de la fonction

$$\frac{2\pi u}{r} \cdot \left[ \psi(r+u) - \psi(r-u) \right].$$

Dans cette fonction,  $\pi$  est le rapport de la circonférence au diamètre;  $\psi(r)$  est  $\int rdr.\varphi(r)$ , et  $\varphi(r)$  est  $\int dr.\varphi(r)$ ,  $\varphi(r)$  exprimant la loi de l'attraction. Enfin, l'attraction de la couche est supposée dirigée vers son centre.

Désignons  $\int dr \cdot \psi(r)$  par  $\psi_{n}(r)$ ;  $\int dr \cdot \psi_{n}(r)$  par  $\psi_{n}(r)$ , et ainsi de suite. La fonction précédente multipliée par du, et intégrée depuis

u = 0, jusqu'à u = R, R étant le rayon de la sphère, devient

$$\frac{2\pi}{r} \cdot \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{R} \cdot \left[ \dot{\mathbf{\psi}}_{r}(r+\mathbf{R}) + \dot{\mathbf{\psi}}_{r}(r-\mathbf{R}) \right] \\ - \dot{\mathbf{\psi}}_{u}(r+\mathbf{R}) + \dot{\mathbf{\psi}}_{u}(r-\mathbf{R}) \end{array} \right\},$$

ou

$$\frac{2\pi.\mathrm{R}^2}{r} \cdot \frac{d}{d\mathrm{R}} \left[ \frac{\psi_n \cdot (r+\mathrm{R}) - \psi_n (r-\mathrm{R})}{\mathrm{R}} \right].$$

La différentielle de cette fonction, prise par rapport à r et divisée par dr, donne pour l'attraction d'une sphère de la densité  $\rho$ ,

$$2\pi\rho \cdot R^2 \cdot \frac{dd}{drdR} \left[ \frac{\psi_n(r+R) - \psi_n(r-R)}{rR} \right].$$
 (A)

Si l'on suppose la loi d'attraction  $\varphi(r)$  égale à  $r^{-2-\alpha}$ ; cette formule devient, en désignant par M la masse de la sphère,

$$\frac{3M}{2r^{2}R^{3}} \left( \frac{(r+R)^{3-\alpha} - (r-R)^{3-\alpha} - (3-\alpha) \left[ (r+R)^{1-\alpha} + (r-R)^{1-\alpha} \right] \cdot Rr}{(1+\alpha) \cdot (1-\alpha) \cdot (3-\alpha)} \right).$$
 (B)

Si le point attiré est à la surface, on a r=R, et cette fonction devient

$$\frac{M \cdot 2^{-\alpha} \cdot R^{-2-\alpha}}{(1-\alpha) \cdot (1-\frac{1}{3}\alpha)}.$$

A une grande distance r, la même fonction devient  $M \cdot r^{-2-\alpha}$ ; ce n'est donc que dans les deux cas de  $\alpha = 0$  et de  $\alpha = -3$ , que l'attraction à la surface de la sphère, est à l'attraction à une grande distance, dans le rapport donné par la loi de l'attraction, c'est-à-dire, dans le rapport de  $R^{-2-\alpha}$  à  $r^{-2-\alpha}$ .

Lorsque Newton voulut reconnaître l'identité de la force qui retient la Lune dans son orbite, avec la pesanteur; il supposa que la pesanteur d'un corps qui s'élève successivement de la surface de la Terre, diminue suivant le rapport des distances, donné par la loi d'attraction de la nature. L'exactitude de cette supposition que ce grand géomètre a démontrée depuis, lui aurait fait voir cette identité, s'il n'avait pas employé une mesure fautive de la Terre.

Dans le cas de  $\alpha = -1$ , le numérateur et le dénominateur de la formule (B) deviennent nuls, et l'on trouve par les méthodes connues, que cette formule devient

$$\frac{3M}{8rR^2}(r^2 + R^2) + \frac{3M}{16.r^2R^3}(r^2 - R^2)^2 \cdot \log(\frac{r - R}{r + R})$$

Considérons présentement, l'attraction d'une couche sphérique, sur un point placé au dedans, à la distance r de son centre; R et r' étant les rayons des surfaces extérieure et intérieure de la couche. L'attraction d'une couche dont u est le rayon, du l'épaisseur et  $\rho$  la densité, est par le n° 12 du second Livre,

$$2\pi \cdot \rho u du \cdot \frac{d}{dr} \left[ \frac{\psi(u+r) - \psi(u-r)}{r} \right].$$

Il faut intégrer cette quantité depuis u=r' jusqu'à u=R. On trouvera par l'analyse précédente, que cette intégrale est

element of the 
$$2\pi\rho R^2 \frac{dd}{drdR} \left[ \frac{\psi_{\mu}(R+r) - \psi_{\mu}(R-r)}{rR} \right];$$
(C)
$$R = 2\pi\rho \cdot r'^2 \frac{dd}{drdr'} \left[ \frac{\psi_{\mu}(r'+r) - \psi_{\mu}(r'-r)}{rr'} \right].$$

En comparant cette formule à la formule (A), on voit que l'attraction de la couche sphérique sur le point intérieur, est la différence des produits des attractions de la sphère intérieure dont le rayon est r, sur deux points placés aux surfaces extérieure et intérieure de la couche, multipliées respectivement par  $\frac{R^2}{r^2}$  et  $\frac{r'^2}{r^2}$ ; ce qui donne l'attraction de la couche sur un point intérieur, lorsque l'on a l'attraction de la sphère sur les points extérieurs.

Si l'on suppose le point attiré, à la surface intérieure de la couche; r' devient r: en ajoutant à la formule (C), l'attraction de la sphère dont le rayon est r, sur un point placé à sa surface, la formule (C) deviendra

277. 
$$\rho \cdot \mathbb{R}^2 \cdot \frac{dd}{dr d\mathbb{R}} \left[ \frac{(\psi_n \mathbb{R} + r) - \psi_n (\mathbb{R} - r)}{r\mathbb{R}} \right];$$
 (D)

c'est l'expression de l'attraction de la sphère dont le rayon est R, sur un point de son intérieur, placé à la distance r du centre. La comparaison de cette formule avec la formule (A), donne le théorème suivant:

« L'attraction d'une sphère sur un point de la surface d'une petite » sphère intérieure concentrique à la première, est à l'attraction de la » petite sphère, sur un point de la surface de la grande, comme la » grande surface est à la petite. » De là il suit que l'attraction entière d'une sphère sur la surface de l'autre, est la même pour chacune d'elles.

Je vais maintenant considérer l'attraction mutuelle de deux sphères, l'une sur l'autre. Soient R et R' leurs rayons,  $\rho$  et  $\rho'$  leurs densités et r la distance de leurs centres. On peut considérer la première sphère comme si sa masse était réunie à son centre et attirait les points extérieurs suivant une loi d'attraction exprimée par la formule (A). En vertu de l'égalité de l'action à la réaction, un point attire une sphère, comme il en est attiré; ainsi, pour avoir l'action de la seconde sphère sur la première, il faut supposer la loi d'attraction, exprimée par la fonction (A). En désignant donc cette fonction par  $\phi(r)$ , on aura

$$'\varphi_{r}(r) = \frac{2\pi\rho R^{2}}{r} \cdot \frac{d}{dR} \left[ \frac{\psi_{n}(R+r) - \psi_{n}(r-R)}{R} \right];$$

ce qui donne frdr. '\(\phi\_{\circ}(r)\), que nous désignerons par '\(\psi(r)\), égal à

$$2\pi\rho R^2$$
.  $\frac{d}{dR} \left[ \psi_m(R+r) \frac{1}{R} \psi_m(r-R) \right]$ .

Si l'on substitue cette valeur de  $'\downarrow(r)$ , au lieu de  $\downarrow(r)$  dans la formule (A), cette formule donnera pour l'attraction de la seconde sphère sur la première,

$$4\pi^{2} \cdot \rho \rho' \cdot R^{2} \cdot R'^{2} \frac{d^{3}}{dr \cdot dR \cdot dR'} \left\{ \frac{\psi_{r} \cdot (r + R + R') - \psi_{r} \cdot (r + R - R')}{-\psi_{r} \cdot (r - R + R') + \psi_{r} \cdot (r - R - R')}{rRR'} \right\}; \quad (E)$$

ce sera aussi l'attraction de la première sphère sur la seconde; c'est-à-dire, que l'on peut supposer les deux sphères réunies respectivement à leurs centres, et agissant l'une sur l'autre suivant une loi d'attraction, exprimée par la fonction (E) divisée par le produit des masses ou par

$$\frac{16}{9}$$
 .  $\pi^2 \rho \rho'$  ,  $\mathbb{R}^3$  ,  $\mathbb{R}^{\prime 3}$  ,  $\mathbb{R}^{\prime 3}$ 

Dans les sept intégrations qui déterminent  $\psi_r(r)$ , on ne doit point s'inquiéter de l'origine de chaque intégrale. Cette origine peut être différente à chaque intégration, sans qu'il en résulte aucun changement dans la formule (E). En effet, un changement arbitraire d'origine à

chaque intégration, introduit dans la fonction 4, (r) dérivée de  $\phi(r)$ , la fonction l'autre, est la même pour chacune d'elles.

$$A \cdot r^7 + A^{(1)} \cdot r^5 + A^{(2)} \cdot r^4 + A^{(3)} \cdot r^3 + A^{(4)} \cdot r^2 + A^{(5)}r + A^{(6)}$$

A, A(1), etc., étant des constantes arbitraires; et il est facile de voir que cette fonction substituée pour 4, (r) dans la formule (E) la rend rieurs survant une loi d'attraction exprimée par sellun tremeupitebi

Vertu de l'égalité de l'action à la reille que l'égalité de l'action à l'act

et la formule (E) devient 
$$(1+R)$$
  $\frac{1}{\sqrt{2}}$   $\frac{1}{\sqrt{2$ 

c'est-à-dire que les deux sphères s'attirent comme si leurs masses étaient réunies à leurs centres; ce qui est conforme à ce que Newton a démontré.

3. Les formules précédentes s'appliquent évidemment à la répulsion des fluides élastiques contenus dans des enveloppes sphériques, pourvu que la densité du fluide, soit partout la même.

Si l'on nomme p la pression du fluide, et si l'on désigne par  $\varphi$  la force répulsive d'une sphère fluide, dont R est le rayon, et ρ la densité, sur un point placé à la distance r de son centre, et qui éprouve la pression p; on aura par le nº 17 du premier Livre,

$$dp = \rho \cdot \phi dr$$
,

dr étant l'élément de la direction de la force répulsive qui agit en sens contraire de la force attractive.  $\varphi$  est la fonction (D);  $\int \varphi dr$  est donc cette fonction dans laquelle on supprime la différentiation par rapport à r; et alors on a p =constante

the doing the set of 
$$\frac{R^2}{r}$$
,  $\frac{d}{dR} \left[ \frac{\psi_n(R+r) - \psi_n(R-r)}{R} \right]$ . The doing set of  $\frac{1}{4}$  is the set of  $\frac{1}{4}$  in the set of  $\frac{1}{4}$  in the set of  $\frac{1}{4}$  is the set of  $\frac{1}{4}$  in the set of  $\frac{1}{$ 

Newton a supposé entre les molécules de l'air, une force répulsive

réciproque à leur distance, ce qui revient à supposer  $\varphi(r) = \frac{1}{r}$ . Cette supposition donne

Cette valeur substituée dans la fonction (F), est loin de représenter les observations qui donnent p constant; aussi ce grand géomètre ne donne-t-il à cette loi de répulsion, qu'une sphère d'activité d'une étendue insensible. Mais la manière dont il explique ce défaut de continuité, est bien peu satisfaisante. Il faut sans doute admettre entre les molécules de l'air, une force répulsive qui ne soit sensible qu'à des distances imperceptibles : la difficulté consiste à en déduire les lois que présentent les fluides élastiques. C'est ce que l'on peut faire par les considérations suivantes.

J'observe d'abord qu'une molécule de gaz ou de fluide élastique, contenue dans une enveloppe sphérique, n'étant point en contact avec les molécules voisines; elle doit être en équilibre, en vertu de toutes les forces répulsives qu'elle éprouve; en sorte que  $\varphi$  doit être nul dans l'équation

$$dp = \rho \varphi dr;$$

ce qui donne la pression p constante dans toute l'étendue du fluide. En supposant donc conformément à l'expérience, la pression p fonction de la densité dans les fluides élastiques, à une température constante; on voit que la densité p doit être supposée la même dans toutes les parties du fluide. Nous démontrerons ci-après, ce résultat de l'expérience, pour tous les points du fluide placés à une distance de l'enveloppe, plus grande que le rayon de la sphère d'activité sensible de la force répulsive.

Maintenant, je suppose les molécules des gaz, à une distance réciproque, telle que leur attraction mutuelle soit insensible; ce qui me paraît être la propriété caractéristique de ces fluides, et même des vapeurs, de celles du moins, qui par une légère compression, ne se réduisent point en partie, à l'état liquide. Je suppose ensuite que ces molécules retiennent par leur attraction, la chaleur; et que leur répulsion mutuelle soit due à la répulsion des molécules de la chaleur, répulsion dont je suppose l'étendue de la sphère d'activité, insensible.

Soit c la chaleur contenue dans chaque molécule de gaz; la répulsion de deux molécules sera évidemment proportionnelle à c<sup>2</sup>. En nommant donc r leur distance mutuelle, nous exprimerons la loi de répulsion de deux molécules de gaz, par  $Hc^2$ .  $\phi(r)$ ,  $\phi(r)$  devenant insensible lorsque r a une valeur sensible. H est une constante qui dépend de la force répulsive de la chaleur, et qui semble ainsi devoir être la même pour tous les gaz : mais, pour plus de généralité, je la supposerai seulement constante pour le même gaz. J'imagine présentement une enveloppe sphérique, remplie d'un gaz quelconque. On vient de voir que la pression et la densité seront les mêmes dans tous les points de cette sphère, placés à une distance sensible de l'enveloppe. Je conçois ensuite une sphère intérieure concentrique à l'enveloppe, dont R soit le rayon à très peu près égal à celui de l'enveloppe, de manière cependant, que la densité de la couche du gaz qui recouvre cette sphère puisse être censée constante dans une étendue égale ou supérieure à celle de la sphère d'activité sensible de la force répulsive de la chaleur. Si l'on nomme r le rayon d'une molécule de cette couche, la formule (A) du n° 2, donnera

 $-2\pi \cdot \text{Hc}^2 \cdot \rho \cdot \text{R}^2 \cdot \frac{dd}{dr dR} \cdot \left[ \frac{\psi_{_{\parallel}}(r-\text{R})}{r\text{R}} \right]$ 

pour la force répulsive que la sphère exerce sur cette molécule de la couche. En effet, la nature des forces qui ne sont sensibles qu'à des distances insensibles rend  $\psi_n(r)$  insensible, lorsque r a une valeur sensible. Sur quoi, j'observerai qu'en vertu de cette nature,  $\psi(r)$  est incomparablement supérieur à  $\psi_n(r)$ ;  $\psi_n(r)$  est incomparablement supérieur à  $\psi_n(r)$ , et ainsi de suite. J'affecte l'expression précédente du facteur  $He^*$ , parce que  $\varphi(r)$  a ce facteur. La fonction précédente devient encore par les mêmes considérations

$$2\pi \cdot \frac{\operatorname{H}c^2 \rho \operatorname{R}^2}{r \operatorname{R}} \cdot \sqrt{(r - \operatorname{R})}$$
.

Il faut multiplier cette fonction par  $4\pi \rho r^s dr$ , pour avoir l'action répulsive de la sphère intérieure, sur la couche extérieure dont  $\rho$  est la densité, r le rayon, et dr l'épaisseur. Soit r-R=s, s étant une quantité imperceptible; la fonction précédente devient à très peu près en observant que r est supposé différer extrêmement peu de R,

Il faut ensuite, pour avoir l'action entière de la sphère intérieure sur la couche qui la recouvre, intégrer cette différentielle, depuis s nul jusqu'à s infini; en nommant donc K l'intégrale  $\int ds \psi(s)$  prise dans ces limites, on aura pour cette action,

#### 27. Hc2p2. 47R2K.

Concevons maintenant toutes les molécules du gaz, liées fixement entre elles, et que la couche qui recouvre la sphère, soit divisée en parties finies qui puissent se soulever par l'action répulsive de la sphère, mais qui soient retenues par une pression P exercée sur chaque point de l'enveloppe. Cette pression sur l'enveloppe entière sera  $4\pi R^2$ . P, à très peu près, et elle doit faire équilibre à l'action répulsive de la sphère, ce qui donne

#### $P = 2\pi \cdot Hc^2\rho^2 \cdot K$ .

Cette valeur de P est indépendante du rayon R de la sphère; ce qui tient à ce que l'action répulsive de la chaleur ne s'exerçant qu'à des distances insensibles, on peut ne considérer que les parties du gaz, extrêmement voisines du point de l'enveloppe qui éprouve la pression P. De là et de ce que la pression p dans l'intérieur du gaz est constante, la force  $\varphi$  qu'éprouve chaque molécule étant nulle dans l'équation

### $dp = \rho \cdot \varphi dr;$

il est facile de conclure que, quelle que soit la forme de l'enveloppe, la pression P du gaz est toujours

#### $P = 2\pi H K \rho^2 c^2. \quad (1)$

4. Imaginons cette enveloppe à une température u, et contenant un gaz à la même température. Il est clair qu'une molécule quelconque de ce gaz sera atteinte à chaque instant, par des rayons caloriques émanés des corps environnans. Elle éteindra une partie de ces rayons; mais il faudra, pour le maintien de la température, qu'elle remplace ces rayons éteints, par son rayonnement propre. La molécule, dans tout autre espace à la même température, sera atteinte à chaque instant par la même quantité de rayons caloriques : elle en éteindra une même partie qu'elle rendra par son rayonnement. La quantité de rayons caloriques

qu'une surface donnée recoit à chaque instant est donc une fonction de la seule température, et indépendante de la nature des corps environnans: je la désignerai par  $\Pi(u)$ . L'extinction sera donc  $q.\Pi(u)$ , q étant un facteur constant dépendant de la nature de la molécule ou du gaz. J'observerai ici que la quantité de rayons émanés des corps environnans, et qui forme la chaleur libre de l'espace, est à raison de l'extrême vitesse que l'on doit supposer à ces rayons, une partie insensible de la chaleur contenue dans les corps; comme on l'a reconnu d'ailleurs par les expériences que l'on a faites pour condenser cette chaleur. Maintenant, quelle que soit la manière dont la chaleur des molécules environnantes agit par sa répulsion sur la chaleur de la molécule du gaz, pour en détacher une partie, et pour faire rayonner cette molécule; il est clair que ce rayonnement sera en raison composée de la chaleur et de la densité du gaz environnant la molécule, ou de pe et de la chaleur c contenue dans la molécule; il sera donc proportionnel à  $\rho c^2$ ;  $\rho c^2$  est donc proportionnel à l'extinction  $q.\Pi(u)$ , et nous pourrons supposer

$$\rho c^a = q'.\Pi(u); \qquad (2)$$

q'étant un facteur constant dépendant de la nature du gaz, et H(u) étant une fonction de la température, indépendante de cette nature.

Les équations (1) et (2) renferment les lois générales des fluides élastiques. Elles donnent

en désignant par i le facteur 27/HK.q', qui dépend de la nature du gaz. Cette équation donne en supposant la température constante, P proportionnel à ρ, ce qui est la loi de Mariote. En supposant ensuite P constant, la température u devenant u' et la densité  $\rho$  devenant  $\rho'$ , ce gaz sera atteinte à chaque in (n)  $\hat{\Pi}$  par els rayons caloriques énances des corps environnes. Elle vi (n)  $\hat{\Pi}$   $\hat{\Pi}$  opertie de ces rayons; nais il

Le second membre de cette équation étant indépendant de la nature du gaz, on voit que la fraction - est la même pour tous les gaz, lorsque la température u se change en u'; ce qui est la loi que MM. Dalton et Gay-Lussac nous ont fait connaître, et suivant laquelle le même volume y des divers gaz se change pour tous dans le même volume o', par le même changement de la température u en u'; car on a évidemment par l'action répulsive de la chalem de que gaz, sera par ce qui précède,

5. Les considérations et l'analyse précédentes s'appliquent facilement au mélange des gaz et des vapeurs, qui dans ce mélange n'exercent point d'affinité les unes avec les autres. On sait qu'à la longue, la diffusion de ces gaz, les répand en proportions égales dans toutes les parties du mélange. Je vais donc considérer le mélange de deux gaz dans cet état. Je le suppose dans une enveloppe sphérique. On voit d'abord que chaque molécule de ce mélange, étant en équilibre au milieu de toutes les forces répulsives qu'elle éprouve, la pression doit être la même dans toutes les parties du mélange. Si l'on conçoit, comme ci-dessus, une sphère intérieure concentrique à l'enveloppe, et d'un rayon R à très peu près égal à celui de cette enveloppe; on aura l'action répulsive de cette sphère, sur la couche très mince de gaz qui la recouvre, en considérant la sphère et la couche, comme deux sphères et deux couches, formées des deux gaz. Soient p et p' les densités de ces gaz; l'action de la sphère du premier gaz sur la couche du premier gaz, sera par ce qui précède,  $2\pi$ . HK $c^2\rho^2$ , ou L $c^2\rho^2$ , en désignant  $2\pi$ HK par L; c est la chaleur contenue dans chaque molécule du premier gaz, et L dépend de la nature de ce gaz, ou de la manière dont ses molécules se repoussent mutuellement en vertu de la force répulsive de la chaleur qu'elles contiennent. Il résulte encore de l'analyse précédente, que l'action répulsive du premier gaz sur la couche du second gaz, peut être exprimée par N. cc'ρρ'; c' étant la chaleur contenue dans une molécule du second gaz, et N étant une constante qui dépend de la manière dont deux molécules du premier et du second gaz, se repoussent mutuellement par la force répulsive de leur chaleur. L'action de la sphère du second gaz sur la couche du premier gaz, sera pareillement Ncc'. pp'. Enfin, l'action de la sphère du second gaz sur la couche du second gaz, peut être exprimée par L'. c'2p'2. En réunissant toutes ces actions dont la somme doit être égale à la pression P du mélange, on aura

$$P = L \cdot c^2 \rho^2 + 2N \cdot cc' \cdot \rho \rho' + L' \cdot e'^2 \rho'^2$$

On voit par ce qui précède, que cette valeur de P a lieu quelle que soit la figure de l'enveloppe.

Considérons maintenant, le rayonnement de chaque molécule du gaz mélangé. Le rayonnement d'une molécule du premier gaz, et produit par l'action répulsive de la chaleur de ce gaz, sera par ce qui précède, proportionnel à  $Lc^*p$ . Le rayonnement de la même molécule, par l'action du second gaz sera dans le même rapport avec Ncc'p'. En égalant la somme de ces rayonnemens à l'extinction par la molécule, des rayons qu'elle reçoit, et qui est proportionnelle à la fonction  $\Pi(u)$  de la température u; on aura

$$Lc^2\rho + Ncc'\rho' = i.\Pi(u);$$

i étant un facteur dépendant de la manière dont les molécules du premier gaz éteignent les rayons caloriques. On aura pareillement, en considérant le rayonnement d'une molécule du second gaz,

$$L'c'^{2}\rho' + Ncc'\rho = i' \cdot \Pi(u).$$

Ces deux équations multipliées respectivement par  $\rho$  et  $\rho'$ , donnent en les ajoutant

$$L \cdot c^2 \rho^2 + 2N \cdot cc' \cdot \rho \rho' + L'c'^2 \rho'^2 = i \cdot \rho \cdot \Pi(u) + i'\rho' \cdot \Pi(u)$$
;

Le premier membre de cette équation est la pression P du mélange à la température u. La fonction  $i\rho$ ,  $\Pi(u)$  serait par ce qui précède, la pression du premier gaz, s'il existait seul dans l'enveloppe; et  $i'\rho'$ ,  $\Pi(u)$ , serait la pression du second gaz s'il était seul. En nommant donc  $\rho$  et  $\rho'$  ces pressions, on aura

$$P = p + p'.$$

Il est facile de voir que la pression P d'un nombre quelconque de gaz dont les pressions partielles seraient p, p', p'', etc., sera

$$P = p + p' + p'' + \text{etc.},$$

ce qui est donné par l'expérience.

Cette équation ayant lieu, quelle que soit N; elle subsistera en faisant comme M. Dalton, N nul; c'est-à-dire, en supposant nulle, l'action répulsive réciproque de deux gaz différens. Mais cette hypothèse est bien peu naturelle: elle est d'ailleurs contraire à plusieurs phénomènes.

L'équation (3) donne pour un même gaz

$$\frac{\Pi.(u')}{\Pi.(u)} = \frac{P'\rho}{P\rho'};$$

si l'on nomme v et v' es volumes du gaz, aux températures u et u', on aura  $\frac{\rho}{\sigma} = \frac{v'}{\sigma}$ ; on aura donc

$$\frac{\Pi.(u')}{\Pi.(u)} = \frac{P'v'}{Pv}.$$

En supposant P = P',  $\Pi \cdot (u)$  sera proportionnel à  $\nu$ ; la fonction  $\Pi(u)$  sera donc exprimée par le thermomètre d'un gaz maintenu à une pression constante.

Mais que doit-on entendre par la température u, et quelle est sa mesure? Il paraît naturel de prendre pour cette mesure, la densité même du calorique produit dans un espace, par le rayonnement des corps environnans : alors  $\Pi.(u)$  devient u, et cette densité est mesurée par les degrés du thermomètre à air, ou par v. Pour un degré d'accroissement de température, en partant de la température de la glace fondante, v croît de v, à cette température, étant exprimée par v'; d'où il suit que la densité du calorique de l'espace dont la température est celle de la glace fondante, est représentée par  $266^{\circ}$   $\frac{s}{3}$ .

Une supposition qu'il paraît très naturel d'admettre, est que l'action du calorique d'une molécule des gaz, sur le calorique d'une autre molécule, ne dépend point de la nature de ces molécules; ce qui donne

$$L = L' = N$$
.

Alors on a les équations suivantes relatives au mélange d'un nombre quelconque de gaz, renfermé dans un litre, par exemple, mélange qui n'est dans un état stable d'équilibre, qu'autant que chacune de ses plus petites portions contient les molécules des divers gaz, en même rapport que le mélange total.

$$P = k \cdot (\rho c + \rho' c' + \rho'' c'' + \text{etc.})^{\circ};$$

$$k \rho c \cdot (\rho c + \rho' c' + \rho'' c'' + \text{etc.}) = q \rho u;$$

$$k \rho' c' \cdot (\rho c + \rho' c' + \rho'' c'' + \text{etc.}) = q' \rho' u;$$

$$k \rho'' c'' \cdot (\rho c + \rho' c' + \rho'' c'' + \text{etc.}) = q'' \rho'' u'';$$
etc.

Mécan. cél.  $Tome \ V$ .

16

P est la pression du mélange; k est une constante dépendante de l'intensité de la force répulsive mutuelle des particules du calorique; c, c', c'', etc., sont les quantités de châleur contenues dans un gramme du premier gaz, du second, du troisième, etc.;  $\rho$ ,  $\rho'$ ,  $\rho''$ , etc., sont les nombres de grammes de ces gaz, dans un litre du mélange; u est la température du mélange, et q, q', q'', etc., sont des constantes dépendantes de la nature de chaque gaz.

Les équations (A) donnent

$$\frac{\rho'c'}{\rho c} = \frac{q'\rho'}{q\rho}; \quad \frac{\rho''q''}{\rho c} = \frac{q''\rho''}{q\rho}; \text{ etc.}$$

on a donc

$$\rho c + \rho' c' + \rho'' c'' + \text{etc.} = (\rho q + \rho' q' + \rho'' q'' + \text{etc.}) \cdot \frac{c}{q}.$$

Ainsi en faisant

$$pq + p'q' + p''q'' + \text{etc.} = (q) \cdot (p);$$
  
 $p + p' + p'' + \text{etc.} = (p);$   
 $C = \frac{(q) \cdot c}{q};$ 

les équations (A) donneront

$$P = k \cdot (\rho)^{2} \cdot C^{2};$$
 (5)  
 $k \cdot (\rho) \cdot C^{2} = (q) \cdot u.$  (6)

Ces équations sont les mêmes que les équations (3) et (4) relatives à un fluide simple. Elles reviennent à considérer comme molécules du fluide composé, un groupe infiniment petit dans lequel les molécules des divers gaz entrent dans le même rapport, que dans le mélange entier. C est le calorique contenu dans un gramme de ce mélange; (p) est le poids d'un litre du mélange.

L'air atmosphérique est, comme on sait, composé de quatre différens gaz, savoir, l'azote, l'oxigène, la vapeur aqueuse, et un peu d'acide carbonique; on peut donc appliquer à ce fluide composé, les équations (5) et (6). On peut encore dans les vibrations aériennes, considérer l'air comme formé de groupes pareils à ceux que je viens d'imaginer. A la vérité, chaque molécule d'un de ces groupes étant sollicitée par des forces différentes, les molécules devraient, dans leurs mouvemens, se séparer; mais les obstacles que les autres groupes opposent à cette

séparation, suffisent pour les retenir ensemble, en sorte que le centre de gravité de chaque groupe, se meut comme si ces molécules étaient liées fixement entre elles; et c'est ainsi que nous les envisagerons dans la suite.

Les équations (5) et (6) donnent

Pour cela l'imagine un just (9) (9) 
$$= \mathbf{q}$$

ainsi la température restant la même, la pression d'un fluide quelconque, simple ou composé, est proportionnelle à sa densité; ce qui est la loi de Mariote.

Les mêmes équations donnent encore, pour un autre fluide simple ou composé, sanoger area empiroles dos contros al abancas de la control de la

sique d'une molecule B pla; 
$$u.(\gamma).(\gamma) = \Phi$$
 section. Soit  $f$  la distance

 $(\rho')$  étant la densité du second fluide, et (q') étant la valeur de (q) relative à ce fluide; on a donc, quelles que soient la pression P et la température  $\mu$ , a final and a superior de la densité du second fluide et (q') étant la valeur de (q)

Le rapport des densités des deux fluides reste donc toujours le même; ce qui est la loi de MM. Dalton et Gay-Lussac.

## H. o(f) étant la loi de répulsion RA Marque, à la distance f. Il faut

Nous devons faire ici une remarque importante. La chaleur que nous avons désignée par c, est la chaleur libre ou sensible d'une molécule, celle qui exerce une action sensible sur le thermomètre. Les physiciens ont été conduits par les phénomènes, à distinguer dans la chaleur absolue d'une molécule, deux parties, l'une sensible sur le thermomètre, l'autre latente, ou qui n'exerce sur lui aucune action. En désignant donc par i, cette chaleur latente; la chaleur absolue sera c+i.

6. Nous avons supposé dans ce qui précède, que le calorique d'une molécule y était retenu par l'attraction de cette molécule qui n'éprouvait d'action sensible, que par la force répulsive qu'exerce sur ce calorique, celui des molécules environnantes. Cependant chaque molécule d'un corps est soumise à l'action de ces trois forces, 1°. la force répulsive de son calorique, par le calorique des autres molécules; 2°. l'attraction de

son calorique par ces molécules; 3°. l'attraction de la molécule ellemême, soit par le calorique de ces molécules, soit par les molécules mêmes. Sans doute, dans l'état aériforme, la première de ces forces l'emporte beaucoup sur les autres; mais il est utilé de connaître leur influence.

Pour cela, j'imagine un parallélépipède vertical, d'une longueur et d'une largeur indéfinies. Je le conçois rempli d'un gaz en équilibre. En le divisant par une section horizontale, je puis supposer toutes les molécules du gaz au-dessus de cette section, liées fixement entre elles : je considère une de ces molécules que je désigne par A, élevée de la hauteur r, au dessus de la section : son calorique sera repoussé par le calorique d'une molécule B placée au-dessous de la section. Soit f la distance mutuelle des deux molécules; r' la distance de la molécule B, à la section; et s, la distance horizontale des deux molécules. Soit c le calorique contenu dans chaque molécule; p la densité du gaz. Il est facile de voir que l'ensemble du calorique des molécules pour lesquelles r', f et s sont les mêmes que pour la molécule B, exercera sur le calorique de la molécule A, une force répulsive qui décomposée suivant la verticale, sera

 $2\pi \cdot c^{2} \cdot \frac{s \cdot (r+r')}{f} \cdot H \cdot \phi(f)$ , M ob iol sl teo iup so

 $H.\varphi(f)$  étant la loi de répulsion du calorique, à la distance f. Il faut multiplier cette fonction par edsdr', et pour avoir l'action entière répulsive du gaz inférieur à la section, sur la molécule A, il faut prendre l'intégrale de ce produit, depuis s nul jusqu'à s infini, et depuis r' nul jusqu'à r' infini. On a

d'une molécule, deux pa; 
$$(v+1)^4$$
  $(v+n) = v$  le thermomètre, l'autre

ainsi en ne faisant varier que f et s, on aura anno la infinit mala de la contraction de la contr

le produit recedent de la conciona del conciona de la conciona de la conciona del conciona de la conciona del la conciona de la conciona della conciona dell

celui des molécule 
$$h.(f)$$
,  $\phi(f)$ ,

Nommons  $\varphi_i(f)$  l'intégrale fdf.  $\varphi(f)$  prise de manière que  $\varphi_i(f)$ 

soit nul, lorsque f est infini. En intégrant ce produit, depuis s nul jusqu'à s infini, on aura jusqu'à s mini, on aura

Par la réunion de ces divisions associates associates as a point au reunion de ces divisions aura de ces divisions au reunion de ces division de ces divisions au reunion de ces divisions au reunion de ces division de ces divis

$$-2\pi \cdot H \cdot \rho c^2 \cdot (r+r') \cdot dr' \cdot \phi_1(r+r')$$

Désignons par  $\downarrow(f)$ , l'intégrale  $\int f df \cdot \varphi_i(f)$  prise de manière que  $\psi(f)$  soit nul, lorsque f est infini. La fonction précédente intégrée depuis r' nul, jusqu'à r'infini, sera esq al 40 paq anob trangish al

c'est l'expression de la force répulsive que le calorique du gaz inférieur à la section, exerce dans le sens vertical, sur le calorique de la molécule A. Soit Q la surface de la section horizontale dont nous avons parlé; il est facile de voir que l'action verticale du calorique du gaz inférieur, sur le calorique du gaz supérieur, et tendante à le soulever, actions reunies, la répulsion du calorique de A sera Hct. O(r)-Me. laris

l'intégrale étant prise depuis r nul jusqu'à r infini.

L'intégrale  $\int dr \cdot \psi(r)$  est ce que nous avons ci-dessus nommé K; ainsi le gaz supérieur est soulevé par le gaz inférieur, par une force

Mais le calorique du gaz inférieur, par l'attraction qu'il exerce sur les molécules du gaz supérieur, produit une force contraire. Si l'on désigne par  $M.\Pi(f)$ , la loi de cette attraction; il est facile de voir par ce qui précède, qu'en nommant K', ce que devient K, lorsqu'on change  $\varphi(f)$ dans  $\Pi(f)$ ; la force résultante de l'attraction des molécules supérieures du gaz, par le calorique des molécules inférieures, sera

c'est aussi la force résultante de l'attraction du calorique supérieur, par les molécules du gaz inférieur. Enfin, si l'on désigne par  $N.\Gamma(f)$ , la loi de l'attraction des molécules du gaz, les unes sur les autres; on aura

pour la force verticale du gaz supérieur, résultante de l'attraction réci-

proque des molécules; K'' étant ce que devient K, lorsqu'en change  $\varphi(f)$  dans  $\Gamma(f)$ .

Par la réunion de ces diverses actions, le gaz supérieur tend à être soulevé par une force égale à

Désignons par d'un Me de Manière de manière que de l'un de l'origne de manière que de l'un lorsque f est infini La donction précédente integrée

En désignant donc par QP la pression nécessaire pour contenir ce gaz, on aura

 $P = 2\pi \cdot \rho^2 \cdot (HK \cdot c^2 - 2MK'c - NK'')$ 

Considérons maintenant le rayonnement d'une molécule A d'un gaz. L'action du calorique d'une molécule B sur le calorique de A sera par ce qui précède,  $Hc^{2}$ .  $\varphi(r)$ , et l'attraction qu'exèrce la molécule B sur ce même calorique, sera  $Mc \cdot \Pi(r)$ . Ainsi, par ces deux actions réunies, la répulsion du calorique de A sera  $Hc^{2} \cdot \varphi(r)$ — $Mc \cdot \Pi(r)$ . En considérant donc A, comme le centre d'une sphère indéfinie; la compression de son calorique, par les forces attractives et répulsives des molécules environnantes, sera

ainsi le gaz supérif(4) II. 6 Mule (4) par all sah difficult, par une force

les intégrales étant prises depuis r'hul jusqu'à r infini; ce qui donne pour cette fonction qui l'altraction que l'altraction

molécules da gaz sur (6) T. 3 Mrod (6) Una 3HJ. 9. 98 raire. Si l'on désigne par M. II(f), la loi de cette attraction; il est faule de voir par ce qui

 $\overline{\mathcal{A}}(r)$  étant ce que devient  $\mathcal{A}(r)$ , lorsque l'on change  $\varphi(r)$  dans  $\overline{\mathcal{A}}(r)$ 

Si l'on considère ainsi que nous le faisons, cette compression, comme cause du rayonnement de la molécule A; ce rayonnement devant être supposé proportionnel à la température, ou à la densité u du calorique de l'espace, on aura

c'est aussi la force résultante de l'attraction du calorique supérieur, par les molécules du gaz intéreur. Enfin, se lon designe par  $N.\Gamma(f)$ .

la loi de l'attraction des molécules du gaz, les antraction de l'attraction des molécules du gaz, les antractions de l'attraction de l'attraction de la company de la comp

Par la loi de Mariote, on a "N. M.O. TE

pour la force verticale du gaz . W. Ap mu q résultante de l'attraction réci-

On aura donc, en substituant pour P sa valeur précédente,

$$HKc^2 - 2M.K'c - NK'' = 6.[Hc^2. 4(0) - Mc. \overline{4}(0)];$$

6 étant une constante. Cette équation devant subsister, quel que soit c; on voit d'abord que NK" est nul, ou du moins insensible; c'est-à-dire que dans l'état de gaz, la force attractive des molécules disparaît devant la force répulsive de leurs caloriques. On voit ensuite que l'on doit avoir

Lorsque le vase a une pelite 
$$h(0)$$
 $\overline{\Psi}_{12}$   $h(0)$  $\Psi_{13}$  incomparablement mondre que P; on peut donc alors, "M2  $\overline{pos}$  dans toute l'étendue du gaz.

si dans l'état de gaz, l'attraction d'une molécule sur le calorique d'une autre molécule est sensible. Or il est visible que cette équation n'a pas lieu, si  $\varphi(r)$  est égal à  $\Pi(r)$ , ou si la loi de cette attraction est la même que la loi de répulsion du calorique; ce qui devient évident, en mettant l'équation précédente sous cette forme,

du gaz, c doit ûtre constant, aires que 
$$\rho c$$
; donc aussi  $\rho$  poit être posé le même dans toutes  $(9)$   $\overline{\psi}$   $\rho$   $\underline{\psi}$   $\underline{\psi}$ 

les intégrales étant prises depuis r nul jusqu'à r infini. D'ailleurs il n'est pas naturel de supposer dans tous les gaz,  $\varphi(r)$  et  $\Pi(r)$ , tels qu'ils satisfassent à cette équation. Il est donc extrêmement probable que la force attractive du calorique d'une molécule par une autre molécule, est insensible dans l'état de gaz, et qu'il n'y a de sensible dans cet état, que la force répulsive du calorique.

Nous avons dit précédemment que la densité d'un gaz contenu dans un vase pouvait être supposée la même dans toute son étendue, à l'exception des parties extrêmement voisines des parois du vase. Pour le faire voir, nous observerons que, par ce qui précède, la force répulsive du gaz inférieur à la section horizontale sur le gaz supérieur, est

$$-2\pi.\text{H.Q.} \int dr dr' \cdot \rho_1 c_1 \cdot \rho' c' \cdot (r+r') \cdot \varphi_1(r+r');$$

 $\rho_1$ ,  $c_1$  se rapportant aux molécules du gaz supérieur;  $\rho'$ , c' se rapportant aux molécules du gaz inférieur. Les intégrales doivent être prises depuis r et r' nuls, jusqu'à r et r' infinis. Il est visible que si l'on suppose les variations de  $\rho$  et de c, incomparablement moins rapides que celle de  $\phi(r)$ , comme elles le sont, lorsque les molécules du gaz sont

à une distance sensible des parois; les termes dus à ces variations, sont insensibles, et l'on peut supposer cette intégrale égale à  $2\pi \cdot Q \cdot H \cdot K \cdot \rho^2 c^2$ ;  $\rho$  et c, se rapportant aux molécules contiguës à la section horizontale. Cette force répulsive doit balancer la pression PQ de la surface supérieure du vase, plus le poids du gaz supérieur, que je désignerai par mQ; ainsi l'on aura

$$2\pi \cdot HK \cdot \rho^2 c^2 = P + m$$
.

Lorsque le vase a une petite hauteur, m est incomparablement moindre que P; on peut donc alors, supposer dans toute l'étendue du gaz, pc constant. Le rayonnement d'une molécule A contiguë à la section horizontale, donne par ce qui précède,

$$H_{\rho c^{2}}$$
.  $\psi(0) = Lu.$ 

La température u étant donc supposée la même dans toutes les parties du gaz, c doit être constant, ainsi que  $\rho c$ ; donc aussi  $\rho$  peut être supposé le même dans toutes ces parties, pourvu qu'elles soient à une distance sensible des parois.

les intégrales étant prises depuis r nul jusqu'à r infini. D'ailleurs il n'est pas naturel de supposer dans tous les gaz,  $\varphi(r)$  et  $\Pi(r)$ , tels qu'ils satisfissent à cette équation. Il est donc extremement probable que la force attractive du calorique d'une molécule par une autre molecule, est insensible dans l'état de gaz, et qu'il n'y a de sensible dans cet état, .

Nous avons dit précédemment que la densité d'un gaz contenu dans un vase pouvait être supposée la même dans toute son étendue, à l'exception des parties extrêmement voisines des parois du vase. Pour le faire voir, nous observerons que, par ce qui précède, la force répulsive

#### $-3\pi.\text{H.Q.} f dr dr' \cdot \rho_{,c_{i}} \cdot \rho' c' \cdot (r + r') \cdot \phi_{,i} (r + r') \cdot$

 $\rho_1$ ,  $\alpha_i$  se rapportant aux molécules du gaz supérieur;  $\rho'$ ,  $\rho'$  se rapportant aux molécules du gaz inférieur. Les intégrales doivent être prises depuis r et r' nuls, jusqu'à r et r' infinis. Il est visible que si l'on suppose les variations de  $\rho$  et de  $\rho'$  incomparablement moins rapides que celle de  $\rho(r)$ , comme elles le sont, loi sque les molécules du gaz sont

en nommant dt, l'elément du temps,

# CHAPITRE III.

(ddf) = - (7. HK, 6.

De la vitesse du Son et du mouvement des Fluides élastiques.

7. Considerons pour plus de simplicité, un cylindre horizontal, étroit, creux, rempli d'un gaz, et d'une longueur indéfinie. Soit x la distance d'une molécule A de gaz placée dans l'axe du cylindre, à l'origine de cet axe;  $\rho$  la densité du gaz, correspondante à cette molécule dont c soit la chaleur libre. Soient  $\rho'$  et c' les expressions des mêmes quantités relatives à une molécule B placée sur l'axe, à la distance x+s. Il résulte de ce que nous venons de dire à la fin du chapitre précédent, que la force répulsive du calorique c de la molécule A, par le calorique du gaz entier, est dans le sens horizontal,

l'intégrale étant prise depuis s égal à -∞ jusqu'à s=∞. On a

production 
$$\rho'c' = \rho c + s \cdot \frac{d \cdot \rho c}{dx} + \text{etc.}$$

On peut ici ne considérer que les deux premiers termes du développement de p'c'; alors l'intégrale précédente devient

$$-4\pi.$$
Hc. $\frac{d.\rho c}{dx}$ . $\int s^2 ds.\phi_s(s)$ ,

l'intégrale étant prise depuis s nul, jusqu'à s infini; ce qui donne

moitanne I el en 
$$\int s^2 ds \cdot \varphi_1(s) = -\int ds \cdot \psi(s) = -K$$
; no I em moo inste

ainsi le gaz entier produit dans la molécule A, une force répulsive dirigée vers l'origine des x, et égale à  $4\pi$ . HKc.  $\frac{d \cdot \rho c}{dx}$ ; ce qui donne,

MÉCAN. CÉL. Tome V.

en nommant dt, l'élément du temps,

$$\left(\frac{ddx}{dt^2}\right) = -4\pi.$$
HK.c. $\frac{d.\rho c}{dx}$ .

Soit X la coordonnée horizontale de la molécule A dans l'état d'équilibre, et faisons x = X + z, z étant une quantité très petite par rapport à X. Supposons

 $\frac{\left(\frac{d \cdot \rho c}{dx}\right)}{\frac{\rho c}{\rho}} = (1 - 6) \cdot \frac{\left(\frac{d\rho}{dx}\right)}{\frac{\rho}{\rho}}.$ 

En nommant (f) la densité du gaz dans l'état d'équilibre, on aura

creux, rempli d'un gaz, et d'ux loneurem indéfinie Soit 
$$x$$
 la distance, d'une molécule A de gaz p' $\overline{sb}$   $(\mathfrak{A}) = \mathfrak{A}$ u cylindre, à l'origine de

En négligeant le carré de dz, et observant que  $\left(\frac{dp}{dx}\right)$  est égal à  $\left(\frac{dp}{dX}\right)$ , on aux

 $\left(\frac{d\rho}{dx}\right) = -\left(\rho\right)\left(\frac{ddz}{dX^2}\right).$ 

On a ensuite

$$\left(\frac{ddx}{dt^2}\right) = \left(\frac{ddz}{dt^2}\right);$$

on aura donc

$$\left(\frac{ddz}{dt^2}\right) = 4\pi \cdot \text{HK} \cdot (\rho)c^2 \cdot (\tau - \theta) \cdot \left(\frac{ddz}{dX^2}\right);$$

équation dans laquelle on peut supposer que c se rapporte ainsi que (ρ), à l'état d'équilibre, puisque l'on néglige les termes de l'ordre z². La pression du gaz dans l'état d'équilibre, étant exprimée par P; on a par le chapitre précédent,

 $P = 2\pi \cdot H \cdot K \cdot (\rho)^2 \cdot c^2$ ;

on aura donc

$$\left(\frac{ddz}{dt^2}\right) = \frac{2P}{(\rho)} \cdot (1 - 6) \left(\frac{ddz}{dX^2}\right).$$

Ainsi la vitesse du son, ou l'espace qu'il parcourt dans une seconde, étant comme l'on sait, et comme il est facile de le conclure de l'équation précédente, la racine carrée du coefficient de  $\left(\frac{ddz}{dX^2}\right)$ ; cette vitesse sera

dirigée vers l'origine des 
$$\infty$$
,  $(3 - \frac{1}{2})$ .  $(3 - \frac{1}{2})$  ce qui doirne

Pour appliquer cette formule à l'air atmosphérique, soit h la hauteur d'une atmosphère de la densité (p), et é la hauteur dont la pesmiteur fait tomber les corps dans une seconde; cette vitesse sera l'important l'air l'air

# que de ces trois choses, la chaleur libre c, la température u de l'espace, la densité $\rho$ de l'air. On (3 urai). 344 vuter la température v de la

Les géomètres en étendant ces principes et cette analyse au cas où l'air a trois dimensions, trouveront facilement que dans ce cas la vitesse du son a la même expression.

La formule de Newton donne  $\sqrt{2h\varepsilon}$  pour l'expression de cette vitesse. En partant des valeurs connues de  $\varepsilon$  et de h, elle serait de  $283^{met}$ ,4 dans une seconde sexagésimale, à la température de  $5^{\circ}$ ,5. L'expérience faite en 1738, par les académiciens français, a donné à cette température,  $337^{met}$ ,2. Il est donc bien certain que la formule de Newton donne un résultat trop faible. Si la valeur de i était nulle, ce qui rendrait c constant et par conséquent c nul; la formule trouvée ci-dessus, donnerait c donc bien prouvé par cette expérience, qu'il existe une chaleur latente i, dans les molécules des gaz.

Je vais maintenant déterminer la valeur de i-6, dont dépend, comme on l'a vu, la vitesse du son dans l'atmosphère. Pour cela, j'observe que pendant la courte durée d'une vibration aérienne, la chaleur absolue c+i d'une molécule d'air, vibrante, peut être supposée constante; car cette chaleur ne pouvant se dissiper que par le rayonnement ou par sa communication aux molécules voisines, il faut, pour avoir ainsi une perte sensible, un temps beaucoup plus grand que la durée d'une vibration, durée qui n'excède pas une tierce. Il n'en est pas de même de la chaleur libre c, qui se perd non-seulement par le rayonnement, mais encore par sa combinaison due à la variation de la densité c. On peut donc, dans le cas présent, supposer c0 ou c0 ou c0 ou c0 ou c0.

La température u de l'espace ou la densité du fluide discret qui la représente, peut aussi être supposée constante pendant la durée d'une vibration aérienne. Elle varie dans le point de l'espace, occupé par une molécule aérienne vibrante, à raison de la variation de densité de l'air qui l'environne; mais cette densité n'est variable que dans l'étendue de la vibration, étendue très petite par rapport à l'espace environnant:

la variation de u, étant de l'ordre du produit de cette étendue par la variation de la densité de l'air; on voit qu'elle peut être négligée. Maintenant la chaleur absolue c+i de la molécule ne peut dépendre que de ces trois choses, la chaleur libre c, la température u de l'espace, la densité  $\rho$  de l'air. On pourrait y ajouter la température v de la molécule; mais cette température étant celle de l'espace dans lequel la molécule serait en équilibre de chaleur, elle est donnée par l'équation

elle est ainsi fonction de  $\rho$  et de c. De la relation qui existe entre les trois choses dont je viens de parler, on conclut que c+i est fonction de  $k\rho^ac^a$ ,  $\rho$  et u. Désignons par V cette fonction, et par P la quantité  $k\rho^ac^a$ ; les suppositions de c+i et de u constans, donneront

o = 
$$\frac{dP}{P} \cdot P \left( \frac{dV}{dP} \right) + \frac{d\rho}{\rho} \cdot \rho \left( \frac{dV}{d\rho} \right)$$
.

trouvée ci-dessus, donnerait hoome A pour la vitesse, siusas aOt

17..

trop considérable. 
$$[\frac{Vb}{qb}] \stackrel{?}{=} i$$
, dans les  $\frac{qb}{q} = \frac{p_0}{p_0} = \frac{p_0}$ 

Mais nous avons désigné  $\frac{d \cdot \rho c}{r}$  par  $(1 - 6) \cdot \frac{d\rho}{r}$ ; on a donc of our overse escoques onto the plant of the

constantes car cette chal 
$$(Vb)$$
 be ronvent to dissiper que par le rayon-
ilement ou par sa conum  $(\sqrt[4]{b})$  idi $\overline{\mathbf{z}}$  eux molecules voisines, il faut, pour
avoir ainsi une peete sei  $(\sqrt[4]{b})$ ,  $\mathbf{q}$ n temps beaucoup plus grand que la
durée d'une vibration, durée qui n'excède pas une tierce all a'en est pas

La vitesse du son, que nous avons trouvée égale à  $\sqrt{4h\epsilon.(1-6)}$ , devient ainsi

On peut donc, dans le 
$$\frac{1}{\epsilon} = \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{\frac{b}{4b}}} \cdot \frac{1}{9 \cdot 34c}$$
 egal  $\frac{1}{6} - di$ .

La température  $u$  de l'es  $\frac{\sqrt{b}}{4c} \cdot \frac{1}{2} \cdot$ 

vibration actionne. Elle  $(\frac{Vb}{qb})^{\frac{1}{d}}$  dans le point de l'espace, occupé par une character el tres de la vibration de la vibration, étendue de la vibration de la vibr

leur spécifique de l'air, lorsqu'il est soumis à une pression constante, à sa chaleur spécifique, lorsque son volume est constant. En effet, en élevant d'un degré la température u, d'une masse d'air soumise à une pression constante, on augmente sa chaleur absolue c+i, de la quantité

par le manomètre qui était res 
$$(Vb)$$
 au niveau, ils ont promptement fermé la robinet, en sorte que l'intes  $(\sqrt{4b})$ .  $(\sqrt{4b})$  en cover pure et su fetmeture.

 $\mu\rho$  étant la diminution de densité que cet accroissement de température produit dans la masse d'air, et  $\mu$  étant un coefficient qui, suivant les expériences de M. Gay-Lussac, est 0,00375 à la température de la glace fondante. Si l'on suppose le volume de la masse, constant; la chaleur nécessaire pour accroître d'un degré sa température, sera

moven. On peut voir time is 
$$\sqrt{\frac{Vb}{q}}$$
,  $q_{\mu}$ 

Ces deux quantités de chaleur sont ce que l'on nomme chaleurs spécifiques dont le rapport est ainsi

$$\frac{-\rho \cdot \left(\frac{d\mathbf{V}}{d\rho}\right)}{\mathbf{P} \cdot \left(\frac{d\mathbf{V}}{d\mathbf{P}}\right)}$$

De là, il suit que l'on aura la vitesse du son, en multipliant la formule Newtonienne par la racine carrée du rapport de ces chaleurs spécifiques; ce qui est le théorème que j'ai donné sans démonstration, dans les Annales de Physique et de Chimie de l'année 1816.

Pour comparer ce résultat à l'expérience, je vais faire usage d'une expérience très intéressante de MM. Desormes et Clément, que ces savans physiciens ont consignée dans le Journal de Physique du mois de novembre 1819. Ils ont rempli d'air atmosphérique, un ballon de verre, dont la capacité était de 28<sup>litres</sup>, 40. La pression de l'air, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, était alors représentée par une hauteur du baromètre, égale à 766<sup>mil</sup>, 5. La température était 12°, 5 : cette température et la hauteur du baromètre extérieur, ont été constantes pendant la durée de l'expérience, condition indispensable. Ils ont ensuite extrait du ballon, une petite quantité d'air, et ils l'ont fermé au moyen d'un robinet. Après le temps nécessaire pour que la température intérieure fût redevenue la même que l'extérieure, ils ont observé la différence de pression du dedans au-dehors, au moyen d'un manomètre adapté

au ballon, et ils ont trouvé la pression intérieure moindre que l'extérieure, de 13<sup>mil</sup>, 81. En ouvrant ensuite le robinet, l'air extérieur est entré dans le ballon : lorsqu'il a cessé de s'y introduire, ce qu'ils ont jugé, soit par la cessation du bruit que l'air faisait en y entrant, soit par le manomètre qui était revenu au niveau, ils ont promptement fermé le robinet, en sorte que l'intervalle entre son ouverture et sa fermeture, n'a pas été ½ de seconde. Le manomètre ensuite a remonté, et lorsqu'il a été stationnaire, ou lorsque la température intérieure est redevenue la même que l'extérieure, il a indiqué une pression intérieure plus petite que l'extérieure, de 3<sup>mil</sup>, 611. Cette expérience, la meilleure de soixante expériences de ce genre qu'ils ont faites, en est le résultat moyen. On peut voir dans le Journal cité, une description plus étendue de l'appareil et des précautions qui ont été prises.

Dans cette expérience, la chaleur absolue c+i, de chaque molécule d'air intérieur, et la température u de l'espace, peuvent être supposées sensiblement constantes comme dans le son, pendant la courte durée de l'ouverture du robinet. Mais en désignant par P' la pression intérieure, immédiatement avant l'ouverture du robinet; l'air intérieur pendant l'ouverture du robinet, a passé de cette pression à la pression P de l'atmosphère, puisqu'au moment de la fermeture du robinet, il faisait équilibre à cette dernière pression. En nommant ensuite  $\rho$  la densité de l'air atmosphérique,  $\rho'$  celle de la masse de l'air intérieur, immédiatement avant l'ouverture du robinet, et  $\rho''$  la densité de cette masse, au moment de la fermeture du robinet; les suppositions de c+i et de u constans, donneront

$$o = \left(\frac{P - P'}{P'}\right) \cdot P' \cdot \left(\frac{dV'}{dP'}\right) + \left(\frac{\rho'' - \rho'}{\rho'}\right) \cdot \rho' \left(\frac{dV'}{dP'}\right);$$

V', P', \( \rho'\) étant ce que deviennent pour l'air du ballon avant l'ouverture du robinet, les quantités V, P, \( \rho\) relatives à l'air atmosphérique. Il ést facile de voir que la densité \( \rho''\) est à très peu près celle de l'air intérieur à la fin de l'expérience, à cause de la très petite quantité d'air introduite dans le ballon, pendant l'ouverture du robinet. Cette densité est donc proportionnelle à la pression intérieure à la fin de l'expérience, pression que nous désignerons par P'', ce qui donne

on a done

$$= 1 - \frac{e' \cdot \left(\frac{dV'}{d\rho'}\right)}{P' \cdot \left(\frac{dV'}{dP'}\right)} = \frac{P - P'}{P' - P'} \cdot 1$$

Ainsi, la température de l'atmosphère étant supposée de douze degrés et demi centigrades, et sa pression étant P', ou 752<sup>mil</sup>, 69, la vitesse du son sera, d'après cette expérience,

$$\sqrt{2h\epsilon \cdot \frac{13^{mil}, 8h}{10^{mil}, 199}}$$

parce que l'on a

$$P - P' = 13^{mil}, 81$$
,  
 $P - P'' = 3^{mil}, 611$ .

Le rapport des deux chaleurs spécifiques de l'air est donc, suivant cette expérience, égal à 1,354, lorsque la hauteur du baromètre est 752<sup>mil</sup>,69, et lorsque sa température est 12°,5.

Les expériences sur l'air, donnent à cette température,  $\sqrt{2h\varepsilon}$ , égal à  $286^m$ , 1; d'où résulte la vitesse du son égale à  $332^m$ , 9. Les académiciens français l'ont observée de  $337^m$ , 2, à la température de  $7^\circ$ , 5. Il faut l'augmenter de  $3^m$ , 2 pour la faire correspondre à une température de  $12^\circ$ , 5, ce qui donne  $340^m$ , 4; résultat qui ne surpasse celui de la théorie, que de  $7^m$ , 5.

MM. Gay-Lussac et Welter ont bien voulu me communiquer une des nombreuses expériences qu'ils ont faites sur cet objet, par un moyen qui paraît encore plus précis, tant par la brièveté de l'intervalle pendant lequel l'air intérieur communique avec l'air extérieur, intervalle qui n'est pas d'un sixième de seconde, que par les précautions prises pour s'assurer que le manomètre indique à la fin de cet intervalle la même pression à l'intérieur qu'au dehors. Au lieu de raréfier l'air intérieur comme MM. Clément et Desormes l'avaient fait, ils le compriment de manière qu'avant la communication avec l'atmosphère, la pression intérieure surpasse l'extérieure. Dans l'expérience citée, cet excès était de 16<sup>mil</sup>, 3644. Après cette communication, et lorsque l'air intérieur eut repris la température extérieure, la pression intérieure ne surpassait plus celle de l'atmosphère, que de 4<sup>mil</sup>, 4409. Cette dernière pression a été pen-

dant la durée de l'expérience, égale à 757<sup>mil</sup>, et la température extérieure a été de 13°. On a donc eu dans cette expérience,

$$P = 757^{mil}$$
;  $P' - P = 16^{mil}$ ,  $3644$ ;  $P'' - P = 4^{mil}$ ,  $4409$ ;

ce qui donne

ergels expob ab esseques 
$$\frac{P-P'}{P''-P'}=1,37244$$
. ab embroques at isniA

C'est le rapport des deux chaleurs spécifiques de l'air, rapport qui, par l'expérience précédente, est 1,354. On voit ainsi que les résultats des deux expériences faites à peu près à la même pression et à la même température, diffèrent peu entre elles, ce qui en prouve la justesse. La vitesse du son, conclue de l'expérience de MM. Gay-Lussac et Welther, est 335<sup>m</sup>, 2. Elle rapproche la théorie, de 2<sup>m</sup>, 3, du résultat de l'observation. D'autres expériences des mêmes savans, donnent un résultat encore plus rapproché de celui de l'observation. Mais ces expériences ont été faites sur de l'air desséché; ce qui peut produire une légère différence entre ces résultats. D'ailleurs, l'observation des académiciens français, consignée dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de l'année 1738, doit être répétée avec plus de soin, et en y employant toutes les précautions suggérées par les progrès de la Physique.

Cette considération me fit proposer au Bureau des Longitudes, la répétition de cette expérience. Elle donne 340m, 889, à la température de 15°, 9 centésimaux : la hauteur du baromètre était 755, 6. Pour comparer à cette expérience, ma formule de la vitesse du son; j'ai conclu la valeur de h, des expériences de MM. Biot et Arago, sur le rapport de la densité de l'air à celle du mercure. J'ai déduit la valeur de e, de l'expérience du pendule par Borda, et l'ensemble des nombreuses expériences de MM. Gay-Lussac et Welter, m'a donné 1,3748 pour le rapport des deux chaleurs spécifiques de l'air. J'ai trouvé ainsi 337<sup>m</sup>, 144 pour la vitesse du son à 15°, 9 de température. On doit faire à ce résultat, une petite correction dépendante de l'état hygrométrique de l'air. Toutes les expériences de MM. Biot, Arago, Gay-Lussac et Welter, ont été faites sur un air privé d'humidité. La vapeur aqueuse répandue dans l'air atmosphérique étant plus légère que ce fluide, il doit en résulter dans la vitesse du son, un effet analogue à celui de la chaleur. Dans la nouvelle expérience, les hygromètres à cheveu indiquaient 72°. En partant des expériences

de M. Gay-Lussac, sur cet hygromètre, et sur la densité de la vapeur aqueuse, je trouve o<sup>m</sup>,571 pour l'effet hygrométrique de l'air : en l'ajoutant à la vitesse précédente, on aura 337<sup>m</sup>,715, ce qui ne diffère du résultat 340<sup>m</sup>,889, que de 3<sup>m</sup>,174. Cette différence me paraît être dans les limites des petites erreurs dont la nouvelle expérience et les élémens du calcul dont j'ai fait usage, sont encore susceptibles.

Les Savans français et espagnols envoyés au Pérou pour mesurer un degré du méridien, ont fait à Quito, l'observation de la vitesse du son, qu'ils ont trouvée la même à fort peu près que l'on avait observée à Paris, quoiqu'il y ait une grande différence entre les pressions de l'atmosphère dans ces deux villes, la hauteur moyenne du baromètre n'étant à Quito que de 544<sup>mil</sup>. Cette observation fournit le moyen de vérifier le théorème que j'ai donné pour corriger la formule Newtonienne sur la vitesse du son. La vérité de ce théorème exige que C désignant la chaleur spécifique de l'air, lorsque la pression est constante, et C<sub>1</sub> désignant cette chaleur spécifique, lorsque le volume est constant; le rapport  $\frac{C}{C_1}$  soit à peu près le même, sous les deux pressions barométriques  $544^{mil}$  et  $760^{mil}$ : c'est en effet ce que MM. Gay-Lussac et Welter ont trouvé par l'expérience.

La fonction V est inconnue, et l'avantage des expériences précédentes, est de donner le rapport des deux chaleurs spécifiques de l'air, sans faire aucune supposition sur cette fonction. Il serait cependant bien intéressant de la connaître pour la théorie des phénomènes de pression et de chaleur de l'air atmosphérique. Pour y parvenir, j'observe que depuis la pression représentée par 144<sup>mil.</sup> jusqu'à la pression 1460<sup>mil.</sup>, et depuis la température — 20° jusqu'à la température 40°, intervalles dans lesquels MM. Gay-Lussac et Welter ont étendu jusqu'ici leurs expériences, les résultats de ces expériences comparées à mon analyse

donnent  $\frac{C}{C_1}$  constant et à très peu près égal à 1,3748. En supposant cette quantité rigoureusement constante, on a

$$-\rho \cdot \left(\frac{d\mathbf{V}}{d\rho}\right) = \frac{\mathbf{C}}{\mathbf{C}_{1}} \cdot \mathbf{P} \cdot \left(\frac{d\mathbf{V}}{d\mathbf{P}}\right),$$

d'où l'on tire en intégrant

dans tent Mémoire sur la cl. 
$$(\frac{D}{Q})^{-1}$$
 dans une première expérien

L'étant ici le signe d'une fonction arbitraire. La valeur la plus simple de V, comprise dans cette équation, est

F et H étant des constantes. En y substituant au lieu de e sa valeur donnée par l'équation we etant la température; on aura

innly a enforced up 
$$V = F + Hqv \cdot P^{\frac{C_1}{C_1} - r}$$
.

Dans cette supposition, la chaleur absolue d'une molécule d'air croît sous une pression constante, comme la température v, ce qui est conforme aux phénomènes.

Cette expression de V satisfait à la vitesse du son et aux expériences de MM. Gay-Lussac et Welter. Voyons comment elle représente les expériences sur la chaleur que l'air abandonne en passant d'une température élevée v' à une température inférieure v, sous une pression déterminée P. La chaleur abandonnée par une molécule d'air sera, d'après l'expression précédente de V,

Inclinated times if 
$$Hq.(v'-v).P^{\frac{C_t}{C}-\tau}$$
,

et la chaleur abandonnée par un volume d'air à cette pression, sera proportionnelle à cette quantité multipliée par P; parce qu'il y a d'autant plus de molécules d'air dans ce volume, que P est plus considérable. En prenant donc pour unité, cette chaleur abandonnée; celle qu'abandonnera un égal volume d'air dans les mêmes circonstances, mais sous la pression P', sera

MM. Laroche et Bérard ont consigné deux expériences de ce genre, dans leur Mémoire sur la chaleur spécifique des gaz. Dans ces expériences P' était égal à 1005mil., 8 et P était égal à 740mil., 5. Ils ont trouvé dans une première expérience, 1,2127 pour le rapport des chaleurs

MÉCAR. CÉL. Tome F

abandonnées, et 1,2665, dans une seconde expérience. La fraction précédente, en y substituant 1,3748 pour  $\frac{C}{C_1}$ , donne 1,249; ce qui tient à peu près le milieu entre les résultats des deux expériences.

Les suppositions de V et u constans, donnent

$$o = C_1 \cdot \frac{dP}{P} - C \cdot \frac{d\rho}{\rho}$$
. And slave adding to

Ainsi P étant k. p°c, on aura

$$\frac{dc}{c} = -\frac{d\rho}{\rho} \cdot \left(1 - \frac{C}{2C_1}\right) = -di.$$

Tant que  $\frac{C}{C_i}$  sera plus petit que 2, la compression qui fait nécessairement croître la densité  $\rho$ , diminuera la chaleur libre c de la molécule aérienne, et augmentera sa chaleur latente i.

Si l'on nomme R le rayonnement de la molécule, en aura R proportionnel à P; on aura donc

$$\frac{d\mathbf{R}}{\mathbf{R}} = \left(\frac{\mathbf{C}}{\mathbf{C}_1} - \mathbf{I}\right) \cdot \frac{d\rho}{\rho}.$$

La compression augmentera donc le rayonnement de la molécule, tant que  $\frac{C}{C_i}$  surpassera l'unité : elle le diminuera dans le cas contraire. Dans le premier cas, il y aura augmentation de température par la compression, et production du froid par la dilatation : dans le second cas, il y aura production de froid par la compression, et augmentation de température par la dilatation.

La théorie Newtonienne sur le son, est fondée sur les deux équations suivantes.

Soient X, Y, Z les trois cogglonnées or de la molécule A et 
$$x$$
,  $y$ ,  $z$ , celles de l'élém;  $\frac{db}{Xb_q} = \frac{db}{dt^2}$   $f = \sqrt{(x-X)^2 \cdot dq} = \sqrt{(y-x)^2 \cdot dq}$ 

v étant la température, et P étant la pression. La première de ces équations est inexacte, parce que l'air n'agit point sur une couche aérienne d'une épaisseur infiniment petite, par une simple différence de pression, comme il agirait sur un plan d'une épaisseur sensible. De plus, la seconde équation n'est vraie que dans l'état d'équilibre de l'air. Cependant il est remarquable que ces équations soient exactes, pourvu que P, au lieu d'exprimer la pression, comme dans l'état d'équilibre, exprime la quantité  $k\rho^2c^2$ , qui ne représente la pression, que dans l'état d'équilibre : cela donne

$$\left(\frac{ddx}{dt^2}\right) = -\frac{2P}{\rho} \cdot \frac{d \cdot \rho c}{\rho c \cdot dX} = -\frac{2P}{\rho} \cdot (1 - 6) \cdot \frac{d\rho}{\rho dX};$$

d'où l'on tire en substituant pour  $\frac{d\rho}{\rho}$  sa valeur;

$$\left(\frac{ddx}{dt^2}\right) = \frac{2P}{(\rho)} \cdot (1 - G) \left(\frac{ddx}{dX^2}\right);$$

équation identique avec celle qui résulte de notre analyse.

Equations générales du mouvement des fluides élastiques.

8. On peut déduire de cette analyse, les équations générales du mouvement des fluides élastiques. Si l'on considère une molécule A du fluide, son calorique c sera repoussé par le calorique  $c_1$  des molécules qui forment l'élément dx dy dz du même fluide. En nommant f la distance de cet élément à la molécule A;  $\rho'$  la densité du même élément, et représentant par  $H.\phi(f)$  la loi de répulsion du calorique; l'action répulsive du calorique de l'élément sur le calorique de la molécule A, sera

 $H.\varphi(f).\rho_1c_1c.dx\,dy\,dz.$ 

En la multipliant par la variation of de sa direction, le produit sera

H.
$$\varphi(f)$$
.  $\rho_1 c_1 c_2 c_3 f_1 dx dy dz$ .

Soient X, Y, Z les trois coordonnées orthogonales de la molécule A, et x, y, z, celles de l'élément; on aura

$$f = \sqrt{(x-X)^2 + (y-Y)^2 + (z-Z)^2}$$

ce qui donne

$$\mathcal{J} f = \frac{[(x-X). \mathcal{J}X + (y-Y)\mathcal{J}y + (z-Z)\mathcal{J}Z]}{f}.$$

L'action entière répulsive du calorique du gaz sur le calorique de la molécule A, multipliée par l'élément de sa direction, sera ainsi,

la triple intégrale étant prise depuis les valeurs infinies négatives de x, y, z, jusqu'à leurs valeurs infinies positives. On a ensuite

$$\rho_{1}c_{1} = \rho c + (x - X) \cdot \left(\frac{d \cdot \rho c}{dX}\right) + (y - Y) \cdot \left(\frac{d \cdot \rho c}{dY}\right) + (z - Z) \cdot \left(\frac{d \cdot \rho c}{dZ}\right) + \text{etc.},$$

ρ étant la densité du fluide, correspondante aux coordonnées X, Y et Z. Soit

$$x-X=x'; y-Y=y'; z-Z=z';$$

la fonction précédente deviendra

$$-\operatorname{Hc.} \iiint \left[ \rho c + x' \cdot \left( \frac{d \cdot \rho c}{dX} \right) + y' \cdot \left( \frac{d \cdot \rho c}{dY} \right) + z' \cdot \left( \frac{d \cdot \rho c}{dZ} \right) \right] \cdot \frac{\varphi(f)}{f}.$$

$$(x' \delta X + y' \delta Y + z' \delta Z) \cdot dx' dy' dz'.$$

Par la nature de la fonction  $\varphi(f)$ , on a entre les limites infinies positives et négatives,

$$\iiint x' \cdot \frac{\varphi(f)}{f} \cdot dx' dy' dz' = 0;$$

$$\iiint y' \cdot \frac{\varphi(f)}{f} \cdot dx' dy' dz' = 0;$$

$$\iiint z' \cdot \frac{\varphi(f)}{f} \cdot dx' dy' dz' = 0;$$

$$\iiint x' y' \cdot \frac{\varphi(f)}{f} \cdot dx' dy' dz' = 0;$$
etc.;
$$\iiint x'^{a} \cdot \frac{\varphi(f)}{f} \cdot dx' dy' dz' = \iiint y'^{a} \cdot \frac{\varphi(f)}{f} \cdot dx' dy' dz'$$

$$= \iiint z'^{a} \cdot \frac{\varphi(f)}{f} \cdot dx' dy' dz';$$

ainsi la fonction précédente devient

$$-\operatorname{Hc.}\!\!\iint\!\!\cdot\!\! \left[\left(\frac{d\cdot\rho c}{dX}\right)\cdot\delta X + \left(\frac{d\cdot\rho c}{dY}\right)\cdot\delta Y + \left(\frac{d\cdot\rho c}{dZ}\right)\cdot\delta Z\right]\cdot x'^{2}\cdot\frac{\varphi(f)}{f}\cdot dx'dy'dz',$$

Concevons un plan perpendiculaire à l'axe des X, à la distance X + x'; menons du point d'intersection de ce plan avec l'axe des X, une droite à la molécule dont les coordonnées sont X + x', Y + y', Z + z'. Soit s cette droite, et  $\varpi$  l'angle qu'elle forme avec le plan des X et des Y. On pourra substituer à l'élément dx'. dy'. dz', l'élément dx'.  $sdsd\varpi$ . L'intégrale relative  $\varpi$ , doit être prise depuis  $\varpi$  nul, jusqu'à  $\varpi$  égal à la circonférence  $2\pi$ . L'intégrale relative à s, doit être prise depuis s nul jusqu'à s infini; et l'intégrale relative à s, doit être prise depuis s nul jusqu'à s infini jusqu'à s égal à plus infini. De là on tirera par ce qui précède,

$$\iiint x'^* dx' \cdot dy' \cdot dz' \cdot \frac{\varphi(f)}{f} = 4\pi K.$$

Ainsi en faisant

$$P=2\pi HK. \rho^2 c^2;$$

la fonction précédente ou la somme des produits des forces répulsives du calorique des molécules du gaz sur le calorique de la molécule A par les élémens de leurs directions, sera

$$-\frac{\partial P}{\rho}$$
.

Soient R, S, T, les autres forces qui sollicitent cette molécule, parallèlement aux axes des X, des Y et des Z; la somme des produits de ces forces, par les élémens de leurs directions, sera

$$R.\delta X + S.\delta Y + T.\delta Z.$$

Enfin, les produits des mouvemens détruits, par les élémens de leurs directions, seront

$$-\left(\frac{ddX}{dt^2}\right) \cdot \delta X - \left(\frac{ddY}{dt^2}\right) \cdot \delta Y - \left(\frac{ddZ}{dt^2}\right) \cdot \delta Z;$$

on aura donc par le principe des vitesses virtuelles,

$$o = - \delta P + \rho R \cdot \delta X + \rho S \cdot \delta Y + \rho T \cdot \delta Z \qquad (L)$$

$$-\rho \cdot \left(\frac{ddX}{dt^2}\right) \cdot \delta X - \rho \cdot \left(\frac{ddY}{dt^2}\right) \cdot \delta Y - \rho \cdot \left(\frac{ddZ}{dt^2}\right) \cdot \delta Z.$$

Il faut joindre à cette équation, celle du rayonnement de la molécule, et qui est, en représentant 27HK par k,

$$k \cdot \rho c^* = q \cdot v.$$

Il faut y joindre encore l'équation (K) du n° 33 du premier Livre, équation qui est relative à la continuité du fluide. On aura ainsi les équations générales du mouvement des fluides élastiques.

### Du mélange de plusieurs gaz.

9. Si plusieurs gaz soumis à la pression P et à la température u, sont mêlés ensemble dans un espace tel qu'ils conservent la même pression et la même température; alors en nommant v, v', etc., les volumes respectifs de ces gaz avant le mélange, et U le volume total après le mélange; on aura, comme il est facile de le démontrer par ce qui précède,

$$U = v + v' + \text{etc.}$$

Les divers gaz finiront par se mêler entre eux, de manière que la plus petite partie du mélange renferme dans la même proportion les molécules des divers gaz. Dans cet état, la chaleur libre c d'une molécule A sera la même qu'avant le mélange. En effet, les équations (A) du n° 5 donnent avant comme après le mélange,

$$c.\sqrt{Pk} = qu.$$

La chaleur absolue c+i de la molécule A reste encore la même. Car la molécule A étant soumise dans le mélange, à la même pression et à la même température qu'avant le mélange, et sa chaleur libre c étant la même; sa chaleur absolue c+i, qui ne peut dépendre que de ces trois choses, doit rester la même.

La chaleur spécifique du mélange sous une pression constante, ou sous un volume constant, est visiblement,  $\rho$ ,  $\rho'$ , etc., étant ici les nombres de grammes de chaque gaz,

$$\frac{\rho \cdot \frac{d \cdot (c+i)}{du} + \rho' \cdot \frac{d \cdot (c'+i')}{du} + \text{etc.}}{\rho + \rho' + \text{etc.}}$$

On peut donc facilement la conclure des expériences sur la chaleur spécifique de chacun des gaz.

Considérons présentement les mouvemens des molécules du mélange. Il est facile de conclure de l'analyse précédente, que si l'on fait

$$P = 2\pi \cdot HK \cdot (\rho c + \rho' c' + \text{etc.})^2,$$

la somme des produits des actions répulsives du calorique des molécules du mélange, sur le calorique c d'une molécule A du premier gaz, par les élémens de leurs directions, sera

$$-c.\frac{\sqrt{2\pi.HK}}{\sqrt{P}}.\delta P;$$

l'équation du mouvement de la molécule A sera donc

$$\circ = -c \cdot \frac{\sqrt{2\pi \cdot HK}}{\sqrt{P}} \cdot \mathcal{S}P + R\mathcal{S}X + S \cdot \mathcal{S}Y + T \cdot \mathcal{S}Z$$

$$- \left(\frac{ddX}{dt^2}\right) \cdot \mathcal{S}X - \left(\frac{ddY}{dt^2}\right) \cdot \mathcal{S}Y - \left(\frac{ddZ}{dt^2}\right) \cdot \mathcal{S}Z$$

Pour une molécule A' du second gaz, infiniment voisine de A, l'équation du mouvement sera

$$o = -c' \cdot \frac{\sqrt{2\pi \cdot HK}}{\sqrt{P}} \cdot \mathcal{S}P + R' \cdot \mathcal{S}'X' + S' \cdot \mathcal{S}Y' + T' \cdot \mathcal{S}Z'$$
$$-\left(\frac{ddX'}{dt^{a}}\right) \cdot \mathcal{S}X' - \left(\frac{ddY'}{dt^{a}}\right) \cdot \mathcal{S}Y' - \left(\frac{ddZ}{dt^{a}}\right) \cdot \mathcal{S}Z',$$

et ainsi de suite. Toutes ces équations sont différentes, si c, c', etc., sont différens. Relativement aux gaz azote et oxigène, élémens de notre atmosphère, c et c' sont peu différens. Les molécules des divers gaz se sépareraient dans l'état de mouvement, si elles n'étaient pas retenues par des forces incomparablement plus puissantes que les forces qui accélèrent leurs mouvemens. Dans les corps solides, ces forces sont les attractions mutuelles de leurs molécules, qui font qu'elles s'entraînent réciproquement. Dans les gaz, ces forces sont celles qui dépendent des premières puissances de x', y', z', dans l'analyse précédente, et qui se détruisent mutuellement dans l'état d'équilibre et d'un mélange complet des divers gaz. Ces forces, par la nature de la fonction  $\varphi(f)$ ,

sont incomparablement plus grandes que les forces accélératrices du mouvement, et qui dépendent des carrés de x', y', z'. Elles renaîtraient pour peu que les molécules des divers gaz se séparassent; et par là, elles s'opposent à leur séparation, comme elles établissent l'équilibre stable du mélange, en répandant les molécules des divers gaz suivant la même proportion dans toutes les parties de ce mélange. On peut donc, dans l'état de mouvement, considérer comme molécule du mélange, un groupe infiniment petit des molécules des divers gaz, dans lequel ces molécules sont en même proportion que dans le mélange total; et l'on peut supposer les molécules de chaque groupe, liées fixement entre elles. C'est aux forces dont je viens de parler, qu'est due l'équation de continuité dans le mouvement des fluides.

Déterminons d'après ce qui précède, la vitesse du son dans un mélange de plusieurs gaz; et pour simplifier les calculs, ne considérons que deux gaz. Soient  $\rho$  et  $\rho'$ , les nombres de grammes de chaque gaz contenu dans un litre du mélange, sous la pression P et à la température u. Soient, à la même pression et à la même température,  $(\rho)$  et  $(\rho')$ , les nombres de grammes de chaque gaz renfermé séparément dans un litre pris pour unité d'espace. Désignons encore par C et C, les deux chaleurs spécifiques du premier gaz, et par C', C', les mêmes quantités pour le second gaz. Ces deux chaleurs relatives au mélange seront

$$\frac{\rho C + \rho' C'}{\rho + \rho'}; \quad \frac{\rho C_1 + \rho' C'_1}{\rho + \rho'}.$$

Ainsi l'expression de la vitesse du son dans une atmosphère formée de ce mélange, sera

$$\sqrt{\frac{P}{\rho + \rho'} \cdot \frac{\rho C + \rho' C'}{\rho C_1 + \rho' C'_1}}$$

L'excès du carré de cette vitesse, sur le carré de la vitesse du son dans le premier gaz, sera donc

$$\frac{P}{\rho + \rho'} \cdot \frac{\rho C + \rho' C'}{\rho C_1 + \rho' C'_1} - \frac{P}{(\rho)} \cdot \frac{C}{C_1};$$

on a ensuite, comme il est facile de le voir,

$$\frac{\rho}{(\rho)} + \frac{\rho'}{(\rho')} = 1.$$

MÉCAN. CÉL. Tome V.

On conclut de là ce singulier paradoxe, savoir, que dans le mélange de deux gaz, la vitesse du son peut n'être pas intermédiaire entre les deux vitesses du son dans chaque gaz: elle peut surpasser la plus grande, ou être inférieure à la plus petite. En supposant égales, les vitesses du son dans chacun de ces gaz, ce qui donne

$$\frac{C}{(\rho)C_1} = \frac{C'}{(\rho')C'_1};$$

on trouve l'excès du carré de la vitesse du son dans le mélange, sur le carré de la vitesse du son dans chaque gaz, égal à

$$\frac{P.\rho.\rho'. \left[ (\rho') - (\rho) \right]. (C' - C)}{(\rho).(\rho').(\rho + \rho').(\rho C_1 + \rho' C'_1)};$$

ainsi dans ce cas, la vitesse du son dans le mélange surpassera cette vitesse dans chaque gaz, ou lui sera inférieure, suivant que  $[(\rho')-(\rho)].(C'-C)$  sera positif ou négatif.

### Des atmosphères.

10. Les fluides élastiques ne peuvent exister qu'autant qu'ils sont contenus par une cause extérieure qui les empêche de se dissiper, telle que les parois d'un espace limité; ou par une force intérieure, telle que l'attraction d'un grand corps qu'ils environnent : c'est le cas des atmosphères de la Terre et des corps célestes. Je vais considérer ici spécialement l'atmosphère terrestre.

Imaginons un tuyau conique très étroit dont le sommet soit au centre de la Terre, et qui s'élève jusqu'aux limites de l'atmosphère. Représentons par R le rayon terrestre, et par s la hauteur au-dessus de la surface de la Terre, d'une molécule aérienne située sur l'axe du cône; sa pesanteur sera  $\frac{g}{(R+s)^2}$ ,  $\frac{g}{R^2}$  étant la pesanteur à la surface de la Terre. Soit c la chaleur de la molécule, u la température de l'espace ou de la partie du tuyau qui correspond à cette molécule; on aura

$$k\rho c^2 = qu;$$

ensuite, on aura par ce qui précède, dans l'état d'équilibre,

$$o = -\frac{\delta P}{\rho} - \frac{g}{(R+s)^2} \cdot \delta s.$$

On peut ici changer d'en d, parce que l'on ne doit considérer que la seule coordonnée s; et alors on a

$$dP = -\frac{g\rho ds}{(R+s)^2};$$

P est égal à  $k\rho^2c^2$ ; et dans l'état d'équilibre, il exprime la pression. On a donc

ce qui donne

$$dP = -\frac{gPds}{gu \cdot (R+s)^2};$$

d'où l'on tire en intégrant

$$P = (P) \cdot e^{-\int \frac{gds}{qu \cdot (R+s)^2}},$$

$$\rho = \frac{(\rho) \cdot (u)}{u} \cdot e^{-\int \frac{gds}{qu \cdot (R+s)^2}},$$

(P),  $(\rho)$ , (u) étant ce que deviennent P,  $\rho$ , et u, à la surface de la Terre; et c étant ici le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité. Ces deux équations servent de fondement aux théories du baromètre et des réfractions.

Pour déterminer la vitesse du son, dans le sens vertical; j'observe que si l'on suppose l'air renfermé dans un tube vertical cylindrique, ce qui ne change point l'expression de la vitesse, comme il est facile de s'en assurer, et si l'on fait s = S + s', S étant la hauteur initiale de la molécule; on aura par ce qui précède,

$$\left(\frac{dds'}{dt^2}\right) = -\frac{2P}{\rho} \cdot (1-6) \cdot \frac{d\rho}{\rho ds} - \frac{g}{(R+S+s')^2}$$

Si l'on développe cette équation, les termes indépendans de s' se détruisent par les conditions de l'équilibre; et l'on trouvera pour l'expression fort approchée de la vitesse du son,

$$\sqrt{\frac{(P)u}{(\rho)(u)} \cdot \frac{C}{C_1}}$$
,

C étant la chaleur spécifique de l'air, sous une pression quelconque P, et correspondante à la température u: C, est sa chaleur spécifique sous un volume constant, à la pression P et à la température u. Cette ex-

pression est une fonction de S; en la désignant par M, on aura, à très peu près, pour le temps t que le son emploie à s'élever à la hauteur S,

$$t = \int \frac{dS}{M}.$$

Dans le système des ondes lumineuses, il faut considérer chaque molécule de lumière, comme un point répulsif dont la répulsion ne s'exerce sensiblement qu'à des distances insensibles. Ici, la considération de la température devient inutile, et c doit être supposé constant : on peut le prendre pour la molécule même; au lieu que dans les gaz, la chaleur qu'il représente est distincte de la molécule, et varie avec la température; ce qui distingue essentiellement le fluide lumineux, des gaz qui nous sont connus. On a, dans le cas de l'équilibre,

$$dP = -\frac{g\rho ds}{(R+s)^2};$$

$$d = k\rho^2 c^2;$$

$$d$$

et en intégrant

$$\rho = \frac{g}{2kc^2. (R+s)} + (\rho),$$

 $(\rho)$  étant la valeur de  $\rho$ , lorsque s est infini.

Si l'on conçoit maintenant que le corps dont le fluide est l'atmosphère, le fasse vibrer, pour produire la lumière; on trouvera par l'analyse exposée ci-dessus, que la vitesse de la lumière est à fort peu près dans le sens vertical,  $\sqrt{2k\rho c^2}$ , ou

$$\sqrt{\frac{2k(\rho)c^2+\frac{g}{R+s}}}$$

En supposant donc qu'ainsi que dans les atmosphères de la Terre et des astres,  $(\rho)$  soit nul; la vitesse de la lumière sera  $\sqrt{\frac{g}{R+s}}$ : elle sera nulle à une distance infinie; et à la surface elle sera  $\sqrt{\frac{g}{R}}$ .

A la surface du Soleil, cette vitesse n'est pas la sept-centième partie de celle de la lumière, telle qu'on l'a observée; car en nommant e l'espace dont la pesanteur fait tomber les corps à cette surface dans la première seconde prise pour unité, on a

$$2\epsilon = \frac{g}{R^2},$$

ce qui donne

$$\sqrt{\frac{g}{R}} = \sqrt{2\epsilon R}.$$

Cette dernière quantité est d'environ 437810 mètres, et elle n'est pas la sept-centième partie de l'espace décrit par la lumière dans une seconde. Il faut donc supposer (p) dans l'espace, incomparablement plus grand que l'accroissement de densité du fluide, dû à la pesanteur solaire : nous ne connaissons dans l'espace céleste, aucune force comprimante qui puisse donner à (p) cette valeur.

### De la vapeur aqueuse.

11. Si l'on introduit un volume d'eau dans un vase vide hermétiquement fermé et placé dans un espace d'une température donnée; il s'élèvera de la surface du liquide, des vapeurs qui continueront de s'élever jusqu'à ce que leur pression arrête cet effet. La pression et la densité de la vapeur parvenue à cet état d'équilibre, sont d'autant plus grandes, que la chaleur de l'espace est plus considérable. On a formé par l'expérience, des tables du rapport entre la pression et la température; mais la loi rigoureuse de ce rapport n'est connue, ni à priori, ni par les observations. Appliquons à cette vapeur naissante, la formule suivante que nous avons donnée dans le n° 7 pour les gaz

$$V = F + Hq.v.P^{\frac{C_t}{C}-1}$$

Il est facile d'en conclure que si l'on désigne par V' le nombre de grammes d'eau bouillante sous la pression barométrique o<sup>m</sup>, 76, dont la chaleur employée à former un gramme de sa vapeur, peut élever d'un degré la température; si l'on nomme ensuite & et &, les nombres de grammes de ce liquide, dont la température peut être élevée d'un degré, par les chaleurs employées pour élever d'un degré, la température d'un gramme de

vapeurs, lorsque la pression P reste constante, et lorsque le volume est constant; enfin, si l'on nomme (6) et (v), ce que deviennent 6 et v, lorsque P est égal à la pression barométrique o<sup>m</sup>, 76; on aura

$$V' = F' + \frac{(\mathcal{C})}{1^9} \cdot \left[ \upsilon \cdot P^{\frac{\mathcal{C}_1}{\mathcal{C}} - \tau} - (\upsilon) \right].$$

F' étant une constante et P exprimant ici le nombre de fois que la pression P contient la pression barométrique o<sup>m</sup>, 76. Il est facile de voir que F'— 1 est le nombre de grammes d'eau à la température de 100°, dont un gramme de vapeurs de cette température, et sous la pression o<sup>m</sup>, 76, réduites en liquide, élèverait d'un degré, la température. Ce nombre, d'après un grand nombre d'expériences, est à peu près égal à 550; ainsi un gramme de vapeurs en se réduisant en eau à la température de 100°, élèverait d'un degré, la température d'un nombre de grammes d'eau égal à

$$551^{\circ} + \frac{(6)}{1^{\circ}} \cdot \left[ v \cdot P^{\frac{6}{6}} - 1 - (v) \right].$$

On aura par ce qui précède, les valeurs de v et de (v), en ajoutant aux températures indiquées par un thermomètre d'air, 266°  $\frac{1}{3}$ ; ce qui donne

$$(v) = 366^{\circ} \frac{3}{3}$$
.

Suivant quelques physiciens, le terme

$$(c)$$
  $[u, P^{\frac{c_1}{c}-1} - (u)]$ 

se réduit à  $\frac{v-(v)}{1^0}$ . Ce qui suppose (6) = 1, c'est-à-dire que la chaleur spécifique de la vapeur aqueuse est égale à celle de l'eau bouillante. Cela suppose encore que  $\frac{C_1}{6}$  est égal à l'unité. Mais ces deux suppositions pourraient n'être qu'approchées, et représenter les expériences de ces physiciens, dans les limites des erreurs dont ces expériences délicates sont susceptibles. D'autres physiciens ont cru trouver ce terme nul, par leurs expériences. Ce terme ne peut devenir nul, qu'en supposant (6) nul; ce qui est impossible, et ce qui paraît d'ailleurs contraire aux expériences que l'on a faites pour déterminer (6).

### Considérations sur la Théorie précédente des gaz.

12. Je terminerai ces recherches par les considérations suivantes.

La théorie précédente du son est fondée sur la seule hypothèse que l'état élastique d'un gaz est dû à la force répulsive du calorique libre c, de chaque molécule du gaz; hypothèse bien naturelle, et qui me paraît clairement indiquée par l'accroissement du ressort des gaz, lorsque leur chaleur augmente. Alors on a, comme je l'ai fait voir ci-dessus,

$$P = k \rho^2 c^2$$
;

et l'on en conclut par ce qui précède,

$$\left(\frac{ddx}{dt^2}\right) = -\frac{dP}{\rho dX}$$

Ensuite, le peu de durée d'une vibration aérienne permet de supposer insensible, la perte qu'éprouve la chaleur absolue c+i de la molécule vibrante pendant la courte durée de sa vibration, durée qui n'excède pas une tierce. Considérant donc cette chaleur comme une fonction V de la pression P et de la densité  $\rho$  du gaz, ce que l'on peut faire, puisque cette pression et cette densité étant déterminées, la chaleur absolue c+i, et la chaleur libre c, sont déterminées; on peut supposer V constant pendant la durée de la vibration; ce qui donne

$$o = \frac{dP}{P} \cdot P\left(\frac{dV}{dP}\right) + \frac{d\rho}{\rho} \cdot \rho\left(\frac{dV}{d\rho}\right);$$

d'où l'on tire l'expression précédente  $\sqrt{4h\varepsilon.(1-6)}$  de la vitesse du son, et le théorème que j'ai publié dans les Annales de Physique et de Chimie de 1816, suivant lequel il faut, pour avoir cette vitesse, multiplier la formule Newtonienne  $\sqrt{2h\varepsilon}$  par la racine carrée du rapport  $\frac{C}{C_1}$ , C étant la chaleur spécifique du gaz, lorsque la pression est constante, et  $C_1$  étant sa chaleur spécifique, lorsque son volume ou sa densité sont constans.

Ayant supposé précédemment

$$\frac{d \cdot \rho c}{\rho c} = (1 - 6) \cdot \frac{d\rho}{\rho},$$

il en résulte

$$\frac{dc}{c} = -6 \cdot \frac{d\rho}{\rho}$$

La supposition de la chaleur absolue c + i constante donne dc = -di; on a donc  $di = 6c \cdot \frac{d\rho}{\rho};$ 

ainsi la chaleur latente ou combinée i de l'air s'accroît par la pression, du moins à la surface de la mer. A cette surface, les observations sur le son donnent à peu près 6 = 0,3. Ainsi l'existence d'une chaleur latente i, et son accroissement par la pression, sont des résultats de l'observation. L'existence d'une chaleur latente i est encore indiquée par les expériences de MM. Laroche et Bérard sur la chaleur spécifique de l'air. En effet, on a

L'équation

on a donc

$$c = \frac{q_v}{\sqrt{PR}}.$$

Si la chaleur libre c était la chaleur absolue c+i, ou si la chaleur latente i était nulle, on aurait  $\frac{C_1}{C}$  égal à  $\frac{1}{2}$ . On aurait donc, dans l'analyse que nous avons donnée sur les expériences de MM. Laroche et Bérard,

$$\left(\frac{P'}{\overline{P}}\right)^{\frac{C_1}{\overline{C}}} = 1,173;$$

et ces expériences donnent, par un milieu, le premier membre de cette équation égal à 1,24.

La théorie que j'ai proposée sur la chaleur suppose le rayonnement du calorique : la facilité d'expliquer par ce rayonnement les divers phénomènes de la chaleur, l'a fait admettre par le plus grand nombre des physiciens. Mais ma théorie ajoute à la supposition de ce rayonnement, celle de sa production par la force répulsive du calorique libre des molécules environnantes. C'est ce que je vais déduire des phénomènes à l'égard des gaz.

gaz. Car ce melange étant supposé soumis annob atoineM ab iol la la

u étant la température que je représente ici par la densité du fluide discret produit par les rayonnemens des divers corps renfermés dans un espace. Pour un autre gaz, on a la la partie de la la company de la la company de la la company de la company de

 $\rho'$  étant la densité de ce nouveau gaz. Suivant la loi de M. Gay-Lussac, la pression  $\overline{P}$  restant la même, le rapport de  $\rho'$  à  $\rho$  reste le même, quelle que soit la température u; le rapport de  $\varphi(u)$  à  $\sqrt{u}$  est donc constant, quel que soit u; ce qui donne

$$\varphi(u) = q. \Pi. (u),$$

$$\psi(u) = q'. \Pi. (u),$$

$$\psi(u) = q'. \Pi. (u),$$

q et q' étant des constantes, et  $\Pi(u)$  étant une fonction quelconque de u, commune à tous les gaz : alors on a

pour la force même que 
$$s^2 = q^2 = q^2$$
  $= q^2 = q^2$   $= q^2 = q^2$  Cette force produit par son action, i clet gazeux du fluide, sa pres-

Désignons par R le rayonnement d'une molécule d'un gaz; ce rayonnement est égal à l'absorption du calorique discret de l'espace, par la molécule, en vertu de l'équilibre de température; et cette absorption doit être supposée proportionnelle à u; on a donc

dans la molécule A; alors 
$$\pi(e_i)$$
 devient une constante. C'est, d'ailleurs,

la manière la plus simple de concevoir que la fonction II (u) soit comfiétant une constante dépendante de la nature du gaz; donc o la manier de la nature du gaz de la manier de la manier

hypothèses sur lesquelles ma théorie de la chaleur est fondée, sont toutes indiquées par 
$$\frac{1}{q}$$
  $\frac{1}{q}$   $\frac{1}{$ 

Ainsi, en considérant le rayonnement comme produit par une force Mécan. cél. Tome V.

agissante sur le calorique c de la molécule proportionnellement à ce calorique, l'intensité de cette force sera proportionnelle à pc; or pc est par le n° 6 proportionnel à la force répulsive du calorique du gaz; la force productrice du rayonnement est donc proportionnelle à cette force répulsive. La même chose a lieu relativement au mélange de plusieurs gaz. Car ce mélange étant supposé soumis à la même pression et à la même température que le gaz dont je viens de parler, et que je suppose entrer dans ce mélange; le rayonnement d'une molécule A de ce gaz, sera le même dans ces deux cas. Lorsque le gaz est entré dans le mélange, les forces extérieures qui agissent sur la molécule, savoir, la température et la force répulsive du calorique environnant, qui est proportionnelle à  $\rho c + \rho' c' + \text{etc. ou à } \sqrt{\frac{P}{k}}$ , étant supposées les mêmes; l'état intérieur de la molécule A doit être encore le même : ainsi la chaleur libre c de la molécule, sa chaleur absolue c + i, et son rayonnement R doivent être les mêmes dans le cas où le gaz existait seul, et dans le cas où il entre dans le mélange. On a donc encore dans ce dernier cas, comme dans le premier,

$$R = \sqrt{Pk} \cdot \frac{cfu}{q \cdot \Pi(u)} + (\rho c + \rho' c' + \text{etc.}) \cdot k \cdot \frac{cfu}{q \cdot \Pi(u)}.$$

Le rayonnement est ainsi proportionnel à la force répulsive du calorique du mélange. Il est donc naturel de prendre cette force repulsive, pour la force même qui fait rayonner le calorique de la molécule. Cette force produit par son action, l'état gazeux du fluide, sa pression P, et le rayonnement R de ses molécules en détachant les parcelles du calorique qu'elles tendent à retenir par leur attraction. Si, comme il est naturel de l'admettre, ce dernier effet ne dépend comme le second, que du produit de cette force, par le calorique c contenu dans la molécule A; alors  $\frac{u}{\Pi(u)}$  devient une constante. C'est, d'ailleurs, la manière la plus simple de concevoir que la fonction  $\Pi(u)$  soit commune à tous les gaz, et nous l'avons adoptée. On voit ainsi que les hypothèses sur lesquelles ma théorie de la chaleur est fondée, sont toutes indiquées par les phénomènes.

Ainsi, en considérant le ravonnement comme produit par une force

# TRAITÉ

DE

## MÉCANIQUE CÉLESTE.

LIVRE XIII.

FÉVRIER 1824.

## LIVRE XIII.

DES OSCILLATIONS DES FLUIDES QUI RECOUVRENT LES PLANETE

## CHAPITRE IT

Youce historique des recherches des geometres sur cer objet

wis to mer sendarrattachant a son grand principe de de pesquieur universelle. Kepler avait bien reconnu la tendance des cour de la luce vers les centres du Soleil et de la Lune; mais ignorant la loi de cette tendance. tonner sur cet objet, qu'un apercu vreisemblable. Calilée, dans ses Dialogues sur le Système du monde, exprime son étonnement et ses regrets de ce qu'un aper qui lui semblait ramener dans la philosophie naturelle, les qualités bocultes des anciens, eut été présenté par un homme aussi penetrant que Kepler. Il expliqua le flux et le reflux oar les changemens diurnes que la rotation de la Terre, combinée avec a révolution autour du Soleil, produit dans le mouvement absolu de chaque molécule de la mer. Son explication lui parut tellement incontestable, qu'il la donna comme l'une des preutes principales du système de Coperaic, dont la défense lui suscita tant de persécutions. Les décousertes ulténeures ont confirmé l'aperçu de Kepler, et détruit l'explication de Galilée, entierement contraire aux Jois de l'équilibre et du monvement des luides. Je n'en parle ici que pour montrer jusqu'à quel point les meilleurs esprits s'abusent que quefois sur leurs propres

La théorie de Newton parut en 1687, dans son ouvrage des Principes

## LIVRE XIII.

DES OSCILLATIONS DES FLUIDES QUI RECOUVRENT LES PLANÈTES.

## CHAPITRE I'T.

Notice historique des recherches des géomètres sur cet objet et spécialement sur le Flux et le Reflux de la mer.

1. Newton a donné le premier, la vraie théorie du flux et du reflux de la mer, en la rattachant à son grand principe de la pesanteur universelle. Képler avait bien reconnu la tendance des eaux de la mer vers les centres du Soleil et de la Lune; mais ignorant la loi de cette tendance, et les méthodes nécessaires pour la soumettre au calcul, il n'a pu donner sur cet objet, qu'un aperçu vraisemblable. Galilée, dans ses Dialogues sur le Système du monde, exprime son étonnement et ses regrets de ce qu'un aperçu qui lui semblait ramener dans la philosophie naturelle, les qualités occultes des anciens, eût été présenté par un homme aussi pénétrant que Képler. Il expliqua le flux et le reflux, par les changemens diurnes que la rotation de la Terre, combinée avec sa révolution autour du Soleil, produit dans le mouvement absolu de chaque molécule de la mer. Son explication lui parut tellement incontestable, qu'il la donna comme l'une des preuves principales du système de Copernic, dont la défense lui suscita tant de persécutions. Les découvertes ultérieures ont confirmé l'aperçu de Képler, et détruit l'explication de Galilée, entièrement contraire aux lois de l'équilibre et du mouvement des fluides. Je n'en parle ici que pour montrer jusqu'à quel point les meilleurs esprits s'abusent quelquefois sur leurs propres conceptions.

La théorie de Newton parut en 1687, dans son ouvrage des Principes Mécan. cél. Tome V.

mathématiques de la Philosophie naturelle. Ce grand géomètre, dans le corollaire 10 de la proposition 66 du premier livre, conçoit un canal circulaire environnant la Terre, et rempli d'un fluide qui, tournant avec elle, est attiré par un astre. Il observe que le mouvement de chaque molécule fluide doit être accéléré dans ses conjonctions et dans ses oppositions avec cet astre, et qu'il doit être retardé dans ses quadratures; en sorte que le fluide doit avoir un mouvement de flux et de reflux analogue à celui de la mer. Mais il ne donne ni la loi, ni la mesure de ce mouvement. L'explication véritable de ce phénomène est renfermée dans les propositions 26 et 27 du troisième livre, où Newton détermine les forces du Soleil et de la Lune pour mouvoir les eaux de la mer. Il y considére la mer, comme un fluide de même densité que la Terre qu'il recouvre totalement, et qui prend à chaque instant, la figure où il serait en équilibre sous l'action du Soleil. En supposant ensuite que cette figure est celle d'un ellipsoïde de révolution, dont le grand axe est dirigé vers le Soleil; il détermine le rapport des deux axes par le même procédé qui lui avait donné le rapport des axes de la Terre aplatie par la force centrifuge de son mouvement de rotation. Le grand axe de l'ellipsoïde aqueux étant dirigé constamment vers le Soleil, la plus grande hauteur de la mer dans chaque port, quand le Soleil est à l'équateur, doit arriver à midi et à minuit : le plus grand abaissement doit avoir lieu au lever et au coucher de cet astre. L'action de la Lune produit un ellipsoïde semblable, mais plus alongé, parce que l'action de cet astre est plus puissante. Le peu d'excentricité de ces ellipsoïdes permet de les concevoir superposés l'un à l'autre, en sorte que le rayon de la surface de la mer soit la somme des rayons correspondans de leurs surfaces, moins le rayon correspondant de la surface d'équilibre que la mer prendrait sans l'action des deux astres.

De là naissent les principales variétés du flux et du reflux de la mer. Dans les syzygies, les deux grands axes coïncident, et la plus grande hauteur de la mer arrive aux instans de midi et de minuit. Le plus grand abaissement a lieu au lever et au coucher des astres. Dans les quadratures, le grand axe de l'ellipsoïde lunaire et le petit axe de l'ellipsoïde solaire coïncident. La pleine mer a donc lieu au lever et au coucher des astres, et elle est le minimum des pleines mers : la basse mer arrive aux instans de midi et de minuit; elle est le maximum des basses mers. En exprimant donc l'action de chaque astre, par la différence des deux

demi-axes de son ellipsoïde, qui lui est évidemment proportionnelle, on voit que si le port est situé à l'équateur, l'excès de la plus haute mer syzygie sur la plus basse mer syzygie, exprimera la somme des actions lunaire et solaire; et l'excès de la plus haute mer quadrature sur la plus basse mer quadrature, exprimera la différence de ces actions. Si le port n'est pas à l'équateur, il faut multiplier ces excès par le carré du cosinus de sa latitude. On peut donc, par l'observation des hauteurs des marées syzygies et quadratures, déterminer le rapport de l'action de la Lune à celle du Soleil. Newton conclut de quelques observations faites à Bristol, que ce rapport est celui de six et un tiers à l'unité. Les distances des astres au centre de la Terre influent sur tous ces effets; l'action de chaque astre étant réciproque au cube de sa distance.

Quant à l'intervalle des pleines mers d'un jour à l'autre, Newton observe qu'il est le plus petit dans les syzygies; qu'il croît en allant d'une syzygie à la quadrature suivante; que dans le premier octant, il est égal à un jour lunaire, et qu'il est à son maximum dans la quadrature : qu'ensuite il diminue; qu'à l'octant suivant, il redevient égal au jour lunaire; et qu'enfin, dans la syzygie, il reprend son minimum. Sa valeur moyenne est le jour lunaire, en sorte qu'il y a autant de pleines mers, que de passages de la Lune au méridien supérieur et inférieur.

Tels seraient, suivant la théorie de Newton, les phénomènes des marées, si le Soleil et la Lune se mouvaient dans le plan de l'équateur. Mais l'observation a fait connaître que les plus hautes mers n'arrivent point au moment même de la syzygie, mais un jour et demi après. Newton attribue ce retard, au mouvement d'oscillation de la mer qui se conserverait encore quelque temps, si l'action des astres venait à cesser. La théorie exacte des ondulations de la mer produites par cette action, fait voir que, sans les circonstances accessoires, les plus hautes pleines mers coïncideraient avec la syzygie, et que les pleines mers les plus basses coïncideraient avec la quadrature. Ainsi leur retard sur les instans de ces phases, ne peut être attribué à la cause que Newton lui assigne : il dépend, ainsi que l'heure de la pleine mer dans chaque port, des circonstances accessoires. Cet exemple nous montre combien on doit se défier des aperçus même les plus vraisemblables, quand ils ne sont point vérifiés par une rigoureuse analyse.

Cependant la considération de deux ellipsoïdes superposés l'un à l'autre, peut encore représenter les marées, pourvu que l'on dirige le

grand axe de l'ellipsoïde solaire vers un soleil fictif, toujours également éloigné du vrai Soleil. Le grand axe de l'ellipsoïde lunaire doit être pareillement dirigé vers une lune fictive, toujours également éloignée de la véritable, mais à une distance telle, que la conjonction des deux astres fictifs n'arrive qu'un jour et demi après la syzygie.

Cette considération de deux ellipsoïdes, étendue au cas où les astres se meuvent dans des orbes inclinés à l'équateur, ne peut se concilier avec les observations. Si le port est situé à l'équateur, elle donne, vers le maximum des marées, les deux pleines mers du matin et du soir, à très peu près égales, quelle que soit la déclinaison des astres; seulement l'action de chaque astre est diminuée dans le rapport du carré du cosinus de sa déclinaison à l'unité. Mais si le port a une latitude, ces pleines mers pourraient être fort différentes; et quand la déclinaison des astres est égale à l'obliquité de l'écliptique, la marée du soir à Brest serait environ huit fois plus grande que celle du matin. Cependant les observations très multipliées dans ce port font voir qu'alors ces deux marées y sont presque égales, et que leur plus grande différence n'est pas un trentième de leur somme. Newton attribue la petitesse de cette différence, à la même cause par laquelle il avait expliqué le retard de la plus haute mer, sur l'instant de la syzygie, savoir au mouvement d'oscillation de la mer, qui, suivant lui, reporte une grande partie de la marée du soir, sur la haute mer suivante du matin, et rend ces deux marées presque égales. Mais la théorie des ondulations de la mer fait voir encore que cette explication n'est pas exacte, et que, sans les circonstances accessoires, les deux marées consécutives ne seraient égales, que dans le cas où la mer aurait partout la même profondeur.

Newton, dans les éditions suivantes de son Quvrage, n'a presque rien ajouté à sa théorie du flux et du reflux de la mer, exposée dans la première; seulement il a eu égard, dans le calcul de l'action de la Lune, au changement de la distance lunaire, produit par l'inégalité de la variation. La plus haute mer suivant d'un jour et demi l'instant de la syzygie, il a cru que dans le calcul du maximum de la marée, l'action du Soleil devait être multipliée par le cosinus du double du mouvement synodique de la Lune, pendant cet intervalle. Mais cette correction est fautive, parce que la marée dans un port, n'est pas le résultat de l'action immédiate des astres, mais celui de leur action antérieure d'un jour et demi. On peut assimiler ces marées à celles qui, étant dues à

l'action immédiate des astres, emploieraient un jour et demi à parvenir dans le port.

En 1738, l'Académie des Sciences proposa la cause du flux et du reflux de la mer, pour le sujet du prix de Mathématiques, qu'elle décerna en 1740. Quatre pièces furent couronnées : les trois premières, fondées sur le principe de la pesanteur universelle, étaient de Daniel Bernoulli, d'Euler et de Maclaurin. Le jésuite Cavalleri, auteur de la quatrième, avait adopté le système des tourbillons. Ce fut le dernièr honneur rendu à ce système, par l'Académie qui se remplissait alors de jeunes géomètres dont les heureux travaux devaient contribuer si puissamment aux progrès de la Mécanique céleste.

Les pièces qui ont pour base, la loi de la pesanteur universelle, sont des développemens de la théorie de Newton : elles s'appuient nonseulement sur cette loi, mais encore sur l'hypothèse adoptée par ce grand géomètre, savoir que la mer prend à chaque instant la figure où elle serait en équilibre sous l'astre qui l'attire. La pièce de Bernoulli est celle qui contient les développemens les plus étendus. L'auteur recherche d'abord la figure d'équilibre de la mer attirée par le Soleil, dans le cas où ce fluide recouvrirait la Terre entière supposée sphérique et formée de couches sphériques dont la densité varie du centre à la surface, suivant une loi qu'elconque. Il conçoit deux canaux communiquant ensemble au centre de la Terre, le premier étant dirigé vers le Soleil, et le second étant perpendiculaire au premier. Ces deux canaux sont remplis des parties des couches terrestres et de la mer qu'ils traversent; il suppose toutes ces parties fluides dans l'intérieur des canaux, et il détermine l'alongement de la colonne dirigée vers le Soleil, pour qu'elle soit en équilibre avec l'autre colonne. La loi de densité des couches du sphéroïde terrestre, peut être coordonnée de manière que la formule à laquelle on parvient ainsi, donne un alongement propre à satisfaire aux hauteurs observées des marées, pour lesquelles Bernoulli juge que la formule de Newton donne des résultats trop faibles. En appliquant à l'atmosphère, la formule de Bernoulli, on trouve que dans l'intervalle de la haute mer à la basse mer suivante, la hauteur du baromètre varierait d'environ cent cinquante millimètres vers les syzygies; et cependant les observations n'indiquent alors aucune variation sensible dans le baromètre; ce que Bernoulli attribue au ressort de l'air, qui, suivant lui, rétablit très promptement l'équilibre de l'atmosphère. Un rétablissement

aussi prompt, dans une masse fluide aussi étendue, est trop contraire aux principes du mouvement des fluides, pour être admis; mais d'Alembert, dans ses recherches sur la cause des vents, a remarqué le vice de la formule de Bernoulli, en ce que le globe terrestre étant solide, on ne doit point étendre jusqu'à son centre, l'équilibre des canaux, qui n'a lieu que pour les canaux extérieurs à ce globe. Cette formule n'est exacte que dans le cas où la densité de la mer est égale à la densité moyenne de la Terre; et alors, elle donne le résultat de la formule de Newton.

Bernoulli détermine les hauteurs et les heures des marées, en supposant d'abord le Soleil et la Lune mus dans le plan de l'équateur. Il donne les expressions de ces quantités, en ayant égard aux variations de la distance de la Lune à la Terre, et il réduit ces expressions en tables. Il conclut le rapport des actions du Soleil et de la Lune sur la mer, des retards journaliers des marées, retards qui sont à leur minimum dans les syzygies, et à leur maximum dans les quadratures. Ce moyen d'obtenir ce rapport, lui semble préférable à la considération du maximum et du minimum des hauteurs, employée par Newton. Cependant l'observation des hauteurs des pleines mers étant plus facile et plus sûre que celle des heures de leur arrivée, elle doit donner une valeur plus précise de ce rapport, pourvu qu'on ait égard à toutes les causes qui peuvent la modifier. Par cette raison, j'ai préféré pour cet objet la considération des hauteurs des marées. Quant au retard des maxima et des minima des marées, sur les instans des syzygies et des quadratures, Bernoulli l'attribue, comme Newton, à l'inertie des eaux de la mer, et peut-être, ajoute-t-il, une partie de ce retard dépend du temps que l'action de la Lune emploie à parvenir à la Terre. Mais j'ai reconnu que l'attraction universelle se transmet entre les corps célestes avec une vitesse qui, si elle n'est pas infinie, surpasse plusieurs millions de fois la vitesse de la lumière; et l'on sait que la lumière de la Lune parvient en moins de deux secondes, à la Terre. q au animong bass

Bernoulli considère ensuite le cas de la nature, dans lequel les orbes du Soleil et de la Lune sont inclinés à l'équateur. Il trouve que l'excès des hauteurs de deux pleines mers consécutives, l'une sur l'autre, serait très grand dans nos ports, vers les syzygies solsticiales. Il explique, comme Newton, le peu de différence que l'on observe entre ces hauteurs, par le mouvement d'oscillation de la mer, en vertu duquel la plus

grande marée donne à très peu près, à la plus petite, ce qui manque à celle-ci pour l'égaler. Mais nous avons remarqué ci-dessus le vice de cette explication. Bernoulli termine sa pièce par la recherche du point fixe, auquel il convient de rapporter les hauteurs des pleines mers. Il place ce point à la surface d'équilibre que la mer prendrait si le Soleil et la Lune cessaient de l'agiter ; et il trouve qu'il est aux deux tiers de l'intervalle du maximum des hautes mers au minimum des basses mers; ce qui n'est pas exact, par les considérations suivantes. L'expression des actions du Soleil et de la Lune, développée en cosinus d'angles proportionnels au temps, est formée de deux parties, l'une indépendante du mouvement de rotation de la Terre, l'autre dépendante de ce mouvement. La première partie n'élève pas à Brest, la mer, d'un tiers de mètre au-dessus de sa surface d'équilibre. Elle n'est point sensiblement modifiée par les circonstances accessoires. L'autre partie, considérablement augmentée par ces circonstances, élève la mer autant au-dessus de sa surface d'équilibre, qu'elle l'abaisse au-dessous. C'est donc à fort peu près au milieu de l'intervalle de la plus haute à la plus basse mer, que le point dont il s'agit, doit être placé.

Euler, dans sa pièce, conçoit d'abord, ainsi que Newton et Daniel Bernoulli, la mer en équilibre sous l'action du Soleil. Il détermine la figure qu'elle doit prendre pour être en équilibre, par la condition que la force dont chaque molécule est animée, soit perpendiculaire à cette surface. En n'ayant point égard à l'attraction mutuelle des molécules de la mer, ce qui simplifie beaucoup le problème; il trouve une figure elliptique dont l'extrémité du grand axe dirigé vers le Soleil, s'élève au-dessus de la surface d'équilibre de la mer non soumise à l'action du Soleil, d'une quantité égale à la masse du Soleil, divisée par le cube de sa distance au centre de la Terre, la masse de cette planète et son rayon étant pris pour unité. Ce résultat n'est qu'environ le quart de celui de Newton. Euler en conclut que la méthode de Newton est erronée, et que ce grand géomètre n'a pas même touché la question. Mais le peu d'accord de leurs résultats provient de ces deux causes ; l'une, que Newton donne la différence des deux demi-axes du sphéroïde aqueux, ou la hauteur de la pleine mer au-dessus de la basse mer; tandis qu'Euler ne donne que la hauteur de la pleine mer au-dessus de sa surface d'équilibre, hauteur qui n'est que les deux tiers de la première. La seconde cause est l'attraction mutuelle des molécules de la mer que Newton suppose de même densité que la Terre, et qui augmente la différence des deux demi-axes du sphéroïde aqueux. Par la réunion de ces deux causes, le résultat d'Euler est à celui de Newton, dans le rapport de quatre à quinze. Ainsi, au lieu des reproches qu'Euler fait à la méthode de Newton, il devait plutôt en admirer la finesse. Euler s'élevant au-dessus de l'hypothèse que la mer est à chaque instant en équilibre sous l'action du Soleil, essaie dans sa pièce, de soumettre au calcul les oscillations de ce fluide. Mais la théorie du mouvement des fluides, à laquelle il a tant contribué lui-même, n'était pas encore connue. Il y a suppléé par la supposition qu'une molécule de la mer en mouvement, tend à revenir à sa position verticale d'équilibre, avec une force proportionnelle à sa distance verticale de cette position. En combinant cette force avec l'action du Soleil, il parvient, pour déterminer cette distance, à une équation différentielle linéaire du second ordre. Euler donne une méthode pour intégrer ce genre d'équations qui se rencontrent si fréquemment dans la Physique céleste. C'est la chose la plus remarquable de sa pièce, et la seule à laquelle on reconnaît le grand analyste qui, par ses découvertes dans toutes les branches de l'Analyse et par la perfection qu'il a su donner à la langue analytique, peut être regardé comme le père de l'Analyse moderne.

Je viens enfin à la pièce de Maclaurin, dont j'ai déjà parlé dans le premier chapitre du Livre XI. Elle offre peu de détails sur le flux et le reflux de la mer; mais par l'importance et la nouveauté des théorèmes qu'elle contient sur les attractions des sphéroïdes, et par l'élégance de leurs démonstrations synthétiques, elle méritait au moins de partager

le prix de l'Académie. Took al s'endersons 1402 309 avriou un 2041114

D'Alembert, dans son Traité sur la cause générale des vents, qui remporta, en 1746, le prix proposé sur cet objet par l'Académie des Sciences de Prusse, considéra les oscillations de l'atmosphère, produites par les attractions du Soleil et de la Lune. En supposant la Terre privée de son mouvement de rotation, dont il jugeait la considération inutile dans ces recherches, et supposant l'atmosphère partout également dense et soumise à l'attraction d'un astre en repos, il détermina les oscillations de ce fluide. Mais lorsqu'il voulut traiter le cas où l'astre est en mouvement, la difficulté du problème le força de recourir, pour le simplifier, à des hypothèses précaires dont les résultats ne peuvent pas même être considérés comme des approximations. Ses formules donnent

un vent constant d'orient en occident, mais dont l'expression dépend de l'état initial de l'atmosphère; or les quantités dépendantes de cet état ont dû disparaître depuis long-temps, par toutes les causes qui rétabliraient l'équilibre de l'atmosphère, si l'action des astres venait à cesser; on ne peut donc pas expliquer ainsi, les vents alisés. Le traité de d'Alembert est remarquable par les solutions de quelques problèmes sur le calcul intégral aux différences partielles, solutions dont il fit un an après, l'application la plus heureuse au mouvement des cordes vibrantes.

Le mouvement des fluides qui recouvrent les planètes était donc un sujet presque entièrement neuf, lorsque j'entrepris, en 1774, de le traiter. Aidé par les découvertes que l'on venait de faire sur le calcul aux différences partielles et sur la théorie du mouvement des fluides. découvertes auxquelles d'Alembert eut beaucoup de part, je publiai dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, pour l'année 1775, les équations différentielles du mouvement des fluides qui recouvrent la Terre, quand ils sont attirés par le Soleil et la Lune. J'appliquai d'abord ces équations au problème que d'Alembert avait tenté inutilement de résoudre, celui des oscillations d'un fluide qui recouvrirait la Terre supposée sphérique et sans rotation, en considérant l'astre attirant en mouvement autour de cette planète. Je donnai la solution générale de ce problème, quelle que soit la densité du fluide et son état initial. en supposant même que chaque molécule fluide éprouve une résistance proportionnelle à sa vitesse; ce qui me fit voir que les conditions primitives du mouvement sont anéanties à la longue par le frottement et par la petite viscosité du fluide. Mais l'inspection des équations différentielles me fit bientôt reconnaître la nécessité d'avoir égard au mouvement de rotation de la Terre. Je considérai donc ce mouvement. et je m'attachai spécialement à déterminer les oscillations du fluide. indépendantes de son état initial, les seules qui soient permanentes. Ces oscillations sont de trois espèces. Celles de la première espèce sont indépendantes du mouvement de rotation de la terre, et leur détermination offre peu de difficultés. Les oscillations dépendantes de la rotation de la Terre, et dont la période est d'environ un jour, forment la seconde espèce. Enfin, la troisième espèce est composée des oscillations dont la période est à peu près d'un demi-jour: elles surpassent considérablement les autres dans nos ports. Je déterminai ces diverses oscillations, exactement dans les cas où cela se peut, et par des approximations très convergentes, dans les autres cas. L'excès de deux pleines mers consécutives l'une sur l'autre, dans les solstices, dépend des oscillations de la seconde espèce. Cet excès très peu sensible à Brest, y serait fort grand suivant la théorie de Newton. Ce grand géomètre et ses successeurs attribuaient, comme je l'ai dit, cette différence entre leurs formules et les observations, à l'inertie des eaux de l'Océan. Mais l'Analyse me fit voir qu'elle dépend de la loi de profondeur de la mer. Je cherchai donc la loi qui rendrait nul cet excès, et je trouvai que la profondeur de la mer devait être pour cela, constante. En supposant ensuite la figure de la Terre, elliptique, ce qui donne pareillement à la mer une figure elliptique d'équilibre; je donnai l'expression générale des inégalités de la seconde espèce, et j'en conclus cette proposition remarquable. savoir que les mouvemens de l'axe terrestre sont les mêmes que si la mer formait une masse solide avec la terre; ce qui était contraire à l'opinion des géomètres et spécialement de d'Alembert qui, dans son important ouvrage sur la Précession des équinoxes, avait avancé que la fluidité de la mer lui ôtait toute influence sur ce phénomène. Mon analyse me fit encore reconnaître la condition générale de la stabilité de l'équilibre de la mer. Les géomètres, en considérant l'équilibre d'un fluide placé sur un sphéroïde elliptique, avaient remarqué qu'en aplatissant un peu sa figure, il ne tendait à revenir à son premier état, que dans le cas où le rapport de sa densité à celle du sphéroïde serait au-dessous de 5, et ils avaient fait de cette condition, celle de la stabilité de l'équilibre du fluide. Mais il ne suffit pas, dans cette recherche, de considérer un état de repos du fluide, très voisin de l'état d'équilibre; il faut supposer à ce fluide un mouvement initial quelconque très petit, et déterminer la condition nécessaire pour que le mouvement reste toujours contenu dans d'étroites limites. En envisageant ce problème, sous ce point de vue général; je trouvai que si la densité moyenne de la Terre surpasse celle de la mer, ce fluide dérangé par des causes quelconques, de son état d'équilibre, ne s'en écartera jamais que de quantités très petites ; mais que les écarts pourraient être fort grands, si cette condition n'était pas remplie. Enfin je déterminai les oscillations de l'atmosphère sur l'Océan qu'il recouvre; et je trouvai que les attractions du Soleil et de la Lune ne peuvent produire le mouvement constant d'orient en occident, que l'on observe sous le nom de vents alisés. Les oscillations de l'atmosphère

produisent dans la hauteur du baromètre, de petites oscillations dont l'étendue à l'équateur est d'un demi-millimètre, et qui méritent l'attention des observateurs.

Les recherches précédentes, quoique fort générales, sont encore loin de représenter les observations des marées dans nos ports : elles supposent la surface du sphéroïde terrestre, régulière et recouverte entièrement par la mer; et l'on sent que les grandes irrégularités de cette surface doivent modifier considérablement le mouvement des eaux dont elle n'est qu'en partie, recouverte. L'expérience montre en effet, que les circonstances accessoires produisent des variétés considérables dans les hauteurs et dans les heures des marées, des ports même très rapprochés. Il est impossible de soumettre au calcul, ces variétés, parce que les circonstances dont elles dépendent, ne sont pas connues; et quand même elles le seraient, l'extrême difficulté du problème empêcherait de le résoudre. Cependant, au milieu des modifications nombreuses du mouvement de la mer, dues aux circonstances, ce mouvement conserve avec les forces qui le produisent, des rapports propres à indiquer la nature de ces forces, et à vérifier la loi des attractions du Soleil et de la Lune sur la mer. La recherche de ces rapports des causes à leurs effets n'est pas moins utile dans la Philosophie naturelle, que la solution directe des problèmes, soit pour vérifier l'existence de ces causes, soit pour déterminer les lois de leurs effets : elle est d'un usage plus fréquent, et elle est ainsi que le Calcul des probabilités, un heureux supplément à l'ignorance et à la faiblesse de l'esprit humain. Dans la question présente, j'ai fait usage du principe suivant, qui peut être utile dans d'autres occasions.

« L'état d'un système de corps dans lequel les conditions primitives » du mouvement ont disparu par les résistances que ce mouvement » éprouve, est périodique comme les forces qui l'animent. »

De là j'ai conclu que si la mer est sollicitée par une force périodique exprimée par le cosinus d'un angle qui croît proportionnellement au temps; il en résulte un flux partiel exprimé par le cosinus d'un angle croissant de la même manière, mais dont la constante renfermée sous le signe cosinus, et le coefficient de ce cosinus, peuvent être, en vertu des circonstances accessoires, très différens des mêmes constantes dans l'expression de la force, et ne peuvent être déterminés que par l'observation. L'expression des actions du Soleil et de la Lune sur la mer,

peut être développée dans une série convergente de pareils cosinus. De là naissent autant de flux partiels qui, par le principe de la coexistence des petites oscillations, s'ajoutent ensemble pour former le flux total que l'on observe dans un port. C'est sous ce point de vue, que j'ai envisagé les marées dans le quatrième Livre. Pour lier entre elles les diverses constantes des flux partiels, j'ai considéré chaque flux comme produit par l'action d'un astre qui se meut uniformément dans le plan de l'équateur. Les flux dont la période est d'environ un demi-jour, sont dus à l'action d'astres dont le mouvement propre est fort lent par rapport au mouvement de rotation de la Terre; et comme l'angle du cosinus qui exprime l'action d'un de ces astres, est un multiple de la rotation de la Terre, plus ou moins un multiple du mouvement propre de l'astre, et que d'ailleurs les constantes des cosinus qui expriment les flux produits par deux astres, auraient les mêmes rapports aux constantes des cosinus qui expriment leurs actions, si les mouvemens propres étaient égaux; j'ai supposé que les rapports varient d'un astre à l'autre, proportionnellement à la différence des mouvemens propres. L'erreur de cette hypothèse, s'il v en a une, n'a point d'influence sensible sur les principaux résultats de mes calculs.

Les plus grandes variations de la hauteur des marées dans nos ports, sont dus à l'action du Soleil et de la Lune, supposés mus uniformément dans leurs orbites et toujours à la même distance de la Terre. Mais pour avoir la loi de ces variations, il faut combiner les observations de manière que toutes les autres variations disparaissent de leur résultat. C'est ce que l'on obtient, en considérant les hauteurs des pleines mers, au-dessus des basses mers voisines, dans les syzygies et les quadratures prises en nombre égal vers chaque équinoxe et vers chaque solstice. Par ce moyen, les flux indépendans de la rotation de la Terre, et ceux dont la période est d'environ un jour, disparaissent, ainsi que les flux produits par la variation de la distance du Soleil à la Terre. En considérant trois syzygies ou trois quadratures consécutives, et en doublant l'intermédiaire, on fait disparaître les flux que produit la variation de la distance de la Lune; parce que si cet astre est périgée dans une syzygie, il est à peu près apogée dans la syzygie suivante; et la compensation est d'autant plus exacte, que l'on emploie un plus grand nombre d'observations. Par ce procédé, l'influence des vents sur le résultat de observations devient presque nulle; car si le vent élève la

hauteur d'une pleine mer, il élève à peu près autant la basse mer voisine, et son effet disparaît dans la différence des deux hauteurs. C'est ainsi qu'en combinant les observations de manière que leur ensemble ne présente qu'un élément, on parvient à déterminer successivement tous les élémens des phénomènes. L'analyse des probabilités fournit pour obtenir ces élémens, une méthode plus sûre encore, et que l'on peut désigner par le nom de méthode la plus avantageuse. Elle consiste à former entre les élémens, autant d'équations de condition, qu'il y a d'observations. On réduit par les règles de cette méthode, le nombre de ces équations, à celui des élémens que l'on détermine en résolvant les équations ainsi réduites. C'est par ce procédé, que M. Bouvard a construit ses excellentes Tables de Jupiter, de Saturne et d'Uranus. Mais les observations des marées, étant loin d'atteindre la précision des observations astronomiques; le très grand nombre de celles qu'il faut employer pour que leurs erreurs se compensent, ne permet pas de leur appliquer la méthode la plus avantageuse.

Sur l'invitation de l'Académie des Sciences, on fit au commencement du dernier siècle, dans le port de Brest, des observations des marées pendant six années consécutives. C'est à ces observations publiées par Lalande, que j'ai comparé dans le Livre cité, mes formules. La situation de ce port est très favorable à ce genre d'observations : il communique avec la mer par un vaste canal au fond duquel on l'a construit. Les irrégularités du mouvement de la mer parviennent ainsi dans le port, très affaiblies, à peu près comme les oscillations que le mouvement irrégulier d'un vaisseau produit dans le baromètre, sont atténuées par un étranglement fait au tube de cet instrument. D'ailleurs, les marées étant considérables à Brest, les variations accidentelles n'en sont qu'une faible partie. Aussi l'on remarque dans les observations de ces marées, pour peu qu'on les multiplie, une grande régularité que n'altère point la petite rivière qui vient se perdre dans la rade immense de ce port. Frappé de cette régularité, je proposai au gouvernement d'ordonner que l'on fît à Brest une nouvelle suite d'observations des marées, et qu'elle fût continuée au moins pendant une période du mouvement de nœuds de l'orbite lunaire. C'est ce que l'on a entrepris. Ces nouvelles observations datent du premier juin de l'année 1806, et depuis cette époque, elles ont étéceontimuées chaques journs ans interruption. On a considéré celles de l'année 1807, et des quinze années suivantes. Je

dois au zèle infatigable de M. Bouvard pour tout ce qui intéresse l'Astronomie, les calculs immenses que la comparaison de mon analyse avec les observations a exigés. Il y a employé près de six mille observations : les résultats de ces calculs sont consignés dans les tableaux que l'on verra ci-après. Pour avoir les hauteurs des pleines mers, et leur variation qui, près du maximum et du minimum, est proportionnelle au carré du temps; on a considéré vers chaque équinoxe et vers chaque solstice, trois syzygies consécutives entre lesquelles l'équinoxe ou le solstice était compris : on a doublé les résultats de la syzygie intermédiaire, pour détruire les effets de la parallaxe lunaire. On a pris dans chaque syzygie, la hauteur de la pleine mer du soir, au-dessus de la basse mer du matin, du jour qui précède la syzygie, du jour même de la syzygie et des quatre jours qui la suivent; parce que le maximum des marées tombe à peu près au milieu de cet intervalle : le choix des heures est fondé sur ce que les observations faites pendant le jour, en deviennent plus sûres et plus exactes. On a fait pour chacune des seize années, une somme des hauteurs des marées des jours correspondans dans les syzygies équinoxiales, et une pareille somme relativement aux syzygies solsticiales; et l'on en a conclu les maxima des hauteurs des pleines mers, près des syzygies, soit équinoxiales, soit solsticiales; et les variations de ces hauteurs près de leurs maxima. L'inspection de ces hauteurs et de leurs variations montre la régularité de ce genre d'observations dans le port de Brest.

Dans les quadratures, on a suivi un procédé semblable, avec la seule différence que l'on a pris l'excès de la haute mer du matin sur la basse mer du soir, du jour de la quadrature et des trois jours qui la suivent. L'accroissement des marées quadratures, à partir de leur minimum, étant beaucoup plus rapide, que la diminution des marées syzygies, à partir de leur maximum; on a dû restreindre à un plus petit intervalle, la loi de variation proportionnelle au carré du temps. On a formé pour chacune des seize années, des tableaux pareils à ceux des marées syzygies.

Tous ces tableaux montrent avec évidence, l'influence des déclinaisons du Soleil et de la Lune, non-seulement sur les hauteurs absolues des marées, mais encore sur leurs variations. Plusieurs savans et spécialement Lalande, avaient révoqué en doute cette influence; parce qu'au lieu de considérer un grand ensemble d'observations, ils s'étaient attachés à quelques observations isolées où la mer, par l'effet de causes

accidentelles, s'était élevée à une grande hauteur vers les solstices. Mais l'application la plus simple du calcul des probabilités, aux résultats de M. Bouvard, suffit pour voir que la probabilité de l'influence de la déclinaison des astres, est excessive et bien supérieure à celle d'un grand nombre de faits sur lesquels on ne se permet aucun doute.

On a conclu des variations des marées près de leurs maxima et de leurs minima, l'intervalle dont ces maxima et ces minima suivent les syzygies et les quadratures, et l'on a trouvé cet intervalle, d'un jour et demi à fort peu près; ce qui est parfaitement d'accord avec ce que les observations anciennes m'out donné dans le quatrième Livre. Le même accord a lieu relativement aux grandeurs de ces maxima et de ces minima, et par rapport aux variations des hauteurs des marées, à partir de ces points; en sorte que la nature, après un siècle, s'est retrouvée conforme à elle-même. L'intervalle dont je viens de parler, dépend des constantes renfermées sous les signes cosinus dans les expressions des deux flux principaux dus aux actions du Soleil et de la Lune. Les constantes correspondantes de l'expression des forces sont différemment modifiées par les circonstances accessoires : au moment de la syzygie, le flux lunaire précède le flux solaire, et ce n'est qu'un jour et demi après, que le flux lunaire retardant chaque jour sur le flux solaire, ces deux flux coincident et produisent ainsi le maximum des marées. Une modification semblable a lieu dans les constantes qui multiplient les cosinus : il en résulte un accroissement dans l'action des astres sur la mer. J'ai donné dans le quatrième Livre, le moyen de reconnaître cet accroissement que j'avais trouvé d'un dixième, par les observations anciennes; mais quoique les observations des marées quadratures s'accordassent sur ce point avec les observations des marées syzygies, j'avais dit qu'un élément aussi délicat exigeait un bien plus grand nombre d'observations. Les calculs de M. Bouvard ont confirmé l'existence de cet accroissement, et l'ont porté à un quart à fort peu près, pour la Lune. La détermination de ce rapport est nécessaire pour conclure des observations des marées, les rapports véritables des actions du Soleil et de la Lune dont dépendent les phénomènes de la précession des équinoxes et de la nutation de l'axe terrestre. En corrigeant les actions des astres sur la mer, de leurs accroissemens dus aux circonstances accessoires; on trouve en secondes sexagésimales qu',4 pour la nutation, 6",8 pour l'équation lunaire des tables du Soleil, et la masse de la Lune, un 75° de celle de la Terre. Ces résultats sont à très peu près ceux que donne la discussion des observations astronomiques. L'accord de valeurs obtenues par des moyens si divers, est bien remarquable. C'est en comparant à mes formules, les maxima et les minima des hauteurs observées des marées, que les actions du Soleil et de la Lune sur la mer et leurs accroissemens ont été déterminés. Les variations des hauteurs des marées près de ces points, en sont une suite nécessaire ; en substituant donc les valeurs de ces actions, dans mes formules, on doit retrouver à fort peu près les variations observées. C'est ce que l'on retrouve en effet. Cet accord est une grande confirmation de la loi de la pesanteur universelle: elle reçoit une nouvelle confirmation, des observations des marées syzygies vers l'apogée et vers le périgée de la Lune. Je n'avais considéré dans le quatrième Livre, que la différence des hauteurs des marées dans ces deux positions de la Lune. Je considère de plus la variation de ces hauteurs à partir de leurs maxima; et sur ces deux points, mes formules représentent les observations.

Les heures des marées et leurs retards d'un jour à l'autre, offrent les mêmes variétés que leurs hauteurs. M. Bouvard en a formé des tableaux pour les marées qu'il avait employées dans la détermination des hauteurs. On y voit évidemment l'influence des déclinaisons des astres et de la parallaxe lunaire. Ces observations comparées à mes formules, offrent le même accord que les observations des hauteurs. On ferait sans doute disparaître les petites anomalies que ces comparaisons présentent encore, en déterminant convenablement les constantes de chaque flux partiel. Le principe par lequel j'ai lié entre elles ces constantes diverses, peut n'être pas rigoureusement exact. Peut-être encore, les quantités que l'on néglige en adoptant le principe de la coexistence des oscillations, deviennent sensibles dans les grandes marées. Je me suis ici contenté de noter ces anomalies légères, afin de diriger ceux qui voudront reprendre ces calculs, lorsque les observations des marées que l'on continue à Brest, et qui sont déposées à l'Observatoire royal, seront assez nombreuses pour donner la certitude que ces anomalies ne sont point dues aux erreurs des observations. Mais avant que de modifier les principes dont j'ai fait usage, il faudra porter plus loin les approximations analytiques.

Enfin j'ai considéré le flux dont la période est d'environ un jour. En comparant les différences de deux hautes mers, et de deux

basses mers consécutives, dans un grand nombre de syzygies solsticiales' j'ai déterminé la grandeur de ce flux et l'heure de son maximum dans le port de Brest. J'ai trouvé un cinquième de mètre à fort peu près pour sa grandeur, et un dixième de jour environ pour le temps dont il précède à Brest l'heure du maximum de la marée semi-diurne. Quoique sa grandeur ne soit pas un trentième de la grandeur du flux semi-diurne, cependant les forces génératrices de ces deux flux sont à peu près égales; ce qui montre combien différemment les circonstances accessoires influent sur la grandeur des marées. On n'en sera point surpris, si l'on considère que dans le cas même où la surface de la Terre serait régulière et recouverte entièrement par la mer, le flux diurne disparaîtrait si la profondeur de la mer était constante.

Les circonstances accessoires peuvent encore faire disparaître dans un port les inégalités semi-dinrnes, et rendre très sensibles les inégalités diurnes. Alors il n'y a chaque jour qu'une marée, qui disparaît lorsque les astres sont dans l'équateur. C'est ce que l'on a observé à Batsham, port du royaume de Tunquin, et dans quelques îles de la mer du Sud. J'observerai relativement à ces circonstances, que les unes s'étendent à la mer entière et se rapportent à des causes très éloignées du port où l'on observe les marées; on ne peut douter, par exemple, que les ondulations de l'Océan atlantique et de la mer du Sud, réfléchies par la côte orientale de l'Amérique, qui s'étend presque d'un pôle à l'autre, n'aient une grande influence sur les marées du port de Brest. C'est principalement de ces circonstances, que dépendent les phénomènes qui sont à peu près les mêmes dans nos ports. Tel paraît être le retard de la plus haute marée sur l'instant de la syzygie. D'autres circonstances plus rapprochées du port, telles que les côtes ou les détroits voisins, produisent les différences que l'on observe entre les hauteurs et les heures des marées, dans des ports peu distans entre eux. De là il suit qu'un flux partiel n'a point avec la latitude du port, le rapport indiqué par la force qui le produit; puisqu'il dépend de flux semblables correspondans à des latitudes fort éloignées et même à un autre hémisphère. On ne peut donc déterminer que par l'observation, le signe et la grandeur de ce flux. windipes cont i'at the usage, il faudra porter prins le

Les phénomènes des marées, dont je viens de parler, dépendent des termes du développement de l'action des astres, divisés par le cube de leurs distances à la Terre, les seuls que l'on ait considérés jusqu'ici.

Mais la Lune est assez rapprochée de la Terre, pour que les termes de l'expression de son action, divisés par la quatrième puissance de sa distance, soient sensibles dans les résultats d'un grand nombre d'observations; car on sait par la théorie des probabilités, que le nombre des observations supplée à leur défaut de précision, et fait connaître des inégalités beaucoup moindres que les erreurs dont chaque observation est susceptible. On peut même, par cette théorie, assigner le nombre d'observations nécessaires pour acquérir une grande probabilité que l'erreur du résultat obtenu est renfermée dans des limites données. J'ai donc pensé que l'influence des termes de l'action de la Lune, divisés par la quatrième puissance de sa distance à la Terre, pourrait se manifester dans l'ensemble des nombreuses observations discutées par M. Bouvard. Les flux correspondans aux termes divisés par le cube de la distance ne donnent aucune différence entre les marées des nouvelles lunes et celles des pleines lunes. Mais ceux qui ont pour diviseur, la quatrième puissance de la distance, mettent une différence entre ces marées. Ils produisent un flux dont la période est d'environ un tiers de jour. Les observations de M. Bouvard, discutées sous ce point de vue, indiquent avec une grande probabilité l'existence de ce flux partiel. Elles établissent encore, sans aucun doute, que l'action de la Lune pour élever la mer à Brest, est plus grande lorsque sa déclinaison est australe, que lorsqu'elle est boréale; ce qui ne peut être dû qu'aux termes de l'action lunaire, divisés par la quatrième puissance de la distance.

On voit par cet exposé, que la recherche des rapports généraux entre les phénomènes des marées, et les actions du Soleil et de la Lune sur la mer, supplée heureusement à l'impossibilité d'intégrer les équations différentielles de son mouvement, et à l'ignorance des données nécessaires pour déterminer les fonctions arbitraires qui entrent dans leurs intégrales : il en résulte une certitude entière, que ces phénomènes ont pour unique cause, l'attraction de ces deux astres, conformément à la loi de la pesanteur universelle.

J'ai insisté particulièrement sur le flux et le reflux de la mer, parce qu'il est de tous les effets de l'attraction des corps célestes, le plus près de nous et le plus sensible; d'ailleurs il m'a paru très propre à montrer comment on peut reconnaître et déterminer par un grand nombre d'observations même peu précises, les lois et les causes des phénomènes dont

il est impossible d'obtenir les expressions analytiques, par la formation et l'intégration de leurs équations différentielles. Tels sont les effets de la chaleur solaire sur l'atmosphère, dans la production des vents alisés et des moussons, et dans les variations régulières, soit diurnes, soit annuelles, du baromètre et du thermomètre.

Pour arriver à l'Océan, l'action du Soleil et de la Lune traverse l'atmosphère qui doit, par conséquent, en éprouver l'influence, et être assujettie à des mouvemens semblables à ceux de la mer, mouvemens dont j'ai donné la théorie dans le quatrième Livre. De là résultent des vents et des oscillations dans le baromètre, dont les périodes sont les mêmes que celles du flux et du reflux. Mais ces vents sont peu considérables et presque insensibles dans une atmosphère d'ailleurs fort agitée : l'étendue des oscillations du baromètre n'est pas d'un millimètre, à l'équateur même où elle est la plus grande. Cependant, les circonstances locales qui augmentent considérablement les oscillations de la mer, peuvent également accroître les oscillations du baromètre dont l'observation suivie sous ce rapport, mérite l'attention des physiciens.

Le flux atmosphérique est produit par les trois causes suivantes : la première est l'action directe du Soleil et de la Lune sur l'atmosphère; la seconde est l'élévation et l'abaissement périodique de l'Océan, base mobile de l'atmosphère; la troisième enfin, est l'attraction de ce fluide par la mer dont la figure varie périodiquement. Ces trois causes dérivant des mêmes forces attractives du Soleil et de la Lune; elles ont ainsi que leurs effets, les mêmes périodes que ces forces, conformément au principe sur lequel j'ai fondé ma théorie des marées. Le flux atmosphérique est donc soumis aux mêmes lois que le flux de l'Océan : il est, comme lui, la combinaison de deux flux partiels produits, l'un par l'action du Soleil, l'autre par l'action de la Lune. La période du flux atmosphérique solaire est d'un demi-jour solaire; et celle du flux lunaire est d'un demi-jour lunaire. L'action de la Lune sur la mer à Brest, étant triple de celle du Soleil, le flux lunaire atmosphérique est au moins double du flux solaire. Ces considérations doivent nous guider dans le choix des observations propres à déterminer d'aussi petites quantités, et dans la manière de les combiner, pour se soustraire, le plus qu'il est possible, à l'influence des causes qui produisent les grandes variations du baromètre. Durag au raq renimer per un grand, propriet de la description de la de

Depuis plusieurs années, on observe, chaque jour, à l'Observatoire

royal, les hauteurs du baromètre et du thermomètre, à neuf heures sexagésimales du matin, à midi, à trois heures après midi, et à neuf heures du soir. Ces observations faites avec les mêmes instrumens, et presque toutes par le même observateur, sont par leur précision et par leur grand nombre, propres à indiquer le flux atmosphérique, s'il est sensible. On voit avec évidence, la variation diurne du baromètre, dans les résultats de ces observations : un mois suffit pour la manifester. L'excès de la plus grande hauteur du baromètre observée qui répond à neuf heures du matin, sur la plus petite qui répond à trois heures du soir, est à Paris de huit dixièmes de millimètre, par le résultat moyen des observations faites chaque jour, pendant six années consécutives.

La hauteur du baromètre due au flux solaire, redevenant chaque jour, la même à la même heure; ce flux se confond avec la variation diurne qu'il modifie, et il n'en peut être distingué par les observations faites à l'Observatoire royal. Il n'en est pas ainsi des hauteurs barométriques dues au flux lunaire, et qui se réglant sur les heures lunaires, ne redeviennent les mêmes aux mêmes heures solaires, qu'après un demi-mois d'intervalle. Les observations dont je viens de parler, comparées de demi-mois en demi-mois, sont disposées de la manière la plus favorable pour indiquer le flux lunaire. Si, par exemple, le maximum de ce flux arrive à neuf heures du matin, le jour de la syzygie; son minimum arrivera vers trois heures du soir. Le contraire aura lieu, le jour de la quadrature. Ce flux augmentera donc la variation diurne du premier de ces jours; il diminuera la variation diurne du second; et la différence de ces variations sera le double de la grandeur du flux lunaire atmosphérique. Mais le maximum de ce flux n'arrivant pas à neuf heures du matin dans la syzygie; il faut, pour déterminer sa grandeur et l'heure de son arrivée, employer les observations barométriques de neuf heures du matin, de midi et de trois heures du soir, faites chaque jour, soit de la syzygie, soit de la quadrature. On peut également faire usage des observations des jours qui précèdent ou qui suivent ces phases, du même nombre de jours, et faire concourir à la détermination d'élémens aussi délicats, toutes les observations de l'année.

On doit faire ici une remarque importante sans laquelle il serait impossible de reconnaître une aussi petite quantité que le flux lunaire, au milieu des grandes variations du baromètre. Plus les observations sont rapprochées, moins l'effet de ces variations est sensible : il est presque

nul sur un résultat conclu d'observations faites le même jour et dans le court intervalle de six heures : le baromètre varie presque toujours avec assez de lenteur, pour ne pas troubler alors sensiblement l'effet des causes régulières. Voilà pourquoi le résultat moyen des variations diurnes de chaque année est toujours le même à fort peu près, quoiqu'il y ait des différences de plusieurs millimètres dans les hauteurs moyennes absolues barométriques des diverses années; en sorte que si l'on comparait la hauteur moyenne de neuf heures du matin, d'une année, à la hauteur moyenne de trois heures du soir, d'une autre année; on aurait une variation diurne, souvent très fautive, quelquefois même d'un signe contraire à la véritable. Il importe donc pour déterminer de très petites quantités, de les déduire d'observations faites le même jour, et de prendre une moyenne entre un grand nombre de valeurs ainsi obtenues. On ne peut conséquemment déterminer le flux lunaire, que par un système d'observations faites, chaque jour, au moins à trois heures différentes, conformément au système suivi à l'Observatoire.

M. Bouvard a bien voulu relever sur ses registres, les observations barométriques du jour même de chaque syzygie et de chaque quadrature, du jour qui précède ces phases, et des premier et second jours qui les suivent. Elles embrassent les huit années écoulées depuis le 1er octobre 1815 jusqu'au 1er octobre 1823. J'ai employé les observations de neuf heures du matin, de midi et de trois heures du soir : je n'ai point considéré les observations de neuf heures du soir, pour diminuer, le plus qu'il est possible, l'intervalle des observations. D'ailleurs, celles des trois premières heures ont été faites plus exactement aux heures indiquées, que celles de neuf heures du soir; et le baromètre étant éclairé par la lumière du jour, dans ces premières heures, la différence qui peut venir de la manière diverse dont les instrumens sont éclairés, disparaît. En comparant à mes formules, les résultats de ces nombreuses observations qui correspondent à 1584 jours; je trouve un dix-huitième de millimètre pour la grandeur du flux lunaire atmosphérique, et trois heures et un tiers sexagésimales, pour Pheure de son maximum du soir, le jour de la syzygie.

C'est ici surtout que se fait sentir la nécessité d'employer un très grand nombre d'observations, de les combiner de la manière la plus avantageuse, et d'avoir une méthode pour déterminer la probabilité que l'erreur des résultats obtenus, est renfermée dans d'étroites limites,

méthode sans laquelle on est exposé à présenter comme lois de la nature, les effets des causes irrégulières; ce qui est arrivé souvent en Météorologie. J'ai donné cette méthode dans ma Théorie analytique des Probabilités. En l'appliquant aux observations, j'ai déterminé la loi des anomalies de la variation diurne du baromètre, et j'ai reconnu que l'on ne peut pas, sans quelque invraisemblance, attribuer les résultats précédens, à ces anomalies seules : il est probable que le flux lunaire atmosphérique diminue la variation diurne dans les syzygies, qu'il l'augmente dans les quadratures, mais dans des limites telles que ce flux ne fait pas varier la hauteur du baromètre, d'un dix-huitième de millimètre en plus ou en moins; ce qui montre combien peu l'action de la Lune sur l'atmosphère est sensible à Paris. Quoique ces résultats aient été conclus de 4752 observations, la méthode dont je viens de parler fait voir que pour leur donner une probabilité suffisante, et pour obtenir avec exactitude un élément aussi petit que le flux lunaire atmosphérique, il faut employer au moins quarante mille observations. L'un des principaux avantages de cette méthode est de faire connaître jusqu'à quel point on doit multiplier les observations, pour qu'il ne reste aucun doute raisonnable sur leurs résultats.

Ouelle est sur le flux lunaire, l'influence respective des trois causes du flux atmosphérique que j'ai citées? Il est difficile de répondre à cette question. Cependant le peu de densité de la mer par rapport à la moyenne densité de la Terre, ne permet pas d'attribuer un effet sensible au changement périodique de sa figure. Sans les circonstances accessoires, l'effet direct de l'action de la Lune serait insensible sous nos latitudes. Ces circonstances ont, il est vrai, une grande influence sur la hauteur des marées dans nos ports; mais le fluide atmosphérique étant répandu autour de la Terre, beaucoup moins irrégulièrement que la mer, leur influence sur le flux atmosphérique doit être beaucoup moindre que sur le flux de l'Océan. Ces considérations me portent à regarder comme cause principale du flux lunaire atmosphérique, dans nos climats, l'élévation et l'abaissement périodiques de la mer. Des observations barométriques faites chaque jour, dans les ports où la marée s'élève à une grande hauteur, éclairciraient ce point curieux de Météorologie.

M. Bouvard a trouvé que la variation diurne moyenne du baromètre, de neuf heures du matin à trois heures du soir, a été positive pour chacun des 72 mois des six années écoulées depuis le 1er janvier 1817, jusqu'au 1er janvier 1823, et d'où il a conclu la variation diurne moyenne égale à 0mm, 8014. La loi de probabilité des anomalies de la variation diurne, à laquelle je suis parvenu, donne à très peu près ½ pour la probabilité de ce résultat.

En examinant le tableau des hauteurs moyennes du baromètre pour chacun des 72 mois considérés par M. Bouvard, j'ai reconnu que le résultat moyen des variations diurnes de neuf heures du matin à trois heures du soir, des trois mois de novembre, décembre et janvier, a été constamment plus faible, chaque année, que le résultat moyen des trois mois suivans, février, mars et avril. La variation moyenne des six années, a été o", 5428, pour les trois premiers mois, et 1mm, 0567 ou presque double pour les trois mois suivans. La moyenne de ces six mois est à fort peu près huit dixièmes de millimètre et par conséquent égale à la variation diurne movenne. Les six autres mois n'offrent rien de semblable. Une différence aussi considérable indique une cause annuelle qui diminue la variation diurne, dans les trois mois de novembre, décembre et janvier, et qui l'augmente dans les trois mois suivans. En appliquant à cette différence l'analyse des probabilités, je trouve qu'il y a une probabilité de plus de trois cent mille contre un, qu'elle n'est pas l'effet du hasard. Ce qui augmente encore cette probabilité, est que la variation diurne moyenne de neuf heures du matin à midi, a été omm, 1933 dans les trois premiers mois et omm, 3733 dans les trois mois suivans : pareillement la variation diurne moyenne de trois heures du soir à neuf heures du soir, a été om, 3033, dans les trois premiers mois et om, 6000, dans les trois mois suivans : ces variations sont à peu près dans le rapport des variations correspondantes de neuf heures du matin à trois heures du soir. Je ne cherche point ici la cause de ce phénomène : je me borne à constater son existence. La période de la variation diurne, réglée sur le jour solaire, indique évidemment que cette variation est due à l'action du Soleil. L'extrême petitesse de l'action attractive du Soleil sur l'atmosphère est prouvée par la petitesse de l'action attractive de la Lune. C'est donc par l'action de sa chaleur, que le Soleil produit la variation diurne. Mais il est presque impossible de soumettre les effets de cette action à l'analyse; et toute explication de ce genre de phénomènes, qui n'est point fondée sur le Calcul, doit être bannie de la Philosophie naturelle.

## CHAPITRE II.

Nouvelles recherches sur la Théorie des Marées.

2. Ma théorie des marées, exposée dans le quatrième Livre, repose sur ce principe, savoir que l'état d'un système de corps, dans lequel les conditions primitives du mouvement ont disparu par les résistances qu'il éprouve, est périodique comme les forces qui l'animent. Ce principe combiné avec celui de la coexistence des oscillations très petites, explique d'une manière singulièrement heureuse, tous les phénomènes des marées, indépendans des circonstances locales. Les forces productrices de ces phénomènes, relatives à l'action d'un astre L, sont, comme on le voit dans le n° 16 du Livre IV, exprimées par les différences partielles de la fonction

$$\frac{3L}{2r^3} \left\{ \left[ \cos \theta . \sin \nu + \sin \theta . \cos \nu . \cos (nt + \varpi - \psi)^2 \right] - \frac{1}{3} \right\}; \quad (a)$$

L désignant la masse de l'astre; r sa distance au centre de la Terre; v sa déclinaison;  $\downarrow$  son ascension droite comptée de l'intersection de son orbite avec l'équateur; t le temps;  $nt + \varpi$ , l'angle horaire de cette intersection; et  $\theta$  le complément de la latitude du port. Soit  $\varepsilon$  l'inclinaison de l'orbite à l'équateur, et  $\varphi$  la distance angulaire de l'astre L à l'intersection de l'orbite et de l'équateur; on aura par les formules de la Trigonométrie sphérique,

$$\sin \nu = \sin \epsilon \cdot \sin \varphi;$$

$$\cos \nu \cdot \sin \psi = \cos \epsilon \cdot \sin \varphi;$$

$$\cos \nu \cdot \cos \psi = \cos \varphi;$$

$$\cos^2 \nu = \frac{1}{2} \cdot (1 + \cos^2 \epsilon) + \frac{1}{2} \cdot \sin^2 \epsilon \cdot \cos 2\varphi;$$

$$\cos^2 \nu \cdot \sin 2\psi = \cos \epsilon \cdot \sin 2\varphi;$$

$$\cos^2 \nu \cdot \cos 2\psi = \frac{1}{2} \cdot \sin^2 \epsilon + \frac{1}{2} \cdot (1 + \cos^2 \epsilon) \cdot \cos 2\varphi;$$

la formule (a) devient ainsi

$$\frac{3L}{2r^{3}} \cdot \left\{ \frac{\frac{1}{2} \cdot \cos^{2}\theta \cdot \sin^{2}\varepsilon + \frac{1}{4} \cdot (1 + \cos^{2}\varepsilon) \cdot \sin^{2}\theta - \frac{1}{3}}{-\frac{1}{2} \cdot (\cos^{2}\theta - \frac{1}{2} \cdot \sin^{2}\theta) \cdot \sin^{2}\varepsilon \cdot \cos 2\varphi} \right\} 
+ \frac{3L}{2r^{3}} \cdot \sin\theta \cdot \cos\theta \cdot \left\{ \frac{\sin\varepsilon \cdot \cos\varepsilon \cdot \sin(nt + \varpi)}{-\sin\varepsilon \cdot \frac{(1 + \cos\varepsilon)}{2} \cdot \sin(nt + \varpi - 2\varphi)} \right\} 
+ \sin\varepsilon \cdot \frac{(1 - \cos\varepsilon)}{2} \cdot \sin(nt + \varpi + 2\varphi) \right\} 
+ \sin^{2}\theta \cdot \left\{ \frac{\cos^{4}\frac{1}{2}\varepsilon \cdot \cos(2nt + 2\varpi - 2\varphi)}{2} \right\} 
+ \sin^{4}\theta \cdot \left\{ \frac{\cos^{4}\theta \cdot \sin^{4}\theta \cdot \cos(2nt + 2\varpi + 2\varphi)}{-\frac{1}{2} \cdot \sin^{2}\varepsilon \cdot \cos(2nt + 2\varpi)} \right\}$$

Si l'on ne considère dans les observations des marées, que l'excès d'une haute mer sur l'une des deux basses mers voisines; si, de plus, on prend ces excès en nombre égal dans les syzygies et dans les quadratures, des équinoxes du printemps, des équinoxes d'automne, des solstices d'été, et des solstices d'hiver; enfin, si pour detruire l'effet de la parallaxe lunaire, on considère les trois syzygies ou les trois quadratures les plus voisines de l'équinoxe ou du solstice, en doublant les observations relatives à la syzygie ou à la quadrature intermédiaire; les résultats de l'observation ne dépendront que des flux relatifs aux angles  $2nt + 2\varpi$ ,  $2nt + 2\varpi - 2\varphi$ ,  $2nt + 2\varpi + 2\varphi$ , flux dont la période est d'environ un demi-jour, et dont les deux premiers sont dans nos ports, beaucoup plus grands que tous les autres flux. Sin<sup>4</sup>  $\frac{1}{2}$  é étant une très petite fraction, on peut négliger le terme qu'elle multiplie. Alors, les flux partiels dont la période est d'environ un demi-jour, dépendent des termes

$$\frac{3L}{4r^3} \cdot \cos^4 \frac{1}{2} \varepsilon \cdot \sin^2 \theta \cdot \cos (2nt + 2\varpi - 2\varphi)$$
$$+ \frac{3L}{4r^3} \cdot \sin^2 \theta \cdot \frac{1}{2} \cdot \sin^2 \varepsilon \cdot \cos (2nt + 2\varpi).$$

Ces termes produisent, comme on l'a vu dans le n° 17 du Livre IV, deux flux partiels que l'on peut représenter par

$$\frac{A.L}{r^3} \cdot \cos^4 \frac{1}{z} \varepsilon \cdot \cos (2nt - 2mt + 2\varpi - 2\lambda)$$

$$+ \frac{B.L}{r^3} \cdot \frac{1}{z} \cdot \sin^2 \varepsilon \cdot \cos (2nt + 2\varpi - 2\gamma);$$
Mécan. cél.  $Tome\ V$ .

mt étant le moyen mouvement de l'astre L dans son orbite. A, B,  $\lambda$  et  $\gamma$  sont des constantes dépendantes des circonstances du port.

Ces deux flux sont les mêmes que ceux qui seraient produits par deux astres mus dans le plan de l'équateur, à la distance r du centre de la Terre, et dont le premier représenté par L. cos<sup>4</sup>½ ε, aurait le même mouvement moyen, que l'astre L dans son orbite, et passerait en même temps que lui par l'intersection de cette orbite avec l'équateur. Le second astre représenté par 1. L. sinº &, correspondrait constamment au point de cette intersection. Le maximum des hautes marées correspond à la conjonction ou à l'opposition des deux astres fictifs : alors la haute mer du premier coïncide avec celle du second. Le minimum des hautes marées, correspond aux quadratures de ces astres fictifs : alors la haute mer du premier coïncide avec la basse mer du second. Ce maximum et ce minimum donneront donc la valeur de la fraction  $\frac{A}{B}$ , et par conséquent le rapport des deux actions. Si cette fraction surpasse l'unité, l'action de l'astre L est augmentée par son mouvement propre mt dans son orbite, en vertu des circonstances accessoires : je nomme ainsi l'ensemble de toutes les causes qui modifient les marées dans un port. J'ai fait voir la possibilité de cette augmentation, dans le n° 18 du quatrième Livre.

Au moment de la coïncidence des hautes mers de deux astres fictifs, on a, en désignant par  $\pi$  la demi-circonférence,

$$2nt + 2\varpi - 2mt - 2\lambda = 2i\pi;$$

$$2nt + 2\varpi - 2\gamma = 2i'\pi;$$

i et i' étant des nombres entiers; ce qui donne pour le temps t de la coïncidence

 $nt+\varpi-mt$  est l'angle horaire de l'astre L, réduit en jours mesurés par les retours de cet astre au méridien, et il exprime l'heure de la coïncidence. Si, comme nous le supposerons dans la suite, l'astre L est le Soleil,  $\lambda$  sera l'heure de la haute marée solaire; et comme il y a deux marées chaque jour, nous supposerons que  $\lambda$  se rapporte à la pleine mer du soir; en sorte que les heures étant comptées de minuit,  $\lambda$  surpassera

la demi-circonférence. En désignant par T le temps de la conjonction ou de l'opposition des deux astres fictifs, on aura Gee deux flux sont les mêmes que ceux qui seraient pu

Terre, et dont le premier représente par L. cos : 63 aurait le nanob

Si y surpasse \(\lambda\), l'instant de la coïncidence des hautes mers suivra le moment de la conjonction ou de l'opposition des astres. C'est donc de la différence de ces deux constantes, différence qui tient aux circonstances du port, que dépend le retard du maximum des pleines mers sur ce moment. Ce retard serait très petit, si le mouvement de l'astre dans son orbite, était fort petit. Mais on verra dans la suite, qu'il est très sensible pour la Lune, dans le port de Brest où il s'élève à un jour et demi. Supposons maintenant que les lettres L, r, m, A,  $\epsilon$ ,  $\lambda$  et  $\gamma$ , se rap-

portent au Soleil, et marquons d'un trait pour la Lune, les mêmes lettres. On aura par l'action réunie de ces deux astres et en n'ayant égard qu'aux inégalités dont la période est d'environ un demi-jour, la hauteur de la mer au-dessus de son niveau, égale à

$$\frac{AL}{r^{3}} \cdot \cos^{4}\frac{1}{2}\varepsilon \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2mt - 2\lambda\right) \\
+ \frac{1}{2} \cdot \frac{BL}{r^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma\right) \\
+ \frac{A'L'}{r'^{3}} \cdot \cos^{4}\frac{1}{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2m't - 2\lambda'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos\left(2nt + 2\varpi - 2\gamma'\right) \\
+ \frac{BL'}{r'^{3}} \cdot \sin^{2}\varepsilon'$$

la constante B devant être la même à très peu près pour le Soleil et pour la Lune; parce que les angles 2nt-27, et 2nt-27' varient à très peu près de la même manière, vu la lenteur du mouvement des nœuds de l'orbe lunaire. y serait égal à y, si l'intersection de l'orbe lunaire avec l'équateur coïncidait avec l'équinoxe du printemps. En comptant les angles mt et m't de cet équinoxe, et désignant par d' l'ascension droite de l'intersection de l'orbe lunaire avec l'équateur, du soir ; en sorte que les heures diant comptées de minuit. A surpassern Les constantes A, A', B,  $\gamma$ ,  $\lambda$ ,  $\lambda'$ , ne peuvent être déterminées que par les observations; mais comme elles ne diffèrent d'un astre à l'autre, qu'à raison de la différence des moyens mouvemens de ces astres dans leurs orbites, différence toujours très petite relativement à nt ou au mouvement de rotation de la Terre; il est assez naturel de supposer que ces constantes varient d'un astre à l'autre, proportionnellement à la différence des moyens mouvemens; ainsi en désignant par x et  $\gamma$  deux constantes indéterminées, nous ferons

A = 
$$(1+mx)$$
. B, A' =  $(1+m'x)$ . B;  
 $\lambda = \gamma - my$ ,  $\lambda' = \gamma - m'y$ .

Les observations feront connaître jusqu'à quel point ces suppositions sont approchées.

Les deux plus grands termes de la fonction (A), étant ceux qui dépendent des cosinus des angles  $2nt + 2\varpi - 2mt - 2\lambda$ , et  $2nt + 2\varpi - 2m't - 2\lambda'$ ; ces cosinus doivent, au moment de la pleine mer, différer peu de l'unité; en faisant donc

$$nt + \varpi - mt - \lambda = i\pi + l,$$

$$nt + \varpi - m't - \lambda' = i'\pi + l';$$

i et i' étant des nombres entiers, on pourra supposer l et l' fort petits. Ces deux équations donnent

faisons
$$(b_{c}-m) \cdot t = (i'-i) \cdot \pi + \lambda' - \lambda + l' - l;$$
faisons
$$(b_{c}-Tmc) = t = T + t';$$

$$(b_{c}-Tmc) = t = T + t';$$

T étant le temps de la syzygie moyenne. Au moment de cette phase, les angles m'T et mT doivent être égaux, ou différer d'un nombre entier de demi-circonférences, en sorte que l'on a

$$(m'-m)\cdot T=i^n\pi$$
,

i" étant un nombre entier; on a donc, en observant que  $\lambda - \lambda'$  est égal à  $(m'-m) \cdot \gamma$ ,

$$-i''\pi - (m'-m)t' = (i'-i)\pi - (m'-m)\gamma + l'-l.$$

Les angles (m'-m)t', (m'-m)y, et l'-l étant peu considérables, on doit avoir i' égal à i'-i; en faisant donc a anomy sed an approprie de la considérable.

on aura

différence des moyens mouvemens ainsi en désignant par no'l isniA

$$\cos(2nt + 2\varpi - 2mt - 2\lambda) = \cos 2l$$
, so minimistation as the state  $\cos(2nt + 2\varpi - 2m't - 2\lambda') = \cos[2l - 2(m' - m) \cdot t'']$ .

 $\chi_m - \chi = \chi$ 

On a

$$\cos(2nt + 2\varpi - 2\gamma) = \cos(2nt + 2\varpi - 2mt - 2\lambda + 2mt + 2\lambda - 2\gamma)$$
$$= \cos(2l + 2mt - 2m\gamma).$$

Substituant pour mt, sa valeur mT + mt'' + my, on aura

$$\cos(2nt + 2\varpi - 2\gamma) = \cos(2mT + 2l + 2ml').$$

On trouvera pareillement and trasial as said ab use tradition and

$$\cos\left(2nt+2\varpi-2\gamma'\right)=\cos\left(2mT+2t+2mt''+2\delta'\right).$$

Cela posé, si l'on fait

$$a = \frac{AL}{r^3} \cdot \cos^4 \frac{1}{a} \varepsilon, \quad a' = \frac{A'L'}{r'^3} \cdot \cos^4 \frac{1}{a} \varepsilon';$$

$$b = \frac{1}{a} \cdot \frac{BL}{r^3} \cdot \sin^2 \varepsilon \cdot \cos 2mT + \frac{1}{a} \frac{BL'}{r'^3} \cdot \sin^2 \varepsilon' \cdot \cos (2mT - 2\delta');$$

$$h = \frac{1}{a} \cdot \frac{BL}{r^3} \cdot \sin^2 \varepsilon \cdot \sin 2mT + \frac{1}{a} \cdot \frac{BL'}{r'^3} \cdot \sin^2 \varepsilon' \cdot \sin (2mT - 2\delta');$$

l'expression (A) de la hauteur de la mer, deviendra au moment de la pleine mer, en la réduisant en série par rapport aux puissances de l, l-(m'-m)t'', l+mt'', et en négligeant seulement les produits de quatre dimensions de ces quantités, et les produits des troisièmes puissances de l+mt'', par  $\sin^2 \varepsilon$ , et  $\sin^2 \varepsilon'$ ;

$$a(1-2l^{2})+a'\{1-2[l-(m'-m)t'']^{2}\}$$

$$+b[1-2(l+mt'')^{2}]-2h(l+mt''); (B).$$

Aux instans de la haute et de la basse mer, cette fonction est à son

maximum et à son minimum; sa différentielle prise par rapport au temps t, est donc nulle. On ne doit y faire varier que l et t', le temps T de la syzygie devant être supposé constant; et alors on a

$$dl = (n-m)dt, dt'' = dt;$$

on a donc

$$o = -4al(n-m) - 4a'l(n+m') + 4a'(n-m') \cdot (m'-m)t''$$
ce qui donne ambourgement el such inesiuborini seringem xuel se

$$l = \frac{(n-m') \cdot a' \cdot (m'-m)t'' - nmbt'' - \frac{1}{2}nh}{(n-m) \cdot a + (n-m') \cdot a' + nb},$$

$$l - (m'-m) \cdot t'' = -\frac{[(n-m) \cdot a + nb] \cdot (m'-m) \cdot t'' - nmbt'' - \frac{1}{2}nh}{(n-m) \cdot a + (n-m') \cdot a' + nb},$$

$$l + mt'' = \frac{(n-m') \cdot a' \cdot (m'-m)t'' + [(n-m)a + (n-m')a'] \cdot mt'' - \frac{1}{2}nh}{(n-m) \cdot a + (n-m')a' + nb}.$$

La fonction (B) donnera ainsi cette expression fort approchée de la hauteur de la pleine mer,

$$a + a' + b - \frac{h^{2}}{2 \cdot (a + a' + b)} - \frac{2ha'(m' - m)t''}{a + a' + b},$$

$$- \frac{2a' \left[ a + b \cdot \frac{(m' + m)}{m' - m} \right]}{a + a' + b} \cdot (m' - m)^{2} \cdot t''^{2}.$$

On peut dans l'ensemble d'un grand nombre de syzygies, supposer le terme de la mer de la m

$$\frac{2ha'(m'-m)t''}{4ma+a'+ba} = \frac{18}{1200} (xim+1)$$

alternativement positif et négatif, en sorte que la somme de ses diverses valeurs soit nulle et puisse être négligée : cela est d'autant plus permis, que ce terme est fort petit, l'un des deux termes de son expression étant multiplié par sine, et l'autre étant multiplié par sine. De plus, ayant négligé les termes qui ont pour facteur sin4. 1 6, nous pouvons à plus forte raison, négliger le terme  $\frac{-h^2}{2(a+a'+b)}$ ; la formule précédente de-

vient ainsi 
$$a + a' + b = \frac{2a'(a+b.\frac{m'+m}{m'-m})}{a+a'+b'} \cdot (m'-m)^2 \cdot t''^2;$$

3. Introduisons présentement les inégalités du mouvement et de la distance des astres, dans l'expression de la hauteur des marées. Pour cela, développons le terme de la fonction (b) du n° 2, rapportée à la Lune,

 $\frac{3L'}{4r'^3}\sin^2\theta \cdot \cos^4\frac{1}{2}\varepsilon' \cdot \cos(2nt + 2\varpi - 2\varphi').$ 

Soit  $f \cdot \sin(st + \theta')$  une des inégalités du mouvement lunaire, et  $h \cdot \cos(st + \theta')$  l'inégalité correspondante du rayon vecteur r' de la Lune; ces deux inégalités introduisent dans le terme précédent, les termes

$$\frac{3L'}{4\overline{t'^3}} \cdot \sin^2\theta \cdot \cos^4\frac{1}{2}\epsilon' \cdot \left[ \frac{(f-\frac{3}{2}h) \cdot \cos(2nt+2\varpi-2m't-st-\theta')}{-(\frac{3}{2}h+f) \cdot \cos(2nt+2\varpi-2m't+st+\theta')} \right]$$

 $\overline{r'}$  étant la moyenne distance de la Lune à la Terre. Ces termes donnent naissance à deux flux partiels que l'on peut considérer comme produits par l'action de deux astres mus uniformément dans le plan de l'équateur, à la distance  $\overline{r'}$ , et dont les masses sont respectivement

L'. 
$$\cos^4 \frac{1}{2} \epsilon \cdot (f - \frac{3}{2}h)$$
, L'.  $\cos^4 \frac{1}{2} \epsilon' \cdot (\frac{3}{2}h + f)$ ;

leurs moyens mouvemens étant  $\left(m'+\frac{s}{2}\right)$ . t, et  $\left(m'-\frac{s}{2}\right)$ . t. On a vu précédemment que le terme

$$\frac{3 \, \mathrm{L'}}{4 \overline{t'}^3} \cdot \cos^4 \frac{1}{2} \varepsilon' \cdot \sin^2 \theta \cdot \cos \left(2nt + 2\varpi - 2m't\right)$$

produit dans l'expression de la hauteur de la mer, le terme

$$(1+m'x) \cdot \frac{BL'}{r'^3} \cdot \cos^4 \frac{i}{2} \varepsilon' \cdot \cos(2nt + 2\varpi - 2m't + 2m'\gamma - 2\gamma).$$

Il est facile d'en conclure que les termes dus à l'action des astres supposés, produisent dans cette expression, les termes

$$\begin{bmatrix}
1 + \left(m' + \frac{s}{2}\right)x \end{bmatrix} \cdot \frac{BL'}{\overline{r'^3}} \cdot \cos^4\frac{1}{2}\varepsilon' \cdot \left(f - \frac{3}{2}h\right) \times \\
\cos\left[2nt + 2\varpi - 2m't - st - \theta' - 2\gamma + 2\left(m' + \frac{s}{2}\right)\gamma\right] \\
- \left[1 + \left(m' - \frac{s}{2}\right)x\right] \cdot \frac{BL'}{\overline{r'^3}} \cdot \cos^4\frac{1}{2}\varepsilon' \cdot \left(f + \frac{3}{2}h\right) \times \\
\cos\left[2nt + 2\varpi - 2m't + st + \theta' - 2\gamma + 2\left(m' - \frac{s}{2}\right)\gamma\right].$$

Nous avons supposé, au moment de la haute mer,

$$nt - m't + \varpi - \gamma + m'y = i'\pi + l';$$

i' étant un nombre entier.

Les deux termes précédens deviennent ainsi

$$\left[1 + \left(m' + \frac{s}{2}\right)x\right] \cdot \frac{BL'}{r'^3} \cdot \cos^4\frac{1}{2}\varepsilon' \cdot (f - \frac{3}{2}h)\cos(2l' - st - \theta' + sy)$$

$$-\left[1 + \left(m' - \frac{s}{2}\right)x\right] \cdot \frac{BL'}{r'^3} \cdot \cos^4\frac{1}{2}\varepsilon' \cdot (f + \frac{3}{2}h)\cos(2l' + st + \theta' - sy).$$

On a par ce qui précède

$$t = T + y + t'';$$

ce qui réduit les deux termes précédens à ceux-ci,

$$\left[ 1 + \left( m' + \frac{s}{2} \right) x \right] \cdot \frac{BL'}{\overline{r'^3}} \cdot \cos^4 \frac{1}{2} \varepsilon' \cdot (f - \frac{3}{2} h) \cos (sT + \theta' + st'' - 2l'),$$

$$- \left[ 1 + \left( m' - \frac{s}{2} \right) x \right] \cdot \frac{BL'}{\overline{r'^3}} \cdot \cos^4 \frac{1}{2} \varepsilon' \cdot (f + \frac{3}{2} h) \cos (sT + \theta' + st'' + 2l'),$$

Ces deux termes développés en séries, ajouteront donc à l'expression (B) de la hauteur des marées, la quantité

$$-a'\left(3h - \frac{fsx}{1 + m'x}\right)\cos(sT + \theta')$$

$$+a'st''\left(3h - \frac{fsx}{1 + m'x}\right)\sin(sT + \theta')$$

$$+4a'l'\left[f - \frac{3hsx}{4(1 + m'x)}\right]\sin(sT + \theta')$$

$$+a'\left[\frac{3h}{2} - \frac{fsx}{2(1 + m'x)}\right](s^{a}t''^{a} + 4l'^{a})\cos(sT + \theta')$$

$$+4a'\left[f - \frac{3hsx}{4(1 + m'x)}\right]st''^{l}l'\cdot\cos(st + \theta').$$

La différentielle de cette quantité, prise par rapport au temps t, et divisée par dt, doit être ajoutée au second membre de l'équation (C) du numéro précédent, pour avoir l'instant de la haute mer. On peut dans la différenciation, ne faire varier que l', et supposer dl' = ndt, à cause

de la petitesse de m' et de s, relativement à n. On aura ainsi pour la différentielle de la quantité, divisée par dt,

$$4a'n \left[ f - \frac{3hsx}{4(1+m'x)} \right] \sin(sT + \theta')$$

$$+ 4a'nl' \left( 3h - \frac{fsx}{1+mx'} \right) \cos(sT + \theta')$$

$$+ 4a'nst'' \left[ f - \frac{3hsx}{4(1+m'x)} \right] \cos(sT + \theta').$$

Nous pouvons supposer que dans l'ensemble d'un grand nombre d'observations, les valeurs de  $\sin(sT+\theta')$ , ont été alternativement positives et négatives, en sorte que leur somme soit nulle à fort peu près. En nommant 4X, la somme des deux derniers termes de la quantité précédente, on voit qu'ils ajoutent aux numérateurs des valeurs de l,  $l-(m'-m) \cdot l''$ , et l+ml'', données dans le numéro précédent, la quantité X, et qu'en négligeant le carré de X, et le produit hX, cette quantité disparaîtra de l'expression (B) de la hauteur de la marée. Mais il faut ajouter à cette expression, et par conséquent à l'expression (D) de la même hauteur, la quantité

$$-a'\left(3h - \frac{fsx}{1 + m'x}\right)\cos(sT + \theta') + \frac{1}{2}a'\left(3h - \frac{fsx}{1 + m'x}\right) \cdot (s^{2}t''^{2} + 4l'^{2})\cos(sT + \theta') + 4a'\left[f - \frac{3hsx}{4 \cdot (1 + m'x)}\right]l'st'' \cdot \cos(sT + \theta').$$

Le terme

$$\frac{3L'}{8r'^3} \cdot \sin^2\theta \cdot \sin^2\epsilon' \cdot \cos(2nt + 2\varpi - 2\delta)$$

de la fonction (b) transportée à la Lune, produit les deux suivans :

$$-\frac{3}{4} \cdot \frac{BL'}{r^{3}} \cdot \sin^{2} \epsilon' \cdot h \cdot \left[ \frac{\left(1 + \frac{sx}{2}\right) \cos(2nt + 2\varpi - st - \theta' - 2\gamma + s\gamma - 2\delta)}{+\left(1 - \frac{sx}{2}\right) \cos(2nt + 2\varpi + st + \theta' - 2\gamma - s\gamma - 2\delta)} \right]$$

MÉCAN. CÉL. Tome V.

En substituant pour B sa valeur  $\frac{A'}{1+m'x}$ , pour  $\sin^2 \epsilon'$ ,  $4 \cdot \sin^2 \frac{1}{2} \epsilon' \cdot \cos^2 \frac{1}{2} \epsilon'$ , et a' pour  $\frac{A'L' \cdot \cos^4 \frac{1}{2} \epsilon'}{r^{73}}$ , ces deux termes deviennent

$$-\frac{3a'h \cdot \tan^{2\frac{1}{2}\epsilon'}}{1+m'x} \left[ \begin{array}{c} \left(1+\frac{sx}{2}\right)\cos(2nt+2\varpi-st+sy-\theta'-2\gamma-2\delta') \\ +\left(1-\frac{sx}{2}\right)\cos(2nt+2\varpi+st+\theta'-2\gamma-sy-2\delta') \end{array} \right].$$

On trouvera par l'analyse précédente, en supposant nulles dans l'ensemble des observations, les moyennes de  $\sin(sT + \theta')$ ,  $\sin(2m'T - 2\gamma)$ , et de leurs produits, qu'ils ajoutent à l'expression (D) de la hauteur de la pleine mer, la quantité

$$\frac{-6a'h \cdot \tan^{\frac{3}{2}\frac{1}{2}\epsilon'} \cdot \cos(2m'T - 2\delta)\cos(sT + \theta') \cdot \left\{1 - \left[\frac{s^2t''^2 + 4(l' + m't'')^2}{2}\right]\right\};}{+ sx \cdot st''(l' + m'i'')};$$

l'expression de la hauteur de la pleine mer devient ainsi

$$a + a' + b + 2a' \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} a + \frac{b(m' + m)}{m' - m} \end{bmatrix} \cdot (m' - m)^{a} t'^{la}}_{a + a' + b}$$

$$- \sum a' \cdot \cos(sT - \theta') \begin{cases} 3h - \frac{f sx}{1 + m'x} \cdot \frac{6h \cdot \tan g^{a} \frac{1}{2} \epsilon'}{1 + m'x} \cdot \cos(2m'T - 2\delta') \\ - \frac{1}{2} \underbrace{\begin{bmatrix} 3h - \frac{f sx}{1 + m'x} \end{bmatrix} \cdot (s^{2} t'^{la} + 4l^{la})}_{f \cdot h \cdot \tan g^{a} \frac{1}{2} \epsilon'} \end{cases}; (M)$$

$$- 4 \underbrace{\begin{bmatrix} f - \frac{3h sx}{4(1 + m'x)} \end{bmatrix} s t'^{l} l'}_{2h \cdot \tan g^{a} \frac{1}{2} \epsilon'} \cdot \cos(2m'T - 2\delta') \underbrace{\begin{bmatrix} s^{2} t'^{la} + 4(l' + m't'') s t'' \\ -2sx(l' + m't'') s t'' \end{bmatrix}}_{-2sx(l' + m't'') s t''} \end{cases}$$

le signe intégral  $\Sigma$  embrassant tous les termes semblables relatifs aux diverses inégalités de la Lune.

On a par ce qui précède, au moment de la pleine mer,

de la lonciton (4) The develop syrigides, etclient resident gambans: les quadratures, en mul; 
$$l+\pi i = \kappa - m + m$$

il est facile d'en conclure que la valeur de l, réduite en temps, à raison de la circonférence entière pour un jour, exprime le retard des marées. On trouvera par l'analyse précédente, qu'en désignant par  $\alpha$  la partie

de l'expression de la hauteur des marées, indépendante de l' et de t', on aura

$$l = (m'-m)t''a' - \sum \cos(sT+b') \begin{cases} 3h - \frac{f sx}{(1+m'x)} & \text{if } Ac \end{cases}$$

$$\frac{3h - \frac{f sx}{(1+m'x)}}{(1+m'x)} & \text{if } Ac \end{cases}$$

$$\frac{3h \cdot \tan^{2\frac{1}{2}\epsilon} \cdot \cos(2m'T-2\delta)}{(1+m'x)(m'-m)t''} & \frac{2mt''}{-\frac{1}{2}sx \cdot st'')}$$

$$\frac{3h \cdot \tan^{2\frac{1}{2}\epsilon} \cdot \cos(2m'T-2\delta)}{(1+m'x)(m'-m)t''} & \frac{1}{-\frac{1}{2}sx \cdot st''}$$

On fera entrer par la même analyse, les inégalités du mouvement solaire, dans les expressions de la hauteur et du retard des marées.

Parmi les inégalités lunaires, celle que l'on nomme variation augmente dans les syzygies, la parallaxe de la Lune et sa vitesse angulaire, de quantités constantes : elle les diminue des mêmes quantités, dans les quadratures. Relativement à cette inégalité, s est égal à 2(m'-m); et dans les syzygies, le cosinus de 2(m'-m)T, est l'unité : il est — i dans les quadratures. La théorie lunaire donne par rapport à cette inégalité, 3h = -0.02334, et f = 0.01. De plus, on verra dans la suite que m'x est à fort peu près égal à 1, en sorte que l'on peut supposer, en négligeant la valeur de m,

ce qui donne

$$3h - \frac{fsx}{1 + m'x} = -0.02734.$$

On peut, vu la petitesse de tang<sup>2</sup>  $\frac{1}{2}\epsilon'$ , substituer sans erreur sensible, - 0,02734, au lieu de 3h, dans le facteur de cette quantité; on aura donc égard à l'inégalité de la variation, dans la valeur de a, en multipliant L' par 1,02734 dans les syzygies, et l'on y aura égard dans les quadratures, en multipliant L' par 0,97266.

3. Soit p le carré du cosinus de la déclinaison du Soleil, à l'instant de la syzygie; on aura par le nº 2

en négligeant donc comme nous l'avons fait, sin<sup>4</sup> ½ ε; on aura

O to H oup to 
$$2A \cdot \frac{L}{r^3} \cdot \cos^4 \frac{1}{2} \varepsilon + B \cdot \sin^4 \varepsilon \cdot \frac{L}{r^3} \cdot \cos 2m$$
 T so the senting in the senting  $\frac{L}{r^3} \cdot \cos^4 \frac{1}{2} \varepsilon + \frac{L}{r^3} \cdot \sin^4 \varepsilon \cdot \frac{L}{r^3} \cdot \cos 2m$  T so the senting  $\frac{L}{r^3} \cdot \cos 2m$  T. Since  $\frac{$ 

En nommant pareillement p' le carré du cosinus de la déclinaison de la Lune à l'instant de la syzygie, on aura

$$2A' \cdot \frac{L'}{r^3} \cdot \cos^4 \frac{1}{2} \epsilon' + B \cdot \sin^2 \epsilon' \cdot \frac{L'}{r^3} \cdot \cos(2m'T - 2\delta')$$

$$= 2A' \cdot \frac{L'}{r^3} \cdot p' - (A' - B) \sin^2 \epsilon' \cdot \frac{L'}{r^3} \cdot \cos(2m'T - 2\delta').$$

Dans les syzygies des solstices, mT et m'T sont à peu près égaux à  $\frac{1}{2}$   $\pi$ . En désignant alors par  $\frac{1}{4}\pi + mT'$ , et  $\frac{1}{4}\pi + m'T'$  les angles mT et m'T, ce qui revient à compter du solstice, les arcs mT' et m'T'; a etantice que devidue a store les syrges sets quales or. De

$$\cos 2mT = -\cos 2mT'; \cos (2m'T - 2\delta') = -\cos (2m'T' - 2\delta');$$

en désignant donc par q et q' les carrés des cosinus des déclinaisons solaires et lunaires à l'instant de la syzygie solsticiale, on aura

On peut supposer dans l'ensemble d'un grand nombre de syzygies, que la somme des cosinus de 2mT est égale à la somme des cosinus de 2m'T', et que la somme des cosinus de  $2m'T - 2\delta$  est égale à la somme des cosinus de  $2m'T' - 2\delta$ ; parce que ces cosinus diffèrent peu de l'unité, et que d'ailleurs ils sont multipliés par les facteurs très petits  $(A - B) \cdot \sin^2 \varepsilon$ , et  $(A' - B) \cdot \sin^2 \varepsilon'$ . En supposant donc que P et Q expriment les sommes des carrés des cosinus des déclinaisons du Soleil; aux instans des syzygies équinoxiales et solsticiales, et que P' et Q' expriment les mêmes sommes pour la Lune; on aura en ne considérant que l'inégalité lunaire de la variation, pour un nombre i, de syzygies équinoxiales

al sh nominal 
$$2i\alpha = 2A \cdot \frac{L}{r^3}$$
.  $P + 2A' \cdot 1,02734 \cdot \frac{L'}{r^3}$ .  $P'$  is a mannon of stress no supervised she be traden't a small  $-(A-B) \cdot \frac{L}{r^3}(P-Q) - (A'-B) \cdot 1,02734 \cdot \frac{L'}{r^3}(P'-Q')$ :

(be  $-L$  mg)  $= 2A \cdot \frac{L}{r^3} \cdot \frac{L'}{r^3} \cdot \frac$ 

et pour le même nombre i de syzygies solsticiales, on aura

$$2i\alpha' = 2A \cdot \frac{L}{r^3} \cdot Q + 2A' \cdot 1,02734 \cdot \frac{L'}{r'^3} \cdot Q'$$

$$+ (A - B) \cdot \frac{L}{r^3} (P - Q) + (A' - B) \cdot 1,02734 \cdot \frac{L'}{r^3} (P' - Q'),$$

a' étant ce que devient a dans les syzygies solsticiales.

La hauteur de la pleine mer syzygie, donnée par la formule (M) du n° précédent, étant de la forme  $\alpha - \beta t''^2$ , il est clair que la basse mer syzygie sera  $-\alpha + \beta t''^2$ ; ce qui revient à changer L et L' dans - L et - L'. Dans les quadratures, la basse mer solaire coıncide avec la haute mer lunaire. De là il suit que si l'on désigne par P<sub>1</sub> et Q<sub>1</sub> les sommes des carrés des cosinus des déclinaisons du Soleil dans les quadratures équinoxiales et solsticiales; si l'on désigne par Q'<sub>1</sub> et P'<sub>1</sub> la somme des carrés des cosinus des déclinaisons de la Lune dans les mêmes quadratures; enfin, si l'on désigne par  $\alpha''$  et  $\alpha'''$  ce que deviennent  $\alpha$ 

a' dans les quadratures; on aura pour i quadratures équinoxiales, en n'ayant égard qu'à l'inégalité de la variation,

$$2i\alpha'' = 2A' \cdot 0.97266 \cdot \frac{L'}{r'^3} Q'_1 - 2A \cdot \frac{L}{r^3} \cdot P_1$$

$$+ (A' - B) \cdot 0.97266 \cdot \frac{L'}{r'^3} (P'_1 - Q'_1) + (A - B) \cdot \frac{L}{r^3} (P_1 - Q_1),$$

et pour i quadratures solsticiales, on aura con sumos al sup to T'me

Dans le calcul des valeurs de  $\mathcal{C}t''^2$ , et l données par les formules (M) et (N), on fera pour les i syzygies équinoxiales

$$\cos^{4}\frac{1}{2}\varepsilon = \frac{P+Q}{2i}; \cos^{4}\frac{1}{2}\varepsilon' = \frac{P'+Q'}{2i};$$

$$\sin^{2}\varepsilon \cdot \cos 2mT = \frac{P-Q}{i}; \sin^{2}\varepsilon' \cdot \cos(2m'T-2\delta') \Rightarrow \frac{P'-Q'}{i};$$

$$\tan^{2}\frac{1}{2}\varepsilon' \cdot \cos(2m'T-2\delta') = \frac{1}{2}\cdot \frac{(P'-Q')}{P'+Q'};$$

Il faut, dans les syzygies solsticiales, changer les signes des seconds membres des trois dernières équations.

Dans les quadratures, il faut changer L en - L, et faire

$$\cos^{4}\frac{1}{a}\varepsilon = \frac{P_{1} + Q_{1}}{2i}; \cos^{4}\frac{1}{a}\varepsilon' = \frac{P'_{1} + Q'_{1}}{2i}.$$

tunes of wind violes il fout force less than the second of the second of

Dans les quadratures équinoxiales, il faut faire qual el meture al

$$\sin^{2}\epsilon \cdot \cos 2mT = \frac{P_{1} - Q_{1}}{i}; \sin^{2}\epsilon' \cos(2m'T + 2\delta') = \frac{Q'_{1} - P'_{1}}{i};$$

$$\tan g^{2}\frac{1}{2}\epsilon' \cdot \cos(2m'T - 2\delta'^{2}) = \frac{1}{2}\frac{(Q'_{1} - P'_{1})}{P'_{1} - Q'_{1}}.$$

Dans les quadratures solsticiales, il faut changer les signes des seconds membres de ces trois dernières équations.

wise mer at (Ann B) of 19 3061 Live que la survent (A an) Live and the survent (B of the land out to survent (B of the land ou

On a pris dans les syzygies, l'exces de la bauta m

## CHAPITRE III.

Comparaison de l'analyse précédente avec les observations des hauteurs des marées dont la période est d'environ un demi-jour.

4. On a considéré les syzygies équinoxiales suivantes :

#### TABLE I.

Des Hauteurs des Marées.

J'ai considéré les	syzygies équ	uinoxiales suiva	ntes:	112.11 2181 112.11 2181 100.01 0181
1807 9 mars 1808 12 1809 2 1810 5 1811 10 1812 13 1813 2 1814 6 1815 11 1816 13 1817 3 1818 7 1819 11 1820 29 février 1821 4	23 mars 27 15 21 24 27 17 21 25 28 17 22 25 14 18 23	10 31 mars 4 avril 1 8 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 17 20 20 24 3 3 29 18	ept. 1 er octobre. 4 9 12 2 5 10 13 2 6 10 30 septemb. 3 octobre. 7 4 30 septemb.

On a pris dans les syzygies, l'excès de la haute mer du soir sur la basse mer du matin, relatif au jour qui précède la syzygie, au jour même de la syzygie, et aux quatre jours qui la suivent. On a fait, pour chaque année, une somme des excès relatifs à chacun de ces jours, en doublant les résultats correspondans à la syzygie la plus voisine de l'équinoxe, et qui est la moyenne des trois syzygies considérées dans chaque équinoxe. On a obtenu ainsi les résultats suivans exprimés en mètres:

TABLE II.

# Syzygies équinoxiales. Sado silquilum no La

1 20-	(-1)	(0)	(+1)	(+2)	(+3)	(+4)
1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822	44,425 44,740 44,495 46,300 44,205 43,527 45,330 44,211 43,997 43,730 43,730 43,758 45,028 44,265 44,453	49,020 49,155 48,520 49,711 49,030 48,446 49,069 48,651 48,768 48,350 48,250 48,260 48,260 48,260 48,360 48,260 48,360 48,360 48,360 48,360 48,360 48,605 48,605 48,605 48,605 48,605 48,605 48,605 48,605 48,605 48,605 48,605 48,605 48,605	51,460 51,120 50,910 51,740 51,290 51,348 51,041 50,551 51,852 51,380 50,630 50,592 51,857 50,660 50,777 817,538 = f"	50,720 51,060 51,135 50,275 51,100 51,630 50,804 50,705 50,917 51,370 50,580 50,250 50,281 51,446 49,630 49,983 811,886 = f'''	48,830 48,495 49,305 47,711 48,860 49,619 47,928 48,465 48,465 48,641 49,000 48,560 48,802 48,639 48,815 47,759 778,429 = f <sup>1</sup>	45,070 43,910 44,910 43,079 43,850 46,015 43,466 44,707 43,857 44,180 44,290 43,640 43,316 43,860 42,107 42,640 702,897 = f

 $f, f', f'', f''', f^{"}, f^{"}$ , sont les sommes des hauteurs relatives à chacun des six jours. Si l'on désigne la loi de ces sommes par

$$\zeta \cdot t^2 + \zeta' t + \zeta''$$

t étant le temps écoulé depuis la haute mer du soir du jour qui précède la syzygie, l'intervalle de deux marées consécutives du soir étant pris pour unité, on aura les six équations de conditions suivantes :

Si l'on multiplie chacune de ces équations respectivement par les coefficiens de  $\zeta$ , et que l'on fasse la somme des produits; si l'on fait des sommes semblables relativement aux coefficiens de  $\zeta'$  et  $\zeta''$ ; ces trois sommes donneront les équations suivantes:

979.
$$\zeta + 225.\zeta' + 55.\zeta'' = f' + 4f'' + 9f''' + 16f^{17} + 25.\int^{7},$$
  
 $225.\zeta + 55.\zeta' + 15.\zeta'' = f' + 2f'' + 3f''' + 4f^{17} + 5.f^{7},$   
 $55.\zeta + 15.\zeta' + 6.\zeta'' = f + f' + f'' + f''' + f^{17} + f^{7}$ 

Ces équations donnent

$$\zeta = \frac{10(f + f^{\text{v}} - f^{\text{u}} - f^{\text{u}}) + 2(f^{\text{u}} + f^{\text{u}} - f' - f^{\text{v}})}{112},$$

$$\zeta' = \frac{5(f^{\text{v}} - f') + 3(f^{\text{v}} - f') + f^{\text{u}} - f^{\text{u}}}{35} - 5\zeta,$$

$$\zeta'' = \frac{f + f' + f'' + f^{\text{u}} + f^{\text{v}} + f^{\text{v}}}{6} - \frac{5}{2} \cdot \zeta' - \frac{55}{6} \cdot \zeta.$$

Maintenant on a, le mètre étant pris pour unité,

$$f = 709,944, f' = 779,987, f'' = 817,538,$$
  
 $f''' = 811,886, f'' = 778,429, f' = 702,897.$ 

On trouve ainsi

$$\zeta = -18,06977,$$
 $\zeta' = 89,04719,$ 
 $\zeta'' = 809,8021.$ 

L'expression

$$\zeta \cdot t^2 + \zeta' \cdot t + \zeta''$$
 ou  $\zeta'' - \frac{\zeta'^2}{4\zeta} + \zeta \left(t + \frac{\zeta'}{2\zeta}\right)^2$ ,

des valeurs de f, f', f'', etc., devient ratio de la se no de la constant de la constant

$$819,5070 - 18,06977 \cdot (t - 2,46398)^{2}$$
.

Exprimons par t' la distance d'une haute marée du soir à l'instant Mécan. Cél. Tome V.

de la syzygie, t' étant supposé positif pour les marées qui suivent la syzygie. Soit y une constante arbitraire, dont nous disposerons de manière que  $\alpha - \delta (t'-\gamma)^2$  représente cette haute marée. La basse marée qui la précède, sera, comme on l'a vu d'après la loi de la pesanteur universelle,  $-\alpha + 6 (t' - \gamma - \frac{1}{4})^2$ . L'excès de la haute mer sur cette 

Ainsi, en nommant i le nombre des syzygies employées pour former les valeurs de f, f', f'', etc., l'expression générale des sommes de ces valeurs sera

 $2i\alpha - \frac{i6}{32} - 2i6(t' - y - \frac{1}{8})^2$  (a)

Désignons par k la moyenne des quantités dont les syzygies ont précédé, dans les observations précédentes, les instans des hautes marées du soir des jours mêmes des syzygies; on aura

$$t'-y=t-1+k-y$$
. The analysis and the since the since the sum of the second sec

La formule (a) devient ainsi

$$2i\alpha - \frac{2i6}{64} - 2i6(t - \frac{9}{8} + k - y)^{2}$$
.

Cette formule doit coincider avec l'expression

$$\zeta'' - \frac{\zeta'^2}{4\zeta} + \zeta \left(t + \frac{\zeta'}{2\zeta}\right)^2; \quad (b)$$

on a donc

ce qui donne

En substituant les valeurs précédentes de \( \zeta \) et de \( \zeta \), on a

$$y = 1,33898 + k$$
.

Dans les syzygies précédentes, le retard journalier des marées a été 0,026136. On a ainsi, en parties du jour solaire,

$$= 1,37398 = 1,$$

La valeur moyenne k, dont les syzygies ont précédé les marées du

soir, est o',10615. On a ainsi un litter de sonque insla de seguire si

des hautes marces

récède la syzygie,

La comparaison des expressions (a) et (b) donne

only erseller — 
$$3i\alpha = 8i9,7895$$
,  $3i\alpha = 8i9,7895$ ,  $3i\alpha = 8i9,78$ 

i étant égal à 128, parce que l'on a employé 128 syzygies, en comptant pour deux, chaque syzygie intermédiaire dont on a doublé les résultats.

Pour que l'on puisse apprécier la régularité des observations des marées faites dans le port de Brest, on a déterminé, comme ci-dessus, les valeurs de 2ia et de 2ib pour chacune des seize années, et, comme le nombre des observations de chaque année n'est qu'un seizième du nombre total des observations que nous venons d'employer, on a multiplié les divers résultats par seize, pour les comparer aux précédens. On a formé ainsi la table suivante:

TABLE III.

Valeurs de 216 et de 210 conclues des marées équinoxiales syzygies.

o tem.	216.	2ia.
1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821	16,884 18,034 16,851 16,739 19,193 17,676 17,256 16,443 19,776 19,300 17,712 18,069 18,614 19,194 19,200 18,200	821,585 822,271 820,878 820,992 825,188 827,212 818,212 814,340 826,075 825,287 815,962 811,234 814,466 828,424 814,194 810,998
77 77	18,0714	819,8320

in Oboneait, com

Le peu de différence de ces valeurs de 2i6 et de 2ia à leurs moyennes, montre la régularité des marées dans le port de Brest; ces écarts ayant été rendus seize fois plus grands, en vertu de leur multiplication par seize.

5. On a considéré de la même manière les syzygies solsticiales suivantes, qui correspondent aux mêmes années.

TABLE IV.

1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823	6 juin. 13 janv. 1 janv. 5 9 14 2 6 10 15 3 6 11 10 juin. 4 7 12	20 juin.  8 13 3 6 9 14 3 7 10 30 mai. 3 juin. 8 26 31 mai. 4 juin.	5 juill. 24 juin. 27 17 20 24 28 17 21 25 14 18 22 10 juill. 15 juin.	15 déc. 7 juill. 12 16 8 13 2 6 9 28 juin. 3 juill. 7 5 déc. 29 juin. 4 juill.	29 déc. 3 déc. 7 10 15 4 7 11 16 4 8 12 19 9	17 déc. 21 mon 26 29 18 22 26 30 18 23 27 17 31 " 24 28 mmod
--	--	---	---	--	---	--

On a fait, comme ci-dessus, les sommes des excès des hautes marées du soir sur les basses mers du matin du jour qui précède la syzygie, du jour même de la syzygie, et des quatre jours qui la suivent, en doublant les résultats relatifs à la syzygie intermédiaire dans chaque solstice. On a obtenu ainsi les résultats suivans:

Le peu de différence de ces valeurs de 216 et de 212 à leurs moyennes nontre la régularité des marées la HATEL de Brest; ces écarts ayant

## ne rendus seize tois plus erands solsticiales. Syzygies solsticiales.

	(-1)	aée(o)	mé(spayan	x(+2)9b	u-(H-3)00	in(+4)†n
1807	41,030	43,040	44,745	45,545	43,830 44,875	41,575
1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821	41,365 41,195 40,695 42,058 41,733 40,380 40,045 40,830 39,440 39,474 39,457 38,320 39,220 38,194	44,260 44,140 45,481 44,163 44,759 44,867 43,665 43,043 42,720 42,720 42,400 41,030 40,990 42,130 41,824	46,075 46,885 46,623 45,159 45,932 45,767 45,129 44,090 44,380 43,575 42,733 42,222 42,160 43,357	45,920 45,945 46,487 45,736 45,478 44,845 45,050 44,834 43,850 43,880 44,145 42,325 42,454 41,825 43,524	44,679 45,610 45,425 45,219 43,474 43,302 44,017 43,289 41,640 41,910 42,048 41,268 41,268 41,255 42,532	42,535 43,334 41,242 43,284 40,904 39,784 41,264 40,867 39,620 40,120 39,468 38,261 39,029 38,055 39,470
Somm.	645,358	690,902	714,592	712,843	690,872	648,792

#### L'ensemble de ces hauteurs donne

$$f = 645,358, f' = 690,902, f'' = 714,592,$$
  
 $f''' = 712,843, f'' = 690,872, f' = 648,792.$ 

#### On trouve ainsi

$$\zeta = -11,08513,$$
 $\zeta' = 55,86375,$ 
 $\zeta'' = 645,84780.$ 

olstice On a obtenu ainsi les résultats suivans

L'expression 
$$\zeta'' - \frac{\zeta'^2}{4\zeta} + \zeta(t + \frac{\zeta}{2\zeta})$$
 des valeurs de  $f$ ,  $f'$ , etc., devient  $716,2293 - 11,08515(t - 2,51976)^2$ ;

### MÉCANIQUE CÉLESTE,

d'où l'on tire comme dans le n° précédent,

$$2i\alpha' = 716,40250$$
,  $2i\delta' = 11,08515$ .

On a, comme dans le même nº,

$$\frac{\zeta'}{2\zeta} = -\frac{9}{3} + k - \gamma;$$

ce qui donne

$$y = 1,39476 + k.$$

Dans les syzygies des solstices, le retard journalier des marées a été 0',028376; en sorte que l'intervalle pris pour unité est ici 1',028376. On a ainsi, en parties du jour solaire,

$$1,39476 = 1^{j},43434.$$

Dans les syzygies solsticiales précédentes, on a

$$k = 0^{j}, 11.250;$$

ce qui donne

$$y = 1^{i},54684.$$

Somm. = 645. 55807 97065

Pour apprécier la régularité de ces observations solsticiales des marées, on a déterminé, pour chaque année, les valeurs de 2i6' et de 2ia', et on les a multipliées par seize, pour les comparer aux valeurs précédentes des mêmes quantités relatives aux seize années d'observations. On a formé ainsi la table suivante:

electrone la plus grande des valeurs de 212 dans les syzygies solciciales de la Table VI, et qui ne s'eletts que la fique partie des valeurs de 216, dans les plus partie des valeurs de 216, dans la ble III, est 16,443; elle surpasse la plus grande des valeurs de 216 dans es syzygies solsticiales, qui, par la Table VI, ne s'eleve qu'à 13,034 de telle disposition n'est point l'effet du basard; car alors, en admet table proposition n'est point l'effet du basard; car alors, en admet table proposition s'est point l'effet du basard; car alors, en admet table proposition est ro,776, et la plus petite des ces valeurs, qui par la Table VI, est 19,776, et la plus petite des ces valeurs, qui la Table VI, est 19,400 sont les vidiables entre les figures ces valeurs

e day doune

on distriction and densite nonprecedent supposition la plus favorable

Valeurs de 216' et 21a' conclues des marées solsticiales syzygies.

10,370	216.	mêm el anal
1807	9,681	722,122
1808	10,747	738,531
1809	12,121	751,449
1810	13,557	745,930
1812	9,448	733,925
1813	12,357	731,510
9118141190	12,208	729,610
1815	11,893	720,851
1816	9,583	701,618
1817	11,392	706,605
18:8	13,034	705,261
1819	9,697	682,144
1820	9,659	679,984 680,378
1822	12,446	700,525
1022	90211.0	201y
Moyennes	11,1485	716,4630

Le peu de différence de ces valeurs de 2i6' et de 2ia' à leurs moyennes, prouve leur régularité. En les comparant aux mêmes valeurs relatives aux syzygies équinoxiales, on voit clairement l'influence des déclinaisons sur les valeurs de 2a et de 26: la plus petite des valeurs de 2ia, dans les syzygies équinoxiales de la Table III, est 810,998; elle surpasse la plus grande des valeurs de 2ia' dans les syzygies solsticiales de la Table VI, et qui ne s'élève qu'à 751,449. Pareillement, la plus petite des valeurs de 2i6, dans les syzygies équinoxiales de la Table III, est 16,443; elle surpasse la plus grande des valeurs de 2i6' dans les syzygies solsticiales, qui, par la Table VI, ne s'élève qu'à 13,034. Une telle disposition n'est point l'effet du hasard; car alors, en admettant que la plus grande des trente-deux valeurs de 2i6 et de 2i6', et qui, par la Table III, est 19,776, et la plus petite des ces valeurs, qui, par la Table VI, est 9,406, sont les limites entre lesquelles ces valeurs

ont pu également s'étendre; on aura la supposition la plus favorable au hasard: un plus grand intervalle de limites d'iminuerait sa probabilité. Dans cette supposition, la probabilité qu'une valeur syzygie équinoxiale de 2i6 ne sera pas au-dessous de 16,443, sera

$$\frac{19,776 - 16,443}{19,776 - 9,406}$$
 ou  $\frac{3,333}{10,370}$ .

Pareillement, la probabilité qu'une valeur syzygie solsticiale de 2*i*6 ne sera pas au-dessus de 13,034, sera

$$\frac{13,034 - 9,406}{19,776 - 9,406}$$
 ou  $\frac{3,628}{10,370}$ .

De là il suit, par les principes connus de la théorie des probabilités, que la probabilité qu'aucune des seize valeurs syzygies équinoxiales de 2i6 ne sera au dessous de 16,443, en même temps qu'aucune des valeurs syzygies solsticiales 2i6 ne surpassera pas 13,034, est égale à

$$\left(\frac{3,333}{10,370}\right)^{16} \left(\frac{3,628}{10,370}\right)^{16}$$

Ce produit est moindre qu'une fraction qui, ayant l'unité pour numérateur, aurait pour dénominateur 15, suivi de quatorze zéros. L'excessive petitesse de cette fraction prouve incontestablement l'influence des déclinaisons du Soleil et de la Lune sur les valeurs de 2*i*6 et de 2*i*6. Un raisonnement semblable, appliqué aux valeurs de 2*i*a et de 2*i*a, montre pareillement l'influence des déclinaisons sur ces valeurs.

6. J'ai considéré, d'une manière à peu près semblable, les quadratures équinoxiales suivantes:

Une telle disposition n'est point l'effet du basard; est alors, en ad-

la plus petite des valeurs de nic, dans les avereies équinoxial

basard un plus grand LIV AJAAT mites diminurent se viere

ou egalement s'etenore; on aura la supposition la silve

# Dans cette supposition al accidence este sond

1807 1808 1809	i <sup>er</sup> mars 5	17 mars. 19	30 mars. 4 avril.	8 sept.	24 26 16	sept.	8 octob.
1810 1811 1812	13	28 17 19 25	31 mars. 4 avril.	6 9 13	20 25 27	8081	5 9 13
1813 1814 1815 1816	9 14 2	25 28 18 20	7 12 1 5	2 7 10 29 août.	17 21 26 14	1810	6 10 28 sept.
1817 1818 1819	28 févr. 3 mars.	26 15	8 29 mars. 2 avril.	3 sept.	17 21 26	1843 i 1815.	3 octob.
1820 1821 1822	7 10 28 févr.	26 26 15	6 9 29 mars.	30 août. 4 sept. 8	15 18 23	8181	29 sept. 4 octob. 7

On a pris l'excès de la haute mer du matin sur la basse mer du soir, relatif au jour même de la quadrature et aux trois jours qui la suivent. Je n'ai pas considéré six jours, comme je l'ai fait relativement aux syzygies; parce que la variation des marées quadratures étant plus rapide que celles des marées syzygies, la loi de variation proportionnelle au carré du temps ne pourrait pas, sans erreur sensible, s'étendre à un intervalle de six jours. On a fait, pour chaque marée, une somme des excès relatifs à chacun des quatre jours, en doublant les résultats relatifs à la quadrature intermédiaire des trois quadratures considérées dans chaque équinoxe. On a formé ainsi la Table suivante.

### cochiquens de Z, et que l'or HIV HIBAT somme de leurs produits, s' on fait les sommes semblables, relativement aux coefficiens de C'et de

# Quadratures équinoxiales.

8, actob	sept.3	(0)	(I) 3 6	(2)	(3)
S sept.	1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821	25,130 26,770 26,130 24,500 26,055 26,927 25,419 23,861 24,867 25,250 23,380 23,860 22,575 23,002 23,140 23,228	20,100 20,950 21,400 20,974 21,440 21,500 20,341 19,754 20,106 19,380 18,610 18,330 17,178 16,798 17,060 18,102	20,180 20,935 21,130 21,483 21,130 20,625 20,681 20,004 19,949 21,130 18,560 19,010 17,284 16,828 17,080 17,024	26,106 26,320 25,280 27,080 26,167 25,111 25,916 25,943 26,173 23,720 22,520 23,610 24,254 23,159 22,755 22,045
ilip et irelogi storba	Sommes	394,094	312,023	313,033	396,159

Si l'on nomme f, f', f'', f''' les sommes des hauteurs relatives à chacun des quatre jours, et que l'on représente la loi de ces sommes par

touliant les résultats et 
$$\zeta t^2 + \zeta' t + \zeta''$$
, de résultat et du la distance d'une baute marée d'un agint de l'instant de

t étant le temps écoulé depuis la haute marée du matin du jour de la quadrature, l'intervalle de deux marées quadratures du matin étant pris pour unité; on aura les quatre équations de condition suivantes:

crees de la haute mer, 
$$f' = f$$
,  $f'' = f''$ ,  $f'' + \zeta'' = f'''$ .

Si l'on multiplie chacune de ces équations respectivement par leurs coefficiens de  $\zeta$ , et que l'on fasse nulle la somme de leurs produits ; si l'on fait les sommes semblables , relativement aux coefficiens de  $\zeta'$  et de  $\zeta''$ ; ces trois sommes égalées à zéro , formeront les équations suivantes :

$$98.\zeta + 36.\zeta' + 14.\zeta'' = f' + 4f'' + 9f''',$$

$$36.\zeta + 14.\zeta' + 6.\zeta'' = f' + 2f'' + 3f''',$$

$$14.\zeta + 6.\zeta' + 4.\zeta'' = f + f' + f''' + f''';$$

ces équations donnent espand 1 project - lethics

$$\zeta = \frac{f - f' - f'' + f'''}{4},$$

$$\zeta' = \frac{-\frac{2}{3}(f - f' - f'' + f''') + 2(f''' - f'') + 4(f''' - f')}{10},$$

$$\zeta'' = \frac{f + f' + f'' + f'''}{4} - \frac{3}{3} \cdot \zeta' - \frac{7}{2}\zeta.$$

Maintenant on a

$$f = 394,094$$
,  $f' = 312,023$ ,  $f'' = 313,033$ ,  $f''' = 396,159$ ; ce qui donne

$$\zeta = 41,29925, \ \zeta' = -123,1812, \ \zeta'' = 394,0515.$$

L'expression

$$\zeta t^2 + \zeta' t + \zeta''$$

devient ainsi

$$302,2016 + 41,29925 (t - 1,49131)$$
; (a)

Nommons t' la distance d'une haute marée du matin, à l'instant de la quadrature; et représentons par  $\alpha'' + 6''(t'-y)^2$ , cette haute marée. La hauteur de la basse mer qui la suit sera

ris pour unité; on aura les quatre équations de condition suivantes 
$$-\alpha'' - \beta'' (t' - t' + \frac{1}{4})^2$$
;

l'excès de la haute mer sur cette basse mer sera donc

$$2\alpha'' + \frac{26''}{64} + 26''(t' - y + \frac{1}{8})^{2}$$
.

Nommons k' la valeur moyenne des quantités dont les quadratures ont suivi les hautes marées du matin, du jour de la quadrature; on aura t'=t-k'. La formule précédente devient ainsi, en la multipliant par le nombre i des quadratures considérées

$$-2i\alpha'' + \frac{2i6''}{64} + 2i6''(t-k'-y+\frac{1}{8})^{2}$$
.

Cette formule sera l'expression des valeurs de f, f', etc. : en la comparant à la formule (a), on a

 $k'+y-\frac{1}{3}=1,49131;$   $k'+y-\frac{1}{3}=1,61631-k'.$ 

ce qui donne

$$y = 1,61631 - k'$$
.

L'intervalle pris pour unité est l'intervalle de deux marées consécutives du matin vers les syzygies équinoxiales, et l'on verra ci-après que cet intervalle est 1,057828; on aura ainsi

$$1,61631 = 1^{j},70978.$$

La valeur de k', relative aux marées précédentes, est 0',20014; on aura donc

on a ensuite 
$$y = 1^{j},50964$$
;  $2i6'' = 41,29925$ ,  $2ia'' = 301,55690$ .

Pour apprécier la régularité de ces marées à Brest, on a déterminé les valeurs de 2ia" et de 2i6" pour chaque année, et on les a multipliées par 16, ce qui a produit la Table suivante:

be conditioned; et représentaine par a - l'a (1 - 2), cette haute marée. ran la copsidére de la unépie manière les quadratures solstiquales

131

TABLE IX.

TABLE IX.

TABLE IX.

Valeurs de 2i6" et 2ia" conclues des marées équinoxiales en quadratures.

la com	etc.; en	autes: def, f	des valeurs sui des valeurs de	noiseans (	i considéré le formule sera t à la formul et :3 jain.
dec. consecut après que 30 déc.	29 mariees	1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820	43,824 44,820 35,520 36,492 38,608 39,732 41,251 36,174 43,940 37,040 34,920 40,520 49,467 50,140	310,467 323,148 330,551 318,768 330,099 324,982 317,168 310,179 308,568 302,939 287,984 287,957 262,213 271,685	donne.  dervalle pris gevalle est gevalle est  seleth lieu
3r déc.	ðe   822	1821 1822 Moyennes	47,019 40,589 41,2535	268,339 269,891 302,5624	nonie.

Le peu de différence de ces valeurs de 2ia" et de 2i6" à leurs moyennes, prouve la régularité de ces valeurs.

7. J'ai considéré de la même manière les quadratures solsticiales suivantes:

de la quadrature et pour les trois jours qui la suivent, ce qui a donné

# MÉCANIQUE CÉLESTE,

TABLE X.

Marées quadratures solsticiales.

J'ai o	J'ai considéré les quadratures solsticiales suivantes :							la cosa-
1807	r3 juin.	28 juin.	12 juill.	6 déc.	22	déc.		
1808	5 janv,	2018,05	15 juin.	rojuill.	10	1807	24	déc.
1809	9 218.0	500 1000	20	4 0 000	13	1849	29	
1810	12	10	23	8890 8 90	3	1181	19	BODSETTA
1811	1 180 6	13	29	12 2 51	6		22	iprés que
1812	6	2000.80	16	ST OF DE	111		25	
1813	9	5	21	5 0 0 18	I		14	30 déc.
1814	11 juin.	24	10 juill.	0 4 81	119		"	but; w
1815	2 jany.	31 mai.	14 juin.	29 juin.	8		23	
1816	7	3 juin.	17 688	2 juill.	112		26	
1817	10	6	22	6	1		15	31 déc.
1818	11 juin.	25 500 50	ıı juill.	4 déc.	20	e de la constante de la consta	"	
1819	3 janv.	I	14 juin.	30 juin.	9		23	e sain
1820	8	3	18	steurs don	12	in la	27	L chsem
1821	A leurs and	7	22 juin.	7 juill.	2	e intere	16	31 déc.
1822	12 juin.	26 design sol	11 juill.	5 déc.	21	sidére	4	anv. 1823.

On a fait, comme ci-dessus, les sommes des excès des hautes mers du matin sur les basses mers qui les suivent, pour le premier jour de la quadrature et pour les trois jours qui la suivent, ce qui a donné la Table suivante:

309.051(+18,1005(t-1,55062)\*

ce qui donne par un calcul antificio à celui que nous venons de faire relativement aux quadra IX HIGAT siales,

# Quadratures solsticiales:

	uivantes ; (o)	solsticiales (t)	(2)	(3)
1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822	28,720 28,910 28,950 29,586 29,319 28,106 26,584 27,196 25,780 26,870 25,640 26,607 26,611 26,934 27,355 28,047	26,495 25,765 26,863 25,750 26,445 25,837 24,908 24,431 24,787 25,500 24,713 24,677 24,412 25,180 25,014	25,310 25,145 24,840 26,477 25,943 25,823 26,234 25,500 25,285 24,900 25,370 24,853 24,304 23,709 24,415 24,204	27,135 27,120 25,815 27,940 28,034 27,705 28,684 28,384 28,224 28,370 28,930 26,769 26,574 26,226 26,430 26,036
Sommes	441,215	404,877	402,312	438,376

L'ensemble de ces hauteurs donne

$$f = 441,215$$
,  $f' = 404,877$ ,  $f'' = 402,312$ ,  $f''' = 438,376$ ;

d'où l'on tire

$$\zeta = 18,1005, \ \zeta' = -55,4097, \ \zeta'' = 441,4578.$$

L'expression et les basses mers qui les suivent, pour le noissarqu'il

devient ainsi

$$399,0524 + 18,1005(t - 1,53062)$$
\*;

ce qui donne par un calcul semblable à celui que nous venons de faire relativement aux quadratures équinoxiales,

$$2i6''' = 18,1005;$$

on trouve ensuite, comme ci-dessus,

$$\gamma = 1,65561 - k'$$

L'intervalle pris pour unité est ici 1,046847; et la valeur de k', relative à ces marées quadratures, 0,22048; d'où l'on tire

$$y = 1^{j}, 51269.$$

Les marées quadratures équinoxiales ont donné

$$y = 1^{1},50964;$$

la moyenne est

$$y = 1,51116;$$

c'est la quantité dont le minimum des marées suit la quadrature. On a vu précédemment que les marées syzygies équinoxiales et solsticiales donnent pour les valeurs correspondantes de y,

La moyenne de ces deux valeurs est 1<sup>i</sup>,51349; c'est la quantité dont le maximum des marées suit la syzygie. On voit ainsi que cet intervalle est à très peu près égal à l'intervalle dont le minimum des marées suit la quadrature; ces deux intervalles peuvent donc être supposés égaux. Les observations anciennes m'ont donné pour ces intervalles 1<sup>i</sup>,50724 et 1<sup>i</sup>,5077 (Livre IV, n° 24 et 31); ce qui est à très peu près d'accord avec les résultats des nouvelles observations.

Pour juger de la régularité des marées quadratures solsticiales dans le port de Brest, on a déterminé, pour chaque année, les valeurs de  $2i\alpha'''$  et de  $2i\beta'''$ , en les multipliant par seize, ce qui a produit la Table suivante:

and state of the property of the

tandis que les syzygies, et à

# tures equinosanera de la califerantes equinos estados para estados en para la planta.

Valeurs de 2i6<sup>m</sup> et 2ia<sup>m</sup> conclues des marées solsticiales en quadratures.

le indiq des astr	land par	nas wig
1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822	16,200 20,480 12,248 21,196 19,860 16,604 16,504 22,596 15,728 19,360 20,400 15,240 16,816 20,160 16,760 19,427	408,743 400,719 403,736 411,650 413,200 408,811 402,496 392,835 393,822 397,539 396,448 396,466 387,373 377,789 401,355 387,027
Moyennes	18,0312	398,7504

En comparant ces valeurs de 2ia''' et de 2ib''' à celles qui sont relatives aux marées quadratures équinoxiales, on voit clairement l'influence des déclinaisons des astres sur ces valeurs. Dans les quadratures équinoxiales, la déclinaison du Soleil est presque nulle, et la déclinaison de la Lune est vers son maximum; le contraire a lieu dans les quadratures solsticiales où la déclinaison de la Lune est fort petite, et celle du soleil, vers son maximum. Dans les quadratures équinoxiales, la plus grande des valeurs de 2ia'' a été, par la Table IX, égale à 330,551, valeur inférieure à la plus petite des valeurs de 2ia''' relatives aux quadratures solsticiales, et qui, par la Table XI, est 377,789.

MÉCAN. CÉL. Tome V.

Au contraire, la plus petite des valeurs de 2i6" des marées quadratures équinoxiales de la Table IX, et qui est 34,920, surpasse la plus grande des valeurs de 2i6" des marées quadratures solsticiales de la Table XI, qui est 22,596. En appliquant à ces valeurs le raisonnement que nous avons fait, dans ce qui précède, sur les valeurs de 2ia et de 2i6 relatives aux marées syzygies; on verra que cette disposition n'est point l'effet du hasard, et qu'elle indique d'une manière incontestable, l'influence des déclinaisons des astres sur ces valeurs, dans les marées quadratures comme dans les marées syzygies.

8. Toutes ces valeurs de 2ia et de 2i6 sont autant de phénomènes très propres à vérifier la théorie du flux et du reflux de la mer fondée sur la loi de la pesanteur universelle. Mais avant de les comparer à cette théorie, je vais les comparer aux valeurs semblables que j'ai déduites dans le quatrième Livre, des observations anciennes. Ces observations sont relatives à vingt-quatre syzygies et à vingt-quatre quadratures, tandis que les observations modernes se rapportent à cent vingt - huit syzygies, et à cent vingt-huit quadratures. Il faut donc, pour comparer les résultats anciens aux modernes, diminuer ceux - ci dans le rapport de 3 à 16. On aura ainsi:

## Syzygies équinoxiales.

Observations modernes.	Observations anciennes
$48.\alpha = 153^{mc}, 711$ 48.6 = 3,388	
Syzygies so	Isticiales. 38888.
48.a' = 134,325 48.6' = 2,078	
Quadratures eq	
$48.\alpha'' = 56,561$ 48.6'' = 7,744	
elas , XI eldaT al Quadratures s	
$48.\alpha''' = 74,769$ 48.6''' = 3,394	

On voit, par l'inspection de ce tableau, que les résultats des observations modernes s'accordent avec ceux des observations anciennes aussi bien qu'on peut l'attendre, vu les différences que peuvent y produire les différences des déclinaisons de la Lune aux deux époques.

9. Comparons maintenant les résultats des observations, avec les formules du chapitre précédent. Dans les syzygies et dans les quadratures, que nous venons de considérer, on a, comme on vient de le voir,

On a trouvé ensuite mais avant alla miverselle Mais avant april principal de la pesanteur universelle Mais avant april principal de la pesanteur universelle Mais avant april principal de la pesanteur universelle de la pesanteur de la pesa

$$P' = 127,24259, \quad Q' = 108,46527, \quad \text{Short short sh$$

En substituant ces valeurs de P, Q, P', etc., dans les expressions de 2ia, 2ia', etc., du chapitre précédent, et comparant ces expressions à leurs valeurs données par les observations; on a formé les quatre équations suivantes ? 282 - - 2307.00 1 81, ce = 60 RE. 007

$$8_{19,7}8_{9}5 = 1_{27,2}4_{2}5_{9} \cdot \frac{2A.L}{r^{3}} + 1_{2}6,86464 \cdot \frac{2A'.L'}{r^{3}} = 0$$

$$- 9,38866 \cdot \frac{(A'+B)}{A_{1}} \cdot \frac{2A.L}{r^{3}} = \frac{U'Ac}{r^{3}}$$

$$- 9,26_{1}8_{7}L_{1},02_{7}3_{1} \cdot \frac{(A'-B)}{A'} \cdot \frac{2A'.L'}{r^{3}} = 0$$

$$- 9,26_{1}8_{7}L_{1},02_{7}3_{1} \cdot \frac{(A'-B)}{A'} \cdot \frac{2A'.L'}{r^{3}} = 0$$

$$716,4025 = 108,46527 \cdot \frac{2A}{r^3} + 108,34089 \cdot 1,02734 \cdot \frac{2A'L'}{r^3} = 0788,801$$

$$+ 9,38866 \cdot \frac{(A-B)}{A} \cdot \frac{\frac{2AL}{r^3}}{r^3} \cdot \frac{\frac{(A-A)}{A} \cdot \frac{2A'L'}{r^3}}{A} \cdot \frac{2A'L'}{r^3} \cdot \frac{2$$

MÉCAN. CÉL. Tome V.

$$301,5569 = 108,40258.0,97266.\frac{2A'L'}{7'^3} - 127,24138.\frac{2AL}{r^3} + 9,38662.\frac{(A-B)}{A}.\frac{2A.L}{r^3} + 9,18812.0,97266.\frac{(A'-B)}{A}.\frac{2A'L'}{7^3}; (3)$$

$$398,7696 = 126,77883.0,97266.\frac{2A'L'}{r'^3} - 108,46814.\frac{2AL}{r^3}$$

$$- 9,38662.\frac{(A'-B)}{A}.\frac{2AL}{r^3}.087.018 = 2100.018$$

$$- 9,18812.0,97266.\frac{(A'-B)}{A'}.\frac{2A'L'}{r'^3}. (4)$$

Dans toutes ces équations, r et r' sont les moyennes distances du Soleil et de la Lune à la Terre.

Le système +(1)+(2) des équations précédentes donne

$$1536,1920 = 235,70786.\frac{2AL}{r^3} + 235,20551.1,02734.\frac{2A'L'}{\overline{r}^3}.$$
 (5)

Le système des équations + (3) + (4) donne

700,3265 = 235,18141.0,97266. 
$$\frac{2A'L'}{7^3}$$
 = 235,70952.  $\frac{2AL}{7^3}$ , no. (6)

De ces deux équations, on tire : + - . ecc. , re := 3087,018

$$\frac{2 \text{AL}}{7^3} = 4,75468$$
;  $\frac{2 \text{AL}}{r^3} = 1,643081$  (01) is (

MECAN. CEL. Tome V.

Le système des équations +(1) -(2) donne de la constant de la cons

Le système des équations + (4) - (3) donne

$$97,2127 = 18,77324 \cdot \frac{2AL}{r^3} + 18,37625 \cdot 0,97266 \cdot \frac{2A'L'}{7^{3}} - 18,77324 \cdot \frac{(A-B)}{A} \cdot \frac{2AL}{r^3} \cdot \frac{2A'L'}{r^3} \cdot \frac{2A'L'}{r^$$

En substituant pour  $\frac{2AL}{r^3}$  et  $\frac{2A'L'}{r^3}$ , leurs valeurs précédentes, l'équation (7) donne T'As (8-'A)

$$17,9481 = 30,8527 \cdot \frac{A-B}{A} + 90,4824 \cdot \frac{A'-B}{A'}$$
 (9)

L'équation (8) donne

$$18,6159 = 30,8460 \cdot \frac{(A-B)}{A} + 84,9826 \cdot \frac{(A'-B)}{A'}$$
 (10)

On a, comme on l'a vu dans le chapitre précédent,

$$A = (1 + mx) \cdot B, \quad (A' = (1 + m'x) \cdot B;$$

ce qui donne

$$\frac{A-B}{A} = \frac{mx}{1+mx}; \quad \frac{A'-B}{A'} = \frac{m'x}{1+m'x}.$$

On a de plus  $\frac{m}{m'} = 0.0748$ ; on a donc, en ajoutant les équations (9) et (10),

$$36,5640 = 4,6151 \cdot \frac{m'x}{1+0.0748.m'x} + 175,4650 \cdot \frac{mx'}{1+m'x}; \quad (11)$$

d'où l'on tire

$$m'x = 0,25291;$$
  $c^{-7}$ 

ce qui donne

$$\frac{2B.L}{r^3} = 1,612572;$$

et par conséquent

real tement, dans les sy gies solstional quatron 
$$\frac{\overline{\epsilon_7}}{7}$$
, quatron  $\frac{\overline{\epsilon_7}}{7}$ ,  $\frac{\overline$ 

Ce rapport est très important pour l'Astronomie. En l'appliquant aux formules du n° 35 du Livre V, et du n° 30 du Livre VI, on trouve en secondes sexagésimales 9",4 pour le coefficient du principal terme de la nutation, et 6",9 pour le coefficient de l'équation lunaire des Tables du Soleil. Il donne de plus la masse de la Lune égale à celle de la Terre divisée par 74,946.

On a considéré dans chaque syzygie, la hauteur de la pleine mer du soir au-dessus de la basse mer du matin, pendant six jours consécutifs, à partir du jour qui précède la syzygie : or, l'intervalle de la syzygie au maximum de la pleine mer étant d'un jour et demi, celui des marées extrêmes de ces six jours à ce maximum serait au moins de deux jours et demi; ce qui peut paraître trop considérable pour y appliquer la loi d'une variation de la haute mer, proportionnelle au carré de sa distance au maximum. Il était donc intéressant de voir ce que l'on obtiendrait, en se bornant à considérer quatre jours dans les syzygies, comme on l'a fait dans les quadratures. On a obtenu ainsi, relativement aux syzygies équinoxiales précédentes, la loi des valeurs de f, f', etc., représentée par

Les six jours avaient donné, par ce qui précède,

819,5070 — 18,06977 (
$$i$$
 — 2,46398)°, ennob imp so  $2i6$  = 18,0698;

ce qui diffère très peu des quantités précédentes.

Pareillement, dans les syzygies solsticiales, quatre jours ont donné

$$716,3726 - 11,4155(t-2,49194)^2$$
 $2i\alpha' = 716,7469,$ 
 $2i6' = 11,4155;$ 
applique at simplicited more destroyal seat to program

et par ce qui précède, six jours avaient donné

$$716,2293 - 11,08515 (t - 2,51976)^{a},$$
  
 $2ia' = 716,40250,$   
 $2ib' = 11,08515;$ 

ce qui diffère peu des quantités précédentes. En substituant ces nouvelles valeurs de  $2i\alpha$  dans les équations (1) et (2), on voit qu'il n'en peut résulter qu'une variation presque insensible, dans le rapport de  $\frac{L'}{7^3}$  à  $\frac{L}{r^3}$ ; ce qui confirme la valeur que nous en avons donnée.

On voit encore, par l'inspection de l'équation (11), que cette valeur ne dépend que fort peu de la supposition que nous avons faite; savoir, que A'-B étant m'x, A-B sera mx; car en faisant même A-B=2mx, ce qui revient à changer m'x en 2m'x dans le premier terme du second membre de cette équation, la valeur de m'x sera peu changée, ainsi que la valeur du rapport de  $\frac{L'}{r'^3}$  à  $\frac{L}{r^3}$ .

Les valeurs de  $2i\alpha$ ,  $2i\alpha'$ ,  $2i\alpha''$  et  $2i\alpha'''$ , déduites des observations, nous font connaître ces quatre choses, les actions des deux astres, et leurs accroissemens dus aux circonstances accessoires; elles suffisent pour déterminer les valeurs de  $2i\mathcal{C}$ ,  $2i\mathcal{C}'$ ,  $2i\mathcal{C}''$ ,  $2i\mathcal{C}''$ , au moyen des équations (M) et (N) du chapitre précédent, dans lesquelles on doit observer que l' = l - (m' - m) t''.

On ne doit avoir égard ici qu'à l'inégalité lunaire de la variation, ou s=2 (m'-m). En prenant ensuite pour unité, comme nous l'avons fait, l'intervalle d'une pleine mer à la pleine mer correspondante du jour suivant; la partie de la formule (M), qui dépend de l' et de t'', donnera les valeurs de 2i6, 2i6', etc.; en y changeant t'' en  $1^{i}+R$ , R étant le retard journalier de la marée, retard que donnent les Tables XIII, XIV, XV et XVI; en faisant  $l=\frac{2\pi R}{1^{i}}$ ,

parce que *l* est le retard journalier de la marée réduit en arc, à raison de la circonférence entière pour un jour; enfin, en multipliant les résultats par 2*i*. J'ai obtenu ainsi les valeurs suivantes:

Syzygies équinoxiales.

Formule, Observation.  $2i\mathcal{E} = 18,82,\dots,18^m,07.$ Syzygies solsticiales.  $2i\mathcal{E}' = 12,41,\dots,11,09.$ Quadratures équinoxiales.  $2i\mathcal{E}'' = 45,41,\dots,41,30.$ Quadratures solsticiales.  $2i\mathcal{E}''' = 19,12,\dots,18,03.$ 

Si l'on considère toutes les causes d'erreur, soit des observations, soit des approximations des formules, soit enfin des hypothèses employées, causes que nous avons développées dans le premier chapitre; on verra dans le peu de différence des valeurs calculées aux valeurs observées, une grande confirmation de la loi de la pesanteur universelle.

10. Je vais présentement considérer l'influence des variations des distances de la Lune à la Terre sur les marées. On a choisi dans les observations syzygies équinoxiales ci-dessus employées, celles où le demidiamètre de la Lune surpassait de 118" centésimales son demi-diamètre moyen apparent; on en a trouvé 34. On a choisi pareillement les observations syzygies où le demi-diamètre moyen surpassait de 118" le demi-diamètre apparent; elles sont au nombre de 24. Les époques de ces syzygies sont comprises dans la Table suivante :

# snivent. En faisant une somme de conhanteurs sont chique les résultats suivans grandle ariere pour un jour enfin, en multip

Années.	AFOGÉE. 110 cesque con 180 cesque con 181 cesque ce	f"= 132 (86; 5 ) j
1807	9 mars; 8 avril; 16 septemb.	23 mars; 2 septemb.; 1er oct.
1808	27 mars; 4 octobre.	12 mars; 10 avril; 20 sept.
1809	of the constant con-	31 mars; 9 octobre.
1811	17 septembre.	2 septembre; 2 octobre.
1812	27 mars; 5 septemb.; 5 octob.	13 mars; 11 avril; 20 sept.
1813	17 mars; 24 septembre.	2 mars; 11er avril; 10 octob.
1815	o les valeurs de grampages 8 re	3 septembre; 2 octobre.
1816	28 mars; 6 septemb.; 6 octob.	13 mars; 12 avril; 21 sept.
1817	17 mars; 25 septembre.	3 mars; 1er avril; 11 sept.; 10 octobre.
181811	nte. ces, valeurs, perigies, et	22 mars up slumio al mor
1820	29 février; 29 mars; 7 sept.; 7 octobre.	14 mars; 22 septembre.
1821		4 mars; 2 avril; 11 sept.;
1822	6 avril.	23 mars; 30 septembre.
Jan engat	24 observations apogées.	34 observations périgées.

On a pris comme ci-dessus, dans chaque syzygie, les hauteurs des marées du soir, au-dessus des basses mers du matin, du jour qui précède la syzygie, du jour de la syzygie et des quatre jours qui la

MÉCAN. CÉL. Tome V.

suivent. En faisant une somme de ces hauteurs, on a obtenu les résultats suivans pour les 24 syzygies apogées:

$$f = 123,103;$$
  $f' = 131,148;$   $f'' = 133,739;$   $f''' = 132,486;$   $f'' = 118,300.$ 

Les trente-quatre syzygies périgées ont donné

$$f = 200,009;$$
  $f' = 227,162;$   $f'' = 242,877;$   $f''' = 244,178;$   $f^{17} = 231,418;$   $f^{7} = 204,301.$ 

Le nombre total de ces syzygies étant 58; pour les réduire au même nombre, on a multiplié par  $\frac{29}{24}$  les valeurs de f, f', etc., relatives aux 24 syzygies apogées, et par  $\frac{29}{34}$ , les mêmes valeurs relatives aux 34 syzygies périgées; et l'on a trouvé par la méthode du n° 4,

pour la formule qui représente les valeurs de f, f', etc. apogées, multipliées par  $\frac{29}{24}$ ; et

$$209,05 - 5,867 (t - 2,57390)$$

pour la formule qui représente ces valeurs périgées et multipliées par 29 de la contrat de la contra

De là on a conclu, pour les observations apogées,

$$2i\alpha = 161,87;$$
  $2i6 = 2,515;$ 

et pour les observations périgées,

$$2i\alpha = 209,14;$$
  $2i6 = 5,863.$ 

On voit ainsi la grande influence des variations de la distance de la Lune à la Terre, sur les valeurs de 2ia, et de 2i6. Dans les observations précédentes, l'excès des valeurs périgées sur les valeurs apogées a été 47,27 relativement à 2ia, et 3,352, relativement à 2i6.

La somme des deux valeurs de 2ia, et celle des deux valeurs de 2i6,

répondent à 58 syzygies équinoxiales dans lesquelles la Lune serait à sa moyenne distance. En multipliant donc ces sommes par  $\frac{128}{58}$ , on doit retrouver à fort peu près les valeurs de  $2i\alpha$  et de  $2i\delta$  trouvées dans le n° 4. Cette multiplication donne

$$2i\alpha = 818,7829;$$
  $2i6 = 18,498,$ 

ce qui diffère très peu des valeurs 819,7895 et 18,0698 données dans le n° 4.

Pour comparer ces résultats, à la formule (M) du chapitre précédent, nous observerons que cette formule donne pour l'excès des deux valeurs de 2ia

$$\frac{4A'L'}{7^{3}} \cdot \cos(sT + \theta') \left[ -3hP' + \frac{fsx}{1 + m'x} \frac{(P' + Q')}{2} + \frac{3hm'x}{2(1 + m'x)} (P' - Q') \right].$$

On doit observer ici que h et f ne sont pas relatifs à la seule équation du centre de la Lune, mais encore à l'inégalité de l'évection; et que l'on peut supposer à très peu près relativement à ces deux inégalités, f = -2h, et s = m'. On peut observer encore que

$$-6h.\cos(sT+\theta') = \frac{\bar{r}'^3}{r'^3} - \frac{\bar{r}'^3}{r''^3}$$

r'étant le rayon vecteur de la Lune dans les syzygies périgées précédentes, et r'étant ce même rayon dans les syzygies apogées. La fonction précédente prend ainsi cette forme

$$\frac{{}_{2}{\rm A}'{}_{L}{}^{1}}{{\bar f}^{'3}}{{\bar f}'^{'3}}{\rm P}' - \frac{\bar f'^{3}}{r''^{3}}{\rm P}' \Big). \Big( {}_{1} + \frac{2}{\bar 3}.\frac{m'x'}{1+m'x}.\frac{{\rm P}' + {\rm Q}'}{2{\rm P}'} - \frac{m'x}{1+m'x}.\frac{{\rm P}' - {\rm Q}'}{2{\rm P}'} \Big).$$

Pour déterminer le facteur

$$\frac{\vec{r}'^3.P'}{r'^3} - \frac{\vec{r}'^3P'}{r''^3}$$

on a fait dans chaque syzygie périgée, le produit du carré du cosinus de la déclinaison de la Lune au moment de la syzygie, par le cube du rapport de sa parallaxe au même moment, à sa parallaxe moyenne: on a fait la somme de ces produits, et on l'a multipliée par  $\frac{29}{54}$ . On a fait une somme semblable pour les syzygies apogées, et on l'a multipliée par  $\frac{29}{24}$ . On a eu ainsi avec exactitude, la valeur numérique du facteur précédent, que l'on a trouvée égale à 9,7689. On a ensuite à fort peu près  $\frac{m'x}{1+m'x}=\frac{1}{5}$ , et l'on peut déterminer sans erreur sensible, les facteurs  $\frac{P'+Q'}{2P'}$  et  $\frac{(P'-Q')}{2P'}$ , en faisant usage des valeurs de P' et de Q', relatives aux 128 marées syzygies des n° 4 et 5. On a eu ainsi pour l'excès la valeur de 2ix périgée sur sa valeur apogée, 51,52. L'observation a donné 47,27 : la différence 4,25 doit-elle être attribuée aux erreurs soit des observations, soit des approximations, soit enfin des suppositions dont nous avons fait usage? C'est ce qu'un plus grand nombre d'observations, et des approximations analytiques portées plus loin, pourront décider.

Quant à l'excès de la valeur de 2i6 périgée sur la valeur de 2i6 apogée, la formule (M) du chapitre II donne 3,3 pour cet excès, et l'observation donne 3,4. Ainsi l'observation et la théorie s'accordent

à très peu près.

ion provided to pred cine cette force  $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2$ 

a fait done change wyweie neithere. In moderit dar earre du cosinus de

apport de sa parallaxe an même mêment, à sa parallexe mêyenne : on

# CHAPITRE IV.

Comparaison de l'analyse avec les observations des heures et des intervalles des marées.

11. Pour déterminer les heures et les intervalles des marées, on a considéré dans les syzygies employées précédemment pour leurs hauteurs, les heures de la basse mer du matin et de la haute mer du soir du premier jour qui suit la syzygie, et leurs accroissemens au jour suivant, en doublant les résultats relatifs à la syzygie la plus voisine de l'équinoxe ou du solstice. On a fait une somme des heures relatives à chaque année; et en la divisant par huit, nombre des syzygies employées, on a formé les deux tables suivantes. Les heures observées ont été comptées en temps vrai. Mais il est facile de s'assurer que l'équation du temps disparaît des heures suivantes conclues de l'ensemble des syzygies.

# MÉCANIQUE CÉLESTE,

# TABLE XIV.

Des heures et des intervalles des marées.

Syzygies équinoxiales.

Années.	HEURES du premier jour après la syzygie.	de l'heure	PREMIER JOUR.	ACCROISSEMENT.
180 n co (1	Haute	emer. hi solds	Basse	mer.
1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821	o <sup>j</sup> 67795 0,68442 0,67894 0,68364 0,67835 0,68142 0,68860 0,68551 0,68671 0,68165 0,68368 0,68368 0,68368 0,68368 0,68368 0,68368 0,68368	o <sup>j</sup> 026690 0,023784 0,026401 0,027776 0,026977 0,027511 0,027522 0,026470 0,026134 0,026481 0,026481 0,0263785 0,024307 0,023785 0,024652 0,023611 0,027685	oi 41988 o, 42768 o, 42287 o, 42760 o, 42292 o, 42205 o, 43213 o, 42899 o, 43003 o, 42517 o, 42760 o, 42961 o, 42231 o, 42579 o, 41711 o, 42231	0,027210 0,025521 0,027880 0,027558 0,026041 0,027430 0,027977 0,027167 0,026737 0,026917 0,026215 0,023172 0,023958 0,024907 0,024213 0,027338
Moyennes	0,681464	0,026006	0,425259	0,026265

TABLE XV.

Des heures et des intervalles des marées.

Syzygies solsticiales.

années.	HEURES du premier jour après la syzygie.	de l'heure au second jour.	PREMIER JOUR.	ACUROISSEMENT.
	Haut	e mer.	Basse	mer.
1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821	o' 68842 o, 68706 o, 68030 o, 68923 o, 67792 o, 68447 o, 68220 o, 67361 o, 67382 o, 68030 o, 67977 o, 68385 o, 67613 o, 67795 o, 66623	of 028598 0,027475 0,028253 0,027429 0,027164 0,029328 0,028388 0,028901 0,029514 0,027871 0,028546 0,027685 0,029167 0,028218 0,029422 0,029259	o' 43169 o, 42951 o, 42470 o, 43177 o, 42036 o, 43144 o, 42509 o, 42153 o, 41806 o, 42197 o, 42344 o, 42282 o, 42865 o, 42431 o, 42240 o, 41094	0 <sup>j</sup> 027812 0,026331 0,026863 0,027600 0,027908 0,028803 0,027432 0,028032 0,028032 0,028287 0,028287 0,028287 0,028564 0,028218 0,030966 0,030463
Moyennes	0,680285	0,028451	0,424292	0,028301

On a considéré pareillement dans les marées quadratures employées ci-dessus pour la détermination des hauteurs, les heures de la haute mer du matin et de la basse mer du soir du premier jour qui suit le jour de la quadrature, et leurs accroissemens au jour suivant, en dou-

blant les résultats relatifs à la quadrature la plus voisine de l'équinoxe ou du solstice. On a fait une somme des heures relatives à chaque année; et en la divisant par le nombre des quadratures employées, on a formé les deux tables suivantes.

#### TABLE XVI.

### Quadratures équinoxiales.

années.	HEURES du premier jour après la quadrature.	de l'heure au second jour.	PREMIER JOUR.	ACCROISSEMENT.
\$10 fo lo	Haute	e mer.	Basse	mer.
1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822	o' 38589 o, 37843 o, 39531 o, 40183 o, 39215 o, 38941 o, 40442 o, 39879 o, 40720 o, 40616 o, 39583 o, 38949 o, 39975 o, 38447 o, 39462 o, 40477	o' o61633 o, o54561 o, o52431 o, o57372 o, o54167 o, o53043 o, o52523 o, o59294 o, o57210 o, o55994 o, o62327 o, o57465 o, o60069 o, o56158 o, o60509 o, o58681	o' 64959 o, 65204 o, 65417 o, 66302 o, 65646 o, 65148 o, 66657 o, 66051 o, 66676 o, 66935 o, 66016 o, 65278 o, 66163 o, 64948 o, 65312 o, 66858	oj 063195 0,052210 0,057244 0,050676 0,052916 0,054769 0,053391 0,062928 0,059884 0,061464 0,062153 0,062847 0,060591 0,056690 0,061203 0,055903
Moyennes	0,395542	0,057090	0,658481	0,058566

mer du matin et de la basse mer du soir du premier jour qui suit le jour de la quadrature, et leurs accroissemens au jous suivant, en don-

TABLE XVII

## Quadratures solsticiales.

A STRIKE WAY			THE RESIDENCE OF THE PERSON OF		
Années.	HEURES du premier jour après la quadrature.	de l'heure au second jour.	PREMIER JOUR.	ACCROISSEMENT.	
	Haut	e mer.	Basse	mer.	
1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822	o' 40469 0,39444 0,39470 0,40464 0,39254 0,40313 0,40704 0,41275 0,39296 0,41363 0,40816 0,40538 0,39157 0,39435 0,40893 0,40442	o' 050520 0,046922 0,045394 0,048703 0,047396 0,049827 0,047999 0,045231 0,045231 0,046089 0,044352 0,045832 0,045832 0,047222 0,046436	o' 66806 0,66072 0,65373 0,66632 0,65577 0,66545 0,66884 0,67301 0,67058 0,67301 0,67058 0,66684 0,65095 0,65573 0,67397 0,66944	o <sup>j</sup> 046875 0,045961 0,047130 0,045833 0,045449 0,050356 0,048426 0,049132 0,045579 0,044525 0,045660 0,043656 0,047070 0,049306 0,046272 0,046008	
Moyennes	0,402206	0,046991	0,664548	0,046702	

L'effet des déclinaisons des astres sur les retards journaliers des marées est évident dans les seize années : le retard le plus grand des marées syzygies équinoxiales a été au-dessous de la moyenne des retards des marées syzygies solsticiales ; et le plus petit retard des marées syzygies solsticiales a surpassé la moyenne des retards des marées syzygies équinoxiales. Dans les quadratures équinoxiales, le plus petit retard

journalier des marées quadratures équinoxiales a surpassé le plus grand retard des marées quadratures solsticiales.

En prenant une moyenne entre les retards journaliers des hautes et des basses mers, on a pour ces retards

Syzy	gies.	Quadratures.		
Equinoxes.	0,026136	Equinoxes.	0,057828	
Solstices.	0,028376	Solstices.	0,046846	

Les observations anciennes m'ont donné dans le quatrième livre, les retards suivans :

Syzy	gies.	Quadratures.		
Equinoxes.	0,025503	Equinoxes.	0,057495	
Solstices.	0,028600	Solstices.	0,046643	

Nous retrouvons donc ici, entre les observations anciennes et modernes, le même accord que nous avons trouvé dans le troisième chapitre, relativement aux hauteurs des marées et à leur variation.

L'heure de la basse mer du matin du jour qui suit la syzygie équinoxiale a été o',425259. En lui ajoutant un quart de jour, plus un quart du retard journalier des marées syzygies équinoxiales, on doit avoir l'heure de la haute mer du soir, si la mer à Brest emploie autant de temps à monter qu'à descendre; on a ainsi pour cette heure, o',681793. L'observation donne o',681464. La différence est 22",9. Les syzygies solsticiales donnent 110",8 de différence.

L'heure de la haute mer du matin du jour qui suit la quadrature équinoxiale est 0,395542. En lui ajoutant un quart de jour plus un quart du retard journalier de la marée, on a 0,65999 pour l'heure de la basse mer du soir. L'observation donne 0,658481, la différence est 151",8. Les quadratures solsticiales donnent —6",3 pour cette différence. Toutes ces différences me paraissent être dans les limites des erreurs des observations. Suivant les observations anciennes, le temps de la descente de la marée surpassait de 1600 environ celui de l'ascension. Cette différence peut tenir à la manière dont on évaluait les momens de la haute et de la basse mer. On a prescrit dans les observations modernes, de prendre un milieu entre les deux instans où la mer revient à la même hauteur, un peu ayant et un peu après son maximum ou son minimum.

La moyenne des retards journaliers des marées est 0',0272561 dans les syzygies, et 0',052337 dans les quadratures. Les observations anciennes m'ont donné dans le quatrième livre, pour les nombres correspondans, 0',027052, et 0',052067, ce qui s'accorde à fort peu près. L'heure de la haute mer du matin du jour de la quadrature est égale à l'heure de la haute mer du matin du jour qui la suit, diminuée du retard journalier des marées quadratures; mais l'heure moyenne de cette dernière marée, est 0',398874; l'heure de la haute mer du matin du jour de la quadrature est donc 0',346537.

Cette heure a précédé la quadrature dans les observations employées. de o',2103. En prenant donc un jour et demi, pour la distance du minimum des marées, à la quadrature, la distance de la marée du matin du jour de la quadrature à ce minimum sera 1,7103; ce qui, à raison d'un accroissement de 0,052337 pour 1,052337, donne 0,085063, qui, ajouté à l'heure de l'heure du minimum des hautes marées à Brest o',431600 : c'est l'heure de la basse marée solaire. On trouve par un procédé semblable, o',441170 pour l'heure du minimum de la basse mer dans les syzygies, et, par conséquent, pour l'heure de la basse mer solaire, conclue des observations syzygies; la différence 057" indique une anticipation des heures des marées quadratures, sur les heures des marées syzygies. Les observations des heures des hautes mers syzygies et des basses mers quadratures, dont les maxima correspondent à la haute mer solaire, indiquent à peu près la même anticipation. Les observations anciennes m'avaient donné cette anticipation égale à 850", dans le nº 30 du Livre IV. Tient-elle, comme je le pensais alors, à de légers écarts du principe de la coexistence des oscillations très petites, ou des autres suppositions que nous avons employées? Ne peut-elle pas dépendre des erreurs des approximations? C'est ce que les observations ultérieures et de nouvelles recherches pourront faire connaître.

Nous allons maintenant comparer les intervalles observés des marées, à la formule (N) du chapitre précédent. Cette formule donne les résultats numériques suivans:

Retards calculés. Retards observés en temps moyen.

		-
Syzygies équinoxiales	0,024506	 0,25918
Syzygies solsticiales	0,029047	 0,28615
Quadratures équinoxiales	0,065320	 0,05761
Quadratures solsticiales	0,046187	 0,04668
		30.

La réduction des retards en temps moyen a été faite en observant que dans les équinoxes, le jour moyen surpasse le jour vrai, de 0',000218, et que dans les solstices, le jour vrai surpasse le jour moyen, de 0',000238.

Le retard journalier des marées est augmenté quand la parallaxe lunaire augmente, et il est diminué quand elle diminue. Les heures observées des marées du premier et du second jour après la syzygie, ont donné dans les syzygies périgées considérées ci-dessus, 0<sup>1</sup>,02899; et dans les syzygies apogées, 0<sup>1</sup>,02227. La formule (N) du chapitre précédent donne 0<sup>1</sup>,02878 et 0<sup>1</sup>,01912.

Herinage of the neuvelles rechtrebes hautene Plan course

# CHAPITRE V.

Des flux partiels dont la période est à peu près d'un jour.

12. Ces flux étant fort peu considérables à Brest, on peut négliger dans leur expression, les quantités très petites. Ils dépendent des sinus de  $nt + \varpi$  et  $nt + \varpi - 2\varphi$ , dans l'expression des forces données dans le chapitre II. Si l'on néglige le cube de sin  $\varepsilon$ , l'expression de l'action solaire relative à ces flux sera

$$\frac{3L}{2r^3} \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta \cdot \left\{ \frac{\sin \epsilon \cdot \sin (nt + \varpi)}{-\sin \epsilon \cdot \sin (nt + \varpi - 2\varphi)} \right\}.$$

Elle produit deux flux partiels que nous pouvons exprimer par

H. 
$$\sin \epsilon \cdot \sin (nt + \varpi - F) - H_1 \cdot \sin \epsilon \cdot \sin (nt + \varpi - 2mt - F_1)$$
,

H, F, H, et F, étant des constantes arbitraires. L'action lunaire produit pareillement deux flux partiels que nous pouvons exprimer par

$$H' \cdot \sin \epsilon' \cdot \sin (nt + \varpi - F') - H' \cdot \sin \epsilon \cdot \sin (nt + \varpi - 2m't - F_1')$$

On doit observer que l'on a

$$H' = \frac{HL'}{L} \cdot \frac{r^3}{r^{73}}.$$

Au moment de la pleine mer syzygie du soir à Brest, on a par le chapitre II,

$$2nt + 2\varpi - 2mt - 2\lambda = 2i\pi + 2l,$$
  
 $2nt + 2\varpi - 2m't - 2\lambda' = 2i'\pi + 2l';$ 

on a ensuite

$$t = T + y + t'',$$

 $\gamma$  étant égal à  $\frac{\lambda'-\lambda}{m'-m}$ . Les flux partiels dont la période est à peu près d'un jour, seront ainsi

H. 
$$\sin \epsilon \cdot \sin (\lambda + mT + my - F + l + mt'')$$
  
— H<sub>1</sub>.  $\sin \epsilon \cdot \sin (\lambda - mT - my - F + l - mt'')$   
+ H'.  $\sin \epsilon' \cdot \sin (\lambda + mT + my - F' + l + mt'')$   
— H<sub>1</sub>'.  $\sin \epsilon' \cdot \sin [\lambda - (2m' - m)y - 2(m' - m)T - mT - F_1' - (2m' - m)t'' + l]$ .

Dans les syzygies solsticiales d'été, 2(m'-m)T est nul, ou un multiple de la circonférence, et  $mT = \frac{\pi}{2}$ ; l'expression précédente se transforme par là dans celle que l'on obtient en y faisant T nul, en changeant le signe sin. dans le signe cos., et en donnant le signe + au second et au quatrième termes. Si l'on développe cette expression ainsi transformée, dans une série ordonnée par rapport aux puissances de t'' et de l, et à leurs produits; la partie indépendante de ces quantités sera l'expression du flux dont la période est d'un jour, au moment du maximum de la marée dont la période est d'un demi-jour. Donnons à cette expression, la forme

 $M \cdot \sin \lambda + N \cdot \cos \lambda$ .

On aura, à fort peu près, l'expression de ce flux au moment de la basse mer du matin, en changeant  $\lambda$  en  $\lambda - \frac{\pi}{2}$ , ce qui donne

-M. cos 
$$\lambda$$
 + N. sin  $\lambda$ ;

et l'on aura à peu près l'expression du même flux, au moment de la haute mer du matin, en changeant  $\lambda$  en  $\lambda - \pi$ , ce qui donne

$$-M.\sin\lambda - N\cos\lambda$$
.

Dans les solstices d'hiver où  $m'T = 3\pi$ , toutes ces expressions changent de signe.

Exprimons l'ensemble des flux partiels dont la période est à peu près d'un jour, par

 $R.\cos(nt+\varpi-mt-\lambda_i)$ 

comme on peut le faire pendant le jour du maximum de la marée semi-diurne. A, sera l'heuré de ce flux, le soir. Au moment de la

pleine marée du soir à Brest, au solstice d'été; ce flux d'un jour, sera R.  $\cos(\lambda - \lambda_1)$ , en substituant pour  $nt + \varpi$ , sa valeur  $\lambda + mt$ . Au moment de la basse mer du matin, ce flux sera R.  $\sin(\lambda - \lambda_1)$ ; et au moment de la pleine mer du matin, il sera - R.  $\cos(\lambda - \lambda_1)$ .

Pour comparer ces résultats aux observations, on a pris dans quarante-trois syzygies solsticiales d'été, l'excès de la haute mer du soir sur la haute mer du matin, du premier et du second jour après la syzygie, et l'on a obtenu 14mc, 706 pour la somme de ces excès dans les quatrevingt - six jours d'observations. On a pris semblablement, dans trente syzygies solsticiales d'hiver, l'excès de la haute mer du matin sur la haute mer du soir, du premier et du second jour après la syzygie, et l'on a obtenu 10<sup>ma</sup>,798 pour la somme de ces excès dans les soixante jours d'observation. En ajoutant cette somme à la précédente, et en la divisant par 60 + 86, le quotient o<sup>m</sup>, 1755 sera la valeur de  $2R.\cos(\lambda - \lambda_1)$ . Le maximum de la marée semi - diurne tombant à très peu près à l'instant du minuit qui sépare le premier, du second jour après la syzygie; la variation de cette marée est très petite, et devient presque insensible dans la somme des excès dont je viens de parler; car la marée du soir du premier jour est plus rapprochée de l'instant du maximum, que la marée du soir du second jour; mais aussi la marée du matin du premier jour est plus éloignée de cet instant, que celle du second jour; en sorte que la variation de la marée semi-diurne augmente, dans le premier jour qui suit la syzygie, l'excès de la haute mer du soir sur la haute mer du matin, et le diminue dans le second jour. L'effet de cette variation est ainsi très petit dans la somme de ces excès : il serait nul, si l'on considérait autant de solstices d'été que de solstices d'hiver; et j'ai reconnu que cet effet est insensible dans les observations précédentes où l'on a considéré 46 solstices d'été et 30 solstices d'hiver.

J'ai trouvé dans le n° 28 du quatrième Livre, la valeur de 2R.cos (λ — λ), égale à o<sup>m</sup>,183. J'avais considéré dans les observations anciennes des marées à Brest, dix-sept syzygies solsticiales d'été, qui, traitées comme les précédentes, m'avaient donné 6<sup>m</sup>,131 pour la somme des excès des marées du soir sur celles du matin, dans les trente-quatre jours d'observations. Onze syzygies solsticiales d'hiver m'avaient donné 4<sup>m</sup>,109 pour la somme des excès des hautes mers du matin sur celles du soir, dans les vingt-deux jours d'observations. En ajoutant ces deux

sommes aux deux précédentes données par les observations nouvelles, on a  $35^m$ ,744, qui, divisé par 202, somme des jours d'observations, donne  $0^m$ ,17694 pour la valeur de 2R.cos ( $\lambda - \lambda_1$ ).

Pour avoir la valeur de  $2R \cdot \sin(\lambda - \lambda_1)$ , on a pris, dans 23 syzygies solsticiales d'été, les excès des basses mers du matin sur celles du soir, du premier et du second jour après les syzygies, et l'on a trouvé  $5^m$ ,394 pour la somme de ces excès, qui, divisée par 46, nombre des jours d'observations, a donné  $0^m$ ,117 pour la valeur de  $2R \cdot \sin(\lambda - \lambda_1)$ . Mais ici la variation des basses mers semi-diurnes a un effet sensible et que je trouve à peu près égal à  $0^m$ ,009, qu'il faut ajouter à la valeur précédente qui devient par là  $0^m$ ,126.

On peut obtenir encore cette valeur, de la manière suivante : Dans le n° 5, on a considéré l'ensemble des syzygies solsticiales d'hiver et d'été. J'ai prié M. Bouvard de calculer séparément les syzygies solsticiales d'été et les syzygies solsticiales d'hiver : il a trouvé pour les premières

$$f = 323,741$$
,  $f' = 344,697$ ,  $f'' = 354,807$ ,  $f''' = 354,301$ ,  $f^{17} = 341,460$ ,  $f^{7} = 319,397$ ;

et il en a conclu, pour l'expression générale des valeurs de f,

$$355^{m}$$
,  $7746 - 5$ ,  $4875 (t - 2, 41582)^{2}$ ;

d'où il a conclu

$$2i\alpha' = 355^{m},8503,$$
  
 $2i6' = 5,4875.$ 

Les syzygies solsticiales d'hiver lui ont donné

$$f = 321,640$$
,  $f' = 346,389$ ,  $f'' = 359,844$ ,  $f''' = 358,540$ ,  $f'' = 349,517$ ,  $f' = 329,496$ ;

et pour l'expression de ces valeurs

$$360,6612 - 5,6029.(t - 2,62075)^2;$$

d'où il a conclu

$$2i\alpha' = 360,7488,$$
  
 $2i6' = 5,6029.$ 

La somme des excès des pleines mers du soir sur les basses mers du

matin, dans les 64 syzygies solsticiales d'été, et réduits à leur maximum, a été 355,7746. Dans les 64 syzygies solsticiales d'hiver, cette somme a été 360,6612; elle a donc surpassé la somme précédente, de 4,8866, qui, divisé par 64, donne pour la différence relative à chaque syzygie, 0,07635. Au solstice d'hiver, le Soleil est plus près de la Terre que dans sa moyenne distance, d'une quantité à fort peu près égale au soixantième de cette distance: son action est donc augmentée de la quantité

Q étant, comme dans le n° 3, la somme des carrés des cosinus de la déclinaison du Soleil dans les 128 syzygies d'été et d'hiver : elle est diminuée de la même quantité dans les syzygies du solstice d'été : la différence de ces deux actions est donc

$$2R.\cos(\lambda - \lambda_i) - 2R.\sin(\lambda - \overline{\lambda_i});$$

L'action de la Lune produit deux flux semblables, que l'on anob a no

$$0,13924 - 2R.\cos(\lambda - \lambda_1) + 2R.\sin(\lambda - \lambda_1) = 0,07635$$

En substituant pour  $2R \cdot \cos(\lambda - \lambda_1)$  sa valeur 0,17694, on a

$$2R \cdot \sin(\lambda - \lambda_1) = 0,11405$$
;

poserons encore la densité 
$$\rho$$
 de la Terre égale : étant  $r$ ; enfin on a ,  $602160 = (1 \text{ A} - \text{A})$  nie.  $9200 = 100$ 

Les valeurs de 2R. cos.  $(\lambda - \lambda_i)$  et de 2R. sin  $(\lambda - \lambda_i)$  donnent

et nous ferons 
$$e'=e$$
,  $\frac{12030}{4697i}$  =  $(16000)$   $(1600)$   $(1600)$   $(1600)$   $(1600)$   $(1600)$   $(1600)$ 

MÉCAN. CÉL. Tome V.

d'où l'on tire l'angle à - à, qui, réduit en temps à raison de la circonférence entière pour un jour, devient o',005; c'est le temps dont le flux d'un jour précède le moment des maxima des marées du soir d'un demi-jour; et comme ce moment est o',688, l'heure correspondante de la pleine mer du flux partiel sera o 503. La valeur de 2R est o 2134 : cette valeur n'est pas la vingtième partie de la hauteur de la marée semi diurne, et qui, dans les 128 syzygies solsticiales, a donné 716,402, ou 5,60 par syzygie. Ainsi, quoique les deux forces qui produisent ces deux flux soient presque égales entre elles, à Brest, l'effet des circonstances est beaucoup plus grand sur le flux semi-diurne que sur le flux diurne. Pour mieux juger de ces effets, nous allons déterminer ces deux flux, en supposant avec Newton, la mer en équilibre à chaque instant sous l'astre qui l'attire. Nous avons donné dans le n° 12 du quatrième Livre, les expressions de ces flux : celle du flux diurne relatif à l'action du Soleil est

$$\frac{3L}{r^3g.\left(1-\frac{3}{5\rho}\right)}.\sin\rho.\cos\alpha.\sin\theta.\cos\theta.\cos(nt+\varpi-\psi).$$

En substituant pour et Q leurs valeurs trouvées dans le n° L'expression correspondante du flux semi-diurne est cette différence est 0,13024; mais elle est dimmuce par le flux solau diurne, de (
$$\sqrt{2}$$
  $\sqrt{2}$   $\sqrt{2$ 

L'action de la Lune produit deux flux semblables, que l'on obtient en accentuant les lettres Lin, iv, 4. + (1/4 - 1) 200. As - 15081.0

On a par le n° 11 du Livre IV,

En substituant pour 2h. cos (
$$\lambda - \lambda$$
) so valeur ou  $\frac{3L}{r^3g} = o^{mc} \cdot 98528$ .

2h. sin  $\frac{3L}{r^3g} = o^{mc} \cdot 98528$ .

MECAN. CÉL. Tome V.

Nous prendrons ensuite pour cos²v, la valeur de Q du n° q, divisée par 128; on a de plus dégal à fort peu près au complément de la latitude de Brest, ou, en degrés sexagésimaux, égal à 41°36′46″. Nous supposerons encore la densité p de la Terre égale à 5, celle de la mer étant 1; enfin on a, par le no 9, 1 - 1) nie. Ac

Les valeurs de 2R. 
$$\cos \frac{L}{r^3}$$
.  $\cos \frac{L}{r^3}$ .  $\cos \frac{L}{r^3}$ . donnent

et nous ferons v' = v, ce qui est exact à très peu près. Cela posé, les

doubles des coefficiens de cos  $(nt + \varpi - \checkmark)$  et de cos  $(2nt + 2\varpi - 2\checkmark)$ , dans les expressions précédentes, ajoutés aux doubles des mèmes coefficiens relatifs à la Lune, seront respectivement dans les syzygies,

Ces nombres sont les hauteurs des pleines mers syzygies des deux flux diurne et semi-diurne : les hauteurs observées sont

Ainsi, par l'effet de la rotation de la Terre et des circonstances accessoires, le flux diurne est réduit à peu près au tiers, tandis que le flux semi-diurne devient 16 fois plus grand. Au reste, cette grande différence ne doit point surprendre, si l'on considère que, par le quatrième Livre, la rotation de la Terre détruit dans une mer partout également profonde, le flux diurne; et que, si la profondeur de la mer est du rayon terrestre, ou d'environ neuf mille mètres, la hauteur de la marée semi-diurne dans les syzygies est de onze mètres.

Déterminons présentement l'effet du flux diurne sur les marées quadratures équinoxiales. Par ce qui a été dit dans le chapitre H, sur les marées quadratures du matin; on a, pour ces marées,

cet excès est o", 1203; ce qui dex 
$$\varphi - \varphi + tn$$

Le flux diurne devient ainsi, au moment du minimum de la marée quadrature, donne donne donne de la précédente de la précédente donne de la précédente de la p

Le flux diurne de la basse mer du soir qui suit la haute mer du matin.

Le flux diurne de la basse mer du soir qui suit la haute mer du matin.

H. 
$$\lambda = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi$$

F, doit peu différer de F, à cause de la lenteur du mouvement du Soleil, comparé à celui de la Lune; les deux premiers termes de cette fonction se détruisent donc à fort peu près dans les équinoxes. Dans les quadratures des équinoxes d'automne, on a mT égal à  $\pi$ , et 2(m'T-mT) égal à  $\pi$  ou à  $3\pi$ ; les deux derniers termes deviennent

$$H' \cdot \sin \varepsilon' \cdot \cos (\lambda - F' + m\gamma) + H' \cdot \sin \varepsilon' \cdot \cos [\lambda - F', -(2m' - m)\gamma];$$

et il est facile de voir qu'ils sont les mêmes que dans les syzygies des solstices d'été. Donnons-leur cette forme

$$M' \cdot \sin \lambda + N' \cdot \cos \lambda$$

Dans les quadratures de l'équinoxe du printemps, cette quantité prend un signe contraire.

Dans les syzygies des solstices d'été, le flux diurne, au moment de la haute mer du soir, est, par ce qui précède,

ne doit point suprendre 
$$\kappa \cos N + \sin M$$
 que, par le quatrieme

Au moment de la haute mer du matin, il prend un signe contraire. L'excès de l'un sur l'autre, qui, par l'observation, est o", 1796, donne donc

2M. 
$$\sin \lambda + 2N \cdot \cos \lambda = 0^m$$
, 1796.

Determinons présentement l'ellet du flux diurne sur les marées quadratures équinox its sios de la basse mer du matin sur celle du soir est les marées qui de la basse mer du matin sur celle du soir est les marées qui de la la commanda de la commanda del commanda del commanda de la commanda de la commanda de la commanda

cet excès est om, 1203; ce qui donne o -- to

$$-2M.\cos\lambda + 2N.\sin\lambda = 0^m, 1203.$$

Cette équation ajoutée à la précédente, donne

$$2M.\cos(\sin \lambda - \cos \lambda) + 2N.(\sin \lambda + \cos \lambda) = 0^m,2999.$$
 (a)

Le flux diurne de la basse mer du soir qui suit la haute mer du matin, dans une quadrature d'automne, est

Ainsi ce flux étant, au moment de la haute mer,

$$M' \cdot \sin \lambda + N' \cdot \cos \lambda$$
,

son exces sur sa valeur au moment de la basse mer suivante, sera

$$M'.(\sin \lambda - \cos \lambda) + N'.(\sin \lambda + \cos \lambda);$$

et il l'emporte sur la même différence dans une quadrature du printemps, de la quantité

$$2M' \cdot (\sin \lambda - \cos \lambda) + 2N' \cdot (\sin \lambda + \cos \lambda)$$
.

En comparant cette quantité au premier membre de l'équation (a), en voit qu'elle doit être positive; et si l'on supposait les rapports de M et N à M' et N', égaux à celui de la somme des actions lunaire et solaire à l'action lunaire, rapport qui, par le chapitre III, est celui de 3,35 à 2,35, ce qui ne peut être regardé que comme un simple aperçu; les hautes mers, dans les quadratures d'automne, surpasseraient celles du printemps, de o<sup>m</sup>,21. Mais cette évaluation indique seulement la supériorité des marées quadratures d'automne sur les marées semblables du printemps: c'est en effet ce que l'observation confirme. M. Bouvard a calculé séparément les hauteurs des marées quadratures du printemps et celles des marées quadratures d'automne, dont il avait considéré l'ensemble; et il a trouvé relativement aux premières,

$$f = 189,282$$
,  $f' = 149,468$ ,  $f'' = 154,658$ ,  $f''' = 200,791$ ; d'où il a conclu par les procédés du chapitre III, la formule

$$146,4858 + 21,4867.(t - 1,4076)^{\circ};$$

ce qui lui a donnée de la distance d

$$2i\alpha'' = 146,1503$$
,  $2i6'' = 21,4867$ .

Les mêmes procédés, appliqués aux marées quadratures d'automne, lui ont donné

$$f = 204,797$$
,  $f' = 162,546$ ,  $f'' = 158,369$ ,  $f''' = 195,376$ .

$$155,3712 + 19,8145.(t - 1,5818)^2$$

et

$$2i\alpha'' = 155,0616$$
,  $2i6''' = 19,8145$ .

La différence des deux valeurs de 2ia" est 8<sup>m</sup>,9113; cette différence divisée par 64, nombre des quadratures de l'équinoxe d'automne, donne 0,140, à fort peu près, pour la supériorité d'une marée quadrature d'automne sur celle du printemps.

# The comperent cette , IVit BRITRE on comperent cette doi: dire positive; et si l'on supposait les rapports

2M'. (sin A - cos A) + 2M'. (sin A + cos A).

Des flux partiels qui dépendent de la quatrième puissance inverse de la distance de la Lune à la Terre.

raient celles du printemps, de ortes Mais cette évaluation indique seulement la supériorité des marées quadratures d'attonne sur les

On sait par la théorie des probabilités, que le grand nombre des observations peut suppléer leur précision, pour reconnaître des inégalités beaucoup moindres que les erreurs dont elles sont susceptibles. J'ai donc pensé que les flux dépendans des différences de l'action de la Lune dans les nouvelles Lunes, à son action dans les pleines Lunes; et de son action dans les quadratures boréales, à son action dans les quadratures australes, pouvaient devenir sensibles dans l'ensemble des nombreuses observations des marées, que M. Bouvard a discutées. Ces flux sont produits par les termes de l'expression de l'action lunaire qui sont divisés par la quatrième puissance de la distance de la Lune à la Terre. Les termes divisés par le cube de cette distance, les seuls que l'on ait considérés jusqu'ici, ne donnent aucune différence entre les flux lunaires des nouvelles Lunes et les flux lunaires des pleines Lunes. Les termes divisés par la quatrième puissance de la distance lunaire, sont, par le n° 26 du troisième Livre,

$$\frac{5}{2} \cdot \frac{\mathbf{L}'}{r'^4} \cdot \left\{ \frac{\left[\cos\theta \cdot \sin\phi' + \sin\theta \cdot \cos\phi' \cdot \cos\left(nt + \varpi - \psi'\right)\right]^3}{-\frac{3}{5} \cdot \left[\cos\theta \cdot \sin\phi' + \sin\theta \cdot \cos\phi' \cdot \cos\left(nt + \varpi - \psi'\right)\right]} \right\} \cdot (p)$$

On peut, dans le développement de cette fonction, négliger les termes qui dépendent de l'angle  $nt + \varpi - \psi'$ ; parce qu'il résulte du chapitre précédent, que les flux partiels relatifs à cet angle, sont très petits dans le port de Brest et deviennent insensibles, lorsqu'ils sont divisés par la distance r' de la Lune à la Terre. Nous allons d'abord considérer le terme dépendant de l'angle  $3nt + 3\varpi - 3\psi'$ ; ce

On verra de la même manière, que dens les pleines ten emretti

energiaco di junto, and see zo lee à elucie xidl es 
$$\pi$$
 à less des  $\phi - \phi$   $\frac{5}{8} \cdot \frac{L'}{r'^4} \cdot \sin^3\theta \cdot \cos^3\phi' \cdot \cos \left[3nt + 3\varpi - 3\psi - 3(\psi' - \psi)\right].$ 

En substituant pour sin e', cos e', sin  $\phi'$  et cos  $\phi'$ , leurs valeurs données dans le chapitre II, on voit que ce terme produit un flux partiel de la forme

G. 
$$\cos \left[3nt + 3\omega - 3\phi - 3(\phi' - \phi) - 3Q\right]$$

G et Q étant des constantes que l'observation seule peut déterminer. Les autres flux partiels dépendans de l'angle  $3nt+3\varpi-3\varphi$ , sont multipliés par le carré du sinus de l'inclinaison  $\varepsilon'$  de l'orbite lunaire à l'équateur; ils sont peu considérables, et produisent la différence entre les observations équinoxiales et les observations solsticiales. On y aurait égard en considérant l'inégalité

G. 
$$\cos \left[ 3nt + 3\varpi - 3\varphi - 3(\varphi' - \varphi) - 3Q \right]$$
Dans le premier quartier,  $\varphi' - \varphi$  est égal  $n = 1$  excès de la haute

comme représentant l'inégalité relative aux équinoxes, et en la multitipliant par  $\cos^3 \rho'$ , pour la rapporter aux solstices; ce qui diminuerait d'un cinquième à peu près la valeur de G dans les solstices; mais peut-être, cette correction n'est pas suffisante. Dans les nouvelles Lunes équinoxiales,  $\rho' - \rho$  est nul. De plus, au moment de la haute mer du soir,  $nt + \varpi - \varphi$ , ou l'angle horaire du Soleil est  $\lambda$ ; l'inégalité précédente devient ainsi

c'est la quantité que ce flux partiel ajoute à la hauteur de la pleine mer du soir, à Brest. Pour avoir sa valeur dans la basse mer du matin qui la précède, il faut changer  $\lambda$  en  $\lambda - \frac{\pi}{2}$ , ce qui donne

$$-G.\sin(3\lambda - 3Q);$$

$$(OE - AE)\cos DE + (OE - AE)\sin DE$$

ce flux ajoute donc à l'excès de la haute mer du soir à Brest, dans les nouvelles Lunes, sur la basse mer qui précède, la quantité

$$G \cdot \cos(3\lambda - 3Q) + G \cdot \sin(3\lambda - 3Q)$$
.

On verra de la même manière, que dans les pleines Lunes où  $\varphi' - \varphi$  est égal à  $\pi$ , ce flux ajoute à cet excès, une quantité contraire

$$-G.\cos(3\lambda - 3Q) - G.\sin(3\lambda - 3Q);$$

ce flux doit donc, s'il est sensible, se manifester dans la différence d'un grand nombre de ces excès, dans les nouvelles Lunes et dans les pleines Lunes.

Ce même flux doit se manifester encore dans les observations des marées quadratures. Dans ces observations, on a déterminé l'excès de la hauteur de la pleine mer du matin sur la basse mer du soir; l'inégalité précédente devient, au moment de la pleine mer du matin,

G. cos 
$$\left[3\left(\lambda-\frac{\pi}{2}\right)-3Q-3(\varphi'-\varphi)\right];$$

et au moment de la basse mer du soir, elle devient

G. cos 
$$[3\lambda - 3Q - 3(\varphi' - \varphi)]$$

Dans le premier quartier,  $\phi' - \phi$  est égal à  $\frac{\pi}{2}$ ; l'excès de la haute mer du matin sur la basse mer du soir est donc

$$= -G \cdot \cos(3\lambda - 3Q) + G \cdot \sin(3\lambda - 3Q).$$

Cet excès prend un signe contraire dans le second quartier où

$$\frac{5}{2} = \frac{5}{2} = \frac{5}{2} = \frac{5}{2}$$
 du Soleil est  $\lambda$ ; l'inégalité

Dans les quadratures solsticiales, la Lune est près de l'équateur; dans les quadratures équinoxiales, elle est vers son maximum de déclinaison. La différence entre les marées quadratures du premier quartier et celles du second quartier, doit donc être plus petite dans les équinoxes que dans les solstices.

L'excès d'une marée d'une nouvelle Lune, sur celle d'une pleine Lune, est

 $2G.\sin(3\lambda-3Q)+2G.\cos(3\lambda-3Q);$ 

nommons É cet excès. L'excès d'une marée du premier quartier sur une marée du second quartier est

$$2G \sin (3\lambda - 3Q) - 2G \cdot \cos (3\lambda - 3Q);$$

nommons E' cet excès: on aura xinamizadaso abresto des

$$\tan (3\lambda - 3\overline{Q}) = \frac{E + E'}{E - E'},$$

$$G = \frac{E}{2\sqrt{2}} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{E'}{E}\right)^2}.$$

Pour comparer ces résultats aux observations, M. Bouvard a fait la somme des hauteurs des pleines mers du soir, au dessus des basses mers du matin du jour de la syzygie et des trois jours suivans, dans les soixante-quatre nouvelles Lunes équinoxiales qu'il avait considérées, et il a trouvé cette somme égale à 1583,594. Le même calcul, relatif aux 64 pleines Lunes équinoxiales, lui a donné pour cette somme 1583,594+21,419. Les pleines mers des Lunes solsticiales lui ont donné les sommes

Ainsi les marées des pleines Lunes ont excédé les marées des nouvelles Lunes, tant dans les équinoxes que dans les solstices; et conformément à la théorie, cet excès a été plus grand dans les équinoxes que dans les solstices.

Les hauteurs des pleines mers quadratures du matin, au-dessus des basses mers du soir du jour de la quadrature et des trois jours suivans, ont donné, relativement aux quadratures équinoxiales du premier et du second quartier de la Lune, les sommes

et relativement aux quadratures solstiales, les sommes

$$853,595$$
,  $853,595 - 20,542$ .

Conformément à la théorie, la différence est plus grande dans les quadratures solsticiales que dans les quadratures équinoxiales; mais une partie de cet excès est dû aux erreurs des observations. L'ensemble des différences dans les nouvelles et pleines Lunes équinoxiales et solsticiales est 128. E; et l'ensemble des différences, dans les quadratures équinoxiales et solsticiales est 128. E'; on a donc

$$128.E = -21,016 - 10,175,$$
  
 $128.E' = 5,605 + 20,542;$ 

MÉCAN. CÉL. Tome V.

d'où l'on tire, en degrés centésimaux, saus no : 20020 100 'I anommon

$$3\lambda + 3Q = 5^{\circ},59$$
,  
 $G = -0^{m},11681$ .

Un aussi petit flux exige un plus grand nombre d'observations pour être déterminé avec exactitude; mais son existence est indiquée par les observations précédentes, avec une grande probabilité.

Considérons maintenant les termes de la fonction (p) dépendans de l'angle  $2nt + 2\varpi - 2\sqrt{\prime}$ ; ces termes résultant du développement de la quantité

. holds 
$$\frac{15}{2}$$
 L'  $\frac{1}{r'^4}$ ,  $\cos\theta'$ .  $\sin\varphi'$ .  $\sin^2\theta$ .  $\cos^2\varphi'$ .  $\cos^2$ .  $(nt + \varpi - \psi')$ ; and independent

ils correspondent aux termes de l'expression de l'action lunaire, divisés par le cube de la distance r' de la Lune, et qui, par le second chapitre, sont le développement de la quantité

-uon esb see 
$$\frac{\pi}{2}$$
  $\frac{L}{73}$   $\sin^2\theta$   $\cos^2\varphi'$   $\cos^2(nt+\varpi+\sqrt{1})$  . (a) Leading Figure 1 and  $\cos^2\varphi'$   $\cos^2(nt+\varpi+\sqrt{1})$ 

Si l'on suit l'analyse du chapitre cité, et si l'on observe que sin o' est égal à sin ε' .sin φ', φ' étant la longitude de la Lune, comptée de l'intersection de son orbite avec l'équateur; on voit qu'il en résulte dans la hauteur de la marée à Brest, soit dans les syzygies solsticiales, soit dans les quadratures équinoxiales, une quantité égale à ± F; le signe supérieur se rapportant à la déclinaison boréale de la Lune, et le signe inférieur à sa déclinaison australe. L'observation peut seule déterminer la constante F. Si les flux partiels avaient, relativement à la latitude  $\frac{\pi}{2}$  —  $\theta$  du port, le même rapport que les forces; la valeur de F serait à la partie de la hauteur de la mer, due à l'action de la Lune, à peu près dans le rapport de  $\left|\frac{15}{2r'}\right|$ . cos  $\theta$ . sin  $\epsilon'$  à  $\frac{3}{2}$ . Mais nous avons remarqué dans le premier chapitre, que chaque flux partiel étant la résultante de tous les flux semblables qui émanent de chaque point de la surface de la mer, et qui recoivent un nombre presqu'infini de modifications avant que de parvenir dans le port de Brest; la résultante n'a point avec la latitude de Brest, le même rapport que les forces productrices de ce flux : elle peut même avoir un signe con-

Меськ. сец. Тото И.

traire à celui que ces forces indiquent, en sorte que l'observation peut seule le faire connaître. Pour cela, M. Bouvard a séparé, dans le calcul des syzygies solsticiales, les marées où la déclinaison de la Lune était australe, des marées où la déclinaison de la Lune était boréale, et il a fait sur ces marées ainsi séparées, le même calcul qu'il avait fait sur leur ensemble, et dont nous avons donné le résultat dans le troisième chapitre; il a fait le même calcul relativement aux quadratures équinoxiales, et il a formé la Table suivante:

### TABLE XVIII. sallib see ob obnoods at

Marées syzygies solsticiales. Lune australe.

$$f = 326,701$$
;  $f' = 348,393$ ;  $f'' = 362,051$ ;  
 $f''' = 361,672$ ;  $f^{1v} = 350,733$ ;  $f^{v} = 329,636$ .  
 $362,8222 - 5,5778 (t - 2,5621)^{2}$   
 $362,9096 = 2ia',55778 = 2i6'$ .

Marées syzygies solsticiales. Lune boréale.

$$f = 318,782$$
;  $f' = 342,724$ ;  $f'' = 352,605$ ;  $f''' = 350,299$ ;  $f''' = 340,006$ ;  $f'' = 319,253$ .
$$353,1223 - 5,4316 (t - 2,4784)^{2}$$

$$353,2072 = 2i\alpha', 5,4316 = 2i\delta''.$$

Marées quadratures équinoxiales. Lune australe.

$$f = 199,704$$
;  $f' = 160,878$ ;  $f'' = 161,350$ ;  $f''' = 201,089$ .  
 $156,2010 + 19,6412 (t - 1,4882)^2$   
 $155,3925 = 2ia''$ ,  
 $19,6412 = 2i6''$ .

Marées quadratures équinoxiales. Lune boréale.

$$f = 194,418;$$
  $f' = 151,304;$   $f'' = 151,616;$   $f''' = 195,106.$   
 $146,0466 + 21,6510 (t - 1,4945)^2.$ 

145,7077 = 2ia'', 21,6510 = 2i6''. 32...

On voit d'abord, par cette Table, que l'action de la Lune australe sur la mer l'emporte sur l'action de la Lune boréale. La valeur de 2F est donnée, soit par la différence des valeurs de 2ia', relatives aux marées syzygies solsticiales, soit par la différence des valeurs de 2ia'', relatives aux marées quadratures. La première de ces différences donne

in the second of the second s

parce qu'il y a 128 syzygies solsticiales. La seconde de ces différences donne

128.F = -9,6848.

L'accord de ces valeurs de 128.F ne permet pas de douter que l'action lunaire australe sur l'Océan, l'emporte sur l'action lunaire boréale.

16. 666 4 21. 6510 (1 - 1. 1645) 5 - 1 - 165

a trois heures du soin, elle sern

### CHAPITRE VII.

Du flux et reflux de l'atmosphère.

Les observations dont j'ai fait usage, correspondant à toutes les saisons; les flux lunaires partiels qui dépendent des déclinaisons de la Lune et de sa parallaxe disparaissent dans l'ensemble de ces observations. Le flux lunaire atmosphérique peut alors s'exprimer comme celui de la mer, par la formule

R. 
$$\cos \left[2nt + 2\varpi - 2mt - 2\left(m't - mt\right) - 2\lambda'\right]$$

R et  $\lambda'$  étant des constantes indéterminées; mt est le moyen mouvement du Soleil pendant le temps t; m't est celui de la Lune; nt est la rotation de la Terre;  $\varpi$  est la longitude du lieu: tous ces angles sont comptés de l'équinoxe du printemps.  $nt+\varpi-mt$  est l'angle horaire du Soleil, que nous ferons partir de midi. Cet angle réduit en temps, à raison de la circonférence entière pour un jour, sera le temps compté depuis midi;  $\lambda'$  sera ainsi, l'heure du maximum du flux atmosphérique du soir: R dépend de l'action de la Lune sur l'atmosphère, soit directe, soit transmise par la mer.

Si l'on suppose que la syzygie arrive à midi, ce que l'on peut admettre ici sans erreur sensible, comme le résultat moyen des heures de toutes les syzygies considérées; la formule précédente donne  $R.\cos 2\lambda'$  pour la hauteur du flux au midi du jour de la syzygie. En désignant par q le mouvement synodique de la Lune dans un jour; la hauteur du flux à neuf heures du matin du jour de la syzygie sera

$$-\mathrm{R.sin}\left(2\lambda'-\frac{q}{4}\right);$$

à trois heures du soir, elle sera

$$+ R \cdot \sin \left(2\lambda' + \frac{q}{4}\right)$$

Soient donc A, A', A", les hauteurs observées du baromètre, le jour de la syzygie, à neuf heures du matin, à midi, à trois heures du soir; on aura

$$C - R \cdot \sin\left(2\lambda' - \frac{q}{4}\right) = A;$$

$$C' + R \cdot \cos 2\lambda' = A';$$

$$C'' + R \cdot \sin\left(2\lambda' + \frac{q}{4}\right) = A'',$$

C, C', C'' étant les hauteurs du baromètre, qui auraient lieu sans l'action de la Lune. Ces équations subsistent également pour le jour de la quadrature, pourvu que l'on y change R en —R; et A, A', A'', dans B, B', B''; ces trois dernières lettres exprimant respectivement les hauteurs du baromètre, observées, le jour de la quadrature, à neuf heures du matin, à midi, et à trois heures du soir.

Ces six équations donnent les deux suivantes,

$$4R \cdot \cos \frac{q}{4} \sin 2\lambda' = A'' - A + B - B'';$$

$$4R \cdot \left(1 - \sin \frac{q}{4}\right) \cdot \cos 2\lambda' = 2A' - (A + A'') - 2B + (B + B'').$$

Ces deux équations sont indépendantes des hauteurs absolues du baromètre : elles n'emploient que les différences A - A', A - A'', A' - A'' du jour de la syzygie, et les différences correspondantes du jour de la quadrature.

Le jour  $i^{eme}$  après chaque syzygie, et après chaque quadrature, donne les deux équations suivantes :

$$4R \cdot \cos \frac{q}{4} \cdot \sin (2\lambda' + 2iq) = A''_{i} - A_{i} + B_{i} - B''_{i},$$

$$4R \cdot \left(1 - \sin \frac{q}{4}\right) \cdot \cos (2\lambda' + 2iq) = 2A'_{i} - (A_{i} + A''_{i}) - 2B'_{i} + (B_{i} + B''_{i}),$$

A<sub>i</sub>, A'<sub>i</sub>, etc., B<sub>i</sub>, B'<sub>i</sub>, etc., sont les valeurs de A, A', etc., B, B', etc.,

relatives à ce ieme jour : i est négatif pour les jours qui précèdent la syzygie ou la quadrature.

On peut conclure des observations de chaque jour, les valeurs de R et de  $\lambda'$ . Mais il y a des jours plus propres à déterminer l'une de ces inconnues. La méthode que j'ai désignée sous le nom de méthode la plus avantageuse, combine toutes les équations de manière à donner les valeurs les plus probables des inconnues. Les deux équations du jour  $i^{cme}$  donnent en faisant

$$4R.\sin 2\lambda' = x, \quad 4R.\cos 2\lambda' = x; \quad x = 1$$

les suivantes,

$$x \cdot \cos \frac{q}{4} \cdot \cos 2iq + y \cdot \cos \frac{q}{4} \cdot \sin 2iq = A''_i - A_i + B_i - B''_i;$$

$$y \cdot \left(1 - \sin \frac{q}{4}\right) \cdot \cos 2iq - x \cdot \left(1 - \sin \frac{q}{4}\right) \cdot \sin 2iq$$

$$= 2A'_i - \left(A_i + A''_i\right) - 2B'_i + \left(B_i + B''_i\right).$$

Sin.  $\frac{q}{4}$  est une quantité très petite et à fort peu près égale à  $\frac{1}{19}$ . Si l'on néglige son carré et si l'on nomme  $F_i$ , la quantité

$$2A'_{i} - (A_{i} + A''_{i}) - 2B'_{i} + (B_{i} + B''_{i})$$

augmentée de sa dix-neuvième partic ; si l'on nomme pareillement E, la quantité

$$\mathbf{A}''_i - \mathbf{A}_i + \mathbf{B}_i - \mathbf{B}''_i;$$

les deux équations précédentes deviendront

$$x.\cos 2iq + y.\sin 2iq = E_i$$
,  
 $y.\cos 2iq - x.\sin 2iq = F_i$ .

En faisant i successivement égal à -1, 0, +1, +2; on aura huit équations qui, résolues par le procédé de la méthode la plus avantageuse, détermineront x et y. Mais cette méthode exige que l'on connaisse la loi des écarts des hauteurs du baromètre, de leur hauteur moyenne, dus aux causes irrégulières, pour les diverses heures du jour; ce que nous ignorons. Dans cet état d'incertitude, nous supposerons cette loi, la même pour les heures diverses; l'inexactitude de cette suppo-

sition n'ayant que peu d'influence sur les résultats cherchés. Alors, pour former les deux équations finales qui doivent donner x et y, il faut, suivant le procédé que j'ai donné dans le troisième supplément à ma Théorie analytique des Probabilités, multiplier chacune des quatre équations relatives à la lettre E, par trois, et par son coefficient de x; il faut multiplier chacune des équations relatives à la lettre F par son coefficient de y; enfin, il faut ajouter tous ces produits; ce qui donne

$$x.(8+\Sigma.\cos 4iq)+y.\Sigma\sin 4iq=3\Sigma.E_i\cos 2iq-\Sigma.F_i.\sin 2iq;$$

le signe  $\Sigma$  exprimant la somme de toutes les quantités qu'il affecte, et que l'on obtient en faisant successivement i=-1, i=0, i=1, i=2. En opérant de la même manière sur le coefficient de  $\gamma$ ; on aura la seconde équation finale

$$\gamma.(8-\Sigma.\cos 4iq)+x.\Sigma.\sin 4iq=3\Sigma.E_t.\sin 2iq+\Sigma.F_t\cos 2iq.$$

Toutes les syzygies et toutes les quadratures depuis le 1er octobre 1815, jusqu'au 1er octobre 1823, ont donné, en réduisant la colonne de mercure du baromètre à zéro de température,

$$A_{-1} = 755^{m},925$$
;  $A'_{-1} = 755,712$ ;  $A''_{-1} = 755,175$ .  
 $B_{-1} = 756$ ,315;  $B'_{-1} = 756,034$ ;  $B''_{-1} = 755,549$ .  
 $A = 756$ ,195;  $A' = 755,788$ ;  $A'' = 755,270$ .  
 $B = 756$ ,072;  $B' = 755,692$ ;  $B'' = 755,041$ .  
 $A_{1} = 755$ ,704;  $A'_{1} = 755,416$ ;  $A''_{1} = 755,010$ .  
 $B_{1} = 755$ ,296;  $B'_{1} = 755,015$ ;  $B''_{1} = 754,386$ .  
 $A_{2} = 755$ ,631;  $A'_{3} = 755,407$ ;  $A''_{3} = 754,955$ .  
 $A_{4} = 755$ ,575;  $A''_{5} = 755,322$ ;  $A''_{5} = 754,891$ .

De là on conclut

$$E_{-1} = +0^{m},016$$
;  $E_{0} = +0,105$ ;  $E_{1} = +0,216$ ;  $E_{2} = +0,008$ ,  $F_{-1} = +0,126$ ;  $F_{0} = +0,168$ ;  $F_{1} = -0,242$ ;  $F_{2} = +0,053$ .

On a ainsi les deux équations finales

$$10,18716.x + 0,99136.y = 1,076815;$$
  
 $4,51927.y + 0,99136.x = 0,027033.$ 

Vees vers les syzygies, l'on a s = 792, et la probabilité arit no'l no'l

$$x = 0,10743, \quad y = 0,017591.$$

L'étendue 2R du flux lunaire est égal à  $\frac{1}{2}$ .  $\sqrt{x^2 + y^2}$ ; elle est donc  $0, \frac{1}{2}$  of  $0, \frac{1}{2}$ 

On a

ce qui donne en degrés sexagésimaux

Cette valeur réduite en temps, donne pour l'heure sexagésimale du plus haut flux lunaire du jour de la syzygie, 3<sup>h</sup> 18' 36" du soir.

2. Déterminons maintenant la probabilité avec laquelle les observations précédentes indiquent un flux lunaire atmosphérique. Il résulte de ce que j'ai fait voir dans le n° 20 du second Livre de ma Théorie analytique des Probabilités, que si l'on prend un très grand nombre n de valeurs de la variation diurne du haromètre, que l'on divise leur nombre par n pour avoir la valeur moyenne, que l'on nomme e la somme des carrés des différences de cette valeur moyenne à chacune de ces valeurs; si l'on nomme ensuite ul'erreur moyenne d'un nombre considérable s de valeurs de la variation diurne; la probabilité de u sera proportionnelle à

 $\frac{n}{2e}.su^2$ 

c étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité. Le nombre n des observations diurnes comprises dans les observations précédentes, est 1584; et l'on à trouvé, relativement à ces observations, la valeur moyenne de la variation diurne égale à o<sup>mm</sup>,8045, et e égal à 5572<sup>mm</sup>,93; ce qui donne

 $\frac{n}{se} = 0,142116$ ; = 0,142116; aprobabilité que les seules anomalies du hasard donneront une va-

le millimètre étant pris pour l'unité. La probabilité de u est ainsi proportionnelle à

e -0,142116.su zb?

En supposant que s exprime le nombre des variations diurnes obser-MÉCAN. CÉL. Tome V. 33 vées vers les syzygies, on a s = 792, et la probabilité de l'erreur moyenne u sera proportionnelle  $\hat{a}$   $\hat{b}$   $\hat{b}$   $\hat{c}$   $\hat{$ 

$$e^{-112,55.u^2}$$
;

s'il n'y a point de cause constante qui influe sur ces variations. La probabilité de l'erreur moyenne u' des 792 observations vers les quadratures sera pareillement proportionnelle à

$$c^{-112,55.u'^2}$$
 c xuantes sexas serges no onno iup eo

Soit z l'excès de u' sur u, la probabilité des erreurs simultanées u et Cette valeur reduite en temps, donne pour la selle valeur reduite en temps, donne pour la selle valeur lux lunaire de jour de la syzygie 5 è 18' 36" du son no

la probabilité de z sera donc proportionnelle à l'intégrale in est de

l'intégrale étant prise depuis u égal à l'infini négatif, jusqu'à û égal à l'infini positif. En donnant à l'intégrale précédente, cette forme

$$c = \frac{112,55}{2}.z^2$$

Les observations précédentes donnent pour z

33

$$z = 0.0865$$
.

= 0,142116: La probabilité que les seules anomalies du hasard donneront une valeur de z plus petite est donc La stinul mon ara tinta estémillar el

$$\frac{-\frac{112,55}{2},z^{2}}{-\frac{112,55}{2},z^{4}}$$

En supposant que s exprime le nomla chà variations diurnes obser-

l'intégrale du numérateur étant prise depuis z = -∞ jusqu'à z=0.0865, et celle du dénominateur étant prise depuis  $z=-\infty$  jusqu'à  $z = \infty$ . Si l'on fait

$$t = z \cdot \sqrt{\frac{112,55}{2}};$$

cette fraction devient

Sur la page 102 du premier volume de la Mecanique celeste, 
$$\frac{1}{\sqrt{\frac{r}{\sigma}}}$$
;  $\frac{\int dt \cdot c^{-t^2}}{\sqrt{\frac{r}{\sigma}}}$  dit à la fin de cette page, que je ferais voir dans la théorie

l'intégrale du numérateur étant prise depuis  $t = 0.0865.\sqrt{\frac{112,55}{2}}$ jusqu'à t infini, et \( \pi \) étant le rapport de la circonférence au diamètre. Ainsi la probabilité que la valeur observée de z n'atteindrait pas 0,0865, par les seules chances du hasard, est 0,843; il y a donc quelque invraisemblance à leur attribuer cette valeur; mais cette invraisemblance est si petite que, pour affirmer quelque chose à cet égard, il faut multiplier considérablement les observations. Neuf fois plus d'observations donneraient

$$t = 0.0865.\sqrt{\frac{112,55}{2}.9}.$$

Si la valeur de z restait égale à 0,0865, la probabilité que cette valeur ne serait pas l'effet du hasard, serait à fort peu près, \(\frac{327}{338}\); cette valeur indiquerait donc alors, avec beaucoup de vraisemblance, le flux lunaire atmosphérique. Tup noticinar al agaignt adob suaq no ramal

supposer & V' le même à l'intérieur qu'à la surface; ce qui rend valeurs de au et de av ; on voit que la supposition des points restant sur

### REMARQUES

Sur la page 102 du premier volume de la Mécanique céleste.

J'AI dit à la fin de cette page, que je ferais voir dans la théorie du flux et du reflux de la mer, que la valeur de SV' est à très peu près la même pour toutes les molécules situées sur le même rayon terrestre. J'ai omis de le faire en exposant cette théorie : pour réparer cette omission, je vais considérer la partie de &V' relative à l'attraction de la couche aqueuse. Cette partie est donnée par l'expression de Δ. V de la page 37 du second volume. Si l'on fait varier θ et σ dans l'intérieur, des mêmes quantités au et av qu'à la surface; ce qui revient à considérer les molécules situées primitivement sur le même rayon, comme restant constamment sur un même rayon; alors JV' ne varie de l'intérieur à la surface, qu'à raison de la variation ay du mouvement de la molécule dans le sens vertical, variation d'un ordre inférieur à celui de la variation au de son mouvement horizontal dans le sens du méridien. Or, il résulte de l'expression de A. V, que la variation ay de r, a pour facteur une quantité de l'ordre de la profondeur de la mer; on peut donc négliger la variation qui en résulte dans & V', et supposer & V' le même à l'intérieur qu'à la surface; ce qui rend l'équation (M) commune à tous ces points. Comme cette équation donne pour tous les points situés sur le même rayon, les mêmes valeurs de au et de av; on voit que la supposition des points restant sur le même rayon pendant la durée du mouvement, satisfait aux conditions de ce mouvement; car il est facile d'appliquer à la force attractive des astres, ce que nous venons de dire relativement à l'attraction de la couche aqueuse.

# TRAITÉ

IMPRIMERIE DE HUZARD COURCIER 30

# MÉCANIQUE CÉLESTE.

LIVRE XIV.

JUILLET 1824.

TRAITE

IMPRIMERIE DE HUZARD-COURCIER.

ae.

MECANIQUE CELESTE

the sugment of the North National Association of the sugment of th

The state of the second of the state of the second of the

the second containing the property of the second se

to the state of the contract o

the state appealing the partition of the state of the partition of the state of the

# LIVRE XIV.

DES MOUVEMENS DES CORPS CÉLESTES AUTOUR DE LEUR CENTRE DE GRAVITÉ.

## CHAPITRE Ier.

De la Précession des équinoxes.

Notice historique des travaux des Astronomes et des Géomètres sur cet objet.

1. LA plus ancienne observation de la position sidérale des solstices ou des équinoxes, remonte au commencement du XIIº siècle avant notre ère. Tcheou-Kong qui gouvernait alors la Chine pendant la minorité de son neveu, fixa la position du solstice d'hiver à deux degrés chinois de nu, constellation chinoise qui commençait par & du Verseau. Cette détermination que l'on peut rapporter à l'an 1100 avant notre ère, ne diffère pas de 92 minutes centésimales du résultat des formules du sixième Livre; différence qui paraîtra bien petite, si l'on considère. l'imperfection des moyens dont on pouvait alors faire usage, pour obtenir un élément aussi délicat. La même tradition qui nous a transmis ce précieux résultat, nous a pareillement transmis l'observation des ombres du gnomon, aux solstices d'hiver et d'été, faite par le même prince. L'accord de l'obliquité de l'écliptique qu'elle donne pour cette époque, avec les formules du sixième Livre, ne permet pas de révoquer en doute cette observation regardée comme incontestable par le missionnaire Gaubil, l'homme le plus versé dans l'Astronomie chinoise qu'il avait approfondie pendant un long séjour à la Chine. Dans le Ve siècle avant notre ère, les astronomes chinois placèrent le solstice d'hiver au commencement de la constellation chinoise nieou, dont la

MÉCAN. CÉL. Tome V.

première étoile était 6 du Capricorne. Il est fort vraisemblable, dit le savant et judicieux Gaubil, que ces astronomes, en comparant cette position du solstice d'hiver, avec celle que Tcheou-Kong lui avait assignée, et qui leur était bien connue, remarquèrent le mouvement rétrograde des solstices, par rapport aux étoiles; mais rien dans l'astronomie des Egyptiens, des Chaldéens et des Grecs, n'indique que ces peuples aient eu connaissance des observations chinoises. Il faut descendre de huit siècles depuis Tcheou-Kong, pour avoir des observations de leurs astronomes sur la position sidérale des équinoxes. Aristille et Tymocharis, premiers observateurs de l'école d'Alexandrie, déterminèrent la position de plusieurs étoiles par rapport à l'équinoxe du printemps; et ce fut en comparant leurs observations aux siennes, qu'Hypparque reconnut le changement de la position équinoxiale des étoiles, changement que les Egyptiens et les Chaldeens paraissent avoir ignoré. Les périodes que les Chaldéens assignaient aux mouvemens sidéraux du Soleil, de la Lune, de ses nœuds et de son périgée, périodes que Geminus et Ptolémée nous ont transmises, supposent une année sidérale de  $365^{j\frac{1}{4}}$ , la même que l'année tropique admise généralement par les anciens astronomes; ils ne supposaient donc pas, dans les étoiles, un mouvement par rapport aux équinoxes. Ptolémée qui pouvait mieux que nous, connaître ce que l'on avait avant lui, pensé sur cet objet, dit expressément qu'Hypparque soupconna le premier ce mouvement, et qu'il y fut conduit uniquement par la comparaison de ses observations avec celles d'Aristille et de Tymocharis. Hypparque reconnut que depuis le temps de ces astronomes, les étoiles s'étaient avancées en longitude comptée de l'équinoxe du printemps, d'un degré sexagésimal par siècle, sans changer de latitude au-dessus de l'écliptique; ce qu'il expliqua en faisant mouvoir la sphère des étoiles, autour des pôles de l'écliptique. Ptolémée confirma par ses propres observations, la découverte d'Hypparque; mais ayant conclu de ses observations défectueuses des équinoxes, la même durée de l'année tropique qu'Hypparque avait donnée; il dut retrouver, et il retrouva en effet, le même mouvement des étoiles en longitude. Les astronomes arabes rectifièrent ce mouvement : ils remarquèrent l'inexactitude des équinoxes de Ptolémée. En comparant ceux qu'ils observerent, avec les équinoxes d'Hypparque; ils donnèrent une durée de l'année tropique, plus exacte que celle qui fut depnis déterminée par Copernic, et ils en conclurent le vrai mouvement des étoiles en longitude. muse ettes en fonctions de la light des

Copernic ayant substitué les mouvemens réels de la Terre, aux mouvemens apparens des astres, expliqua la précession des équinoxes par un mouvement des pôles de la Terre, autour des pôles de l'écliptique, ce qui, maintenant, est généralement admis; mais il ne s'occupa point de la cause de ce mouvement, se bornant à démêler dans les mouvemens apparens des astres, ce qui est dû aux mouvemens réels de la Terre. Képler porté par une imagination active, à la recherche des causes, essaya de découvrir celle de la précession des équinoxes : après diverses tentatives, il avoua l'inutilité de ses efforts.

Il était réservé à Newton, de nous faire connaître la cause de ce phénomène, en la rattachant à sa découverte de la pesanteur universelle dont il est l'un des plus curieux résultats, et l'une des plus fortes preuves. Après avoir reconnu par sa théorie, l'aplatissement de la Terre et la cause du mouvement des nœuds de l'orbite lunaire, Newton considérant le renslement graduel du sphéroïde terrestre, des pôles à l'équateur, comme le système d'un nombre infini de satellites, vit bientôt que l'attraction solaire devait faire rétrograder les nœuds des orbites qu'ils décrivent, comme elle fait rétrograder les nœuds de la Lune; et que l'ensemble de ces mouvemens devait produire un mouvement rétrograde dans l'intersection de l'équateur de la Terre avec l'écliptique. Voici comment il détermine ce mouvement.

Ce grand géomètre supposant la Terre homogène, la conçoit formée 1°. d'une sphère intérieure dont le diamètre est l'axe des pôles; 2°. de l'excès du sphéroïde terrestre sur cette sphère. Il imagine d'abord cet excès réuni autour de l'équateur, sous la forme d'un anneau détaché du globe, en conservant toujours son mouvement de rotation. Il trouve qu'alors ses nœuds auraient sur l'écliptique, un mouvement rétrograde qui serait au mouvement rétrograde des nœuds de l'orbe lunaire, comme le jour sidéral est à la durée d'une révolution sidérale de la Lune; résultat exact et que l'on peut facilement déduire de l'expression différentielle de la précession des équinoxes, donnée dans le n° 4 du cinquième Livre, en y supposant, comme Newton l'a fait d'abord, l'inclinaison de l'écliptique sur l'équateur, très petite. Newton remarque ensuite que l'anneau, par son adhérence à l'équateur du globe terrestre, doit communiquer à la masse entière de ce globe, une très grande partie

du mouvement rétrograde de ses nœuds, qui par là se trouve extrêmement affaibli. Mais de quelle manière cette communication doit-elle se faire? quel est le mouvement rétrograde qu'elle produit dans l'intersection de l'équateur et de l'écliptique? C'est dans la solution de ces deux questions, que consiste la principale difficulté du problème.

Il était naturel que Newton fit usage pour cet objet, de la règle suivante qu'il à donnée dans le scholie qui termine l'exposition de la troisième loi du mouvement ou de l'égalité de l'action à la réaction, dans l'ouvrage des Principes suppliés apprincipes de la communication.

"Si l'on estime l'action de l'agent, par sa force multipliée par sa » vitesse, et que l'on estime pareillement la réaction du corps résistant, » par les vitesses de chacune de ses parties, multipliées respectivement » par les forces qu'elles ont pour résister en vertu de leur cohésion, de » leur attrition, de leur poids et de leur accélération; l'action et la » réaction se trouveront égales dans les effets de toutes les machines. »

Pour appliquer cette règle à la question présente, il faut observer que la force imprimée à l'anneau par l'action solaire, est égale à la masse de l'anneau, multipliée par son mouvement de précession. Ainsi l'action de l'agent sur le corps résistant ou sur le globe terrestre, est ici le produit de cette masse par son mouvement de précession, diminué de la précession qui lui reste et qui lui est commune avec le globe, et par sa vitesse qui est celle de rotation de la Terre à l'équateur. Chaque molécule du globe reçoit une force égale à son accélération multipliée par sa masse; et en vertu de la cohésion des molécules, cette accélération est la précession terrestre multipliée par la distance de la molécule à l'axe des pôles, la moitié de cet axe étant prise pour unité. La vitesse de la molécule est la vitesse de rotation à l'équateur, multipliée par cette distance; la réaction du corps résistant est donc égale à la somme des produits de chaque molécule, par le carré de sa distance à l'axe, par la précession terrestre, et par la vitesse de rotation à l'équateur. Newton eût pu facilement déterminer cette somme : en égalant ensuite l'action de l'agent, à la réaction du corps résistant, il aurait trouvé la précession terrestre égale à la précession primordiale de l'anneau, multipliée par le rapport de la masse de l'anneau à celle de la Terre, et par le facteur 5. Au lieu de ce vrai facteur, Newton déduit de considérations inexactes, le facteur 3 du carré de la demi-circonférence dont le rayon est l'unité. En supposant, comme Newton l'a fait d'abord, l'excès du sphéroide

terrestre sur la sphère dont le diamètre est l'axe des pôles, réuni sous la forme d'un anneau à l'équateur, on obtient une précession plus grande que la véritable ; car l'action du Soleil sur les molécules de cet excès, pour faire rétrograder les équinoxes, est plus petite et a moins d'énergie que dans cette hypothèse; il faut donc diminuer la précession qui en résulte. Newton, dans la première édition de son ouvrage des Principes, la réduisait au quart; depuis, il ne l'a réduite qu'aux deux cinquièmes; ce qui est exact. Il la multiplie ensuite par le cosinus de l'inclinaison de l'écliptique à l'équateur, pour tenir compte de cette inclinaison, ce qui est encore exact. Ainsi la solution neutonienne du problème de la précession des équinoxes, n'est en défaut que par le facteur erronné dont je viens de parler, facteur qui réduit la précession au-dessous de la moitié de sa vraie valeur. Il est vraisemblable que ce grand géomètre cut rectifié cette erreur capitale, mais bien excusable dans le premier inventeur, si, moins livré à des occupations d'un tout autre genre, il eût donné une attention plus particulière aux découvertes des géomètres du continent, telles que le principe par lequel Jacques Bernoulli a déterminé les oscillations des pendules composés, et le principe des vitesses virtuelles, publié sans démonstration par Jean Bernoulli, principes dont le premier a une grande analogie avec la règle énoncée ci-dessus, et dont le second est une généralisation de cette règle. Mais alors la correction de son erreur lui eût fait éprouver quelque difficulté à concilier avec l'observation, son résultat de la précession des équinoxes, qui par la devenait beaucoup trop grand. Pour avoir la précession totale, il faut ajouter la précession solaire à la précession lunaire, et pour obtenir celle-ci. Newton multiplie la première, par le rapport de l'action lunaire sur ce phénomène, à l'action solaire. Ce rapport est le même que le rapport de ces actions sur les marées. Newton, dans la première édition de ses Principes, le trouvait par les observations des marées, égal à 6 1 Il l'a réduit ensuite à 4,4815. L'incertitude des observations dont il a fait usage, lui permettait de le diminuer encore; et l'on a vu dans le treizième Livre, que des observations très nombreuses des marées, faites chaque jour à Brest, pendant seize années consécutives, et discutées avec un soin - particulier, donnent ce rapport égal à 2 1; ce qui rapproche considérablement, de l'observation, la formule neutonienne de la précession, corrigée de son erreur. Newton eût pu remarquer encore, que l'hypothèse

de l'homogénéité de la Terre, est peu vraisemblable, et qu'il est naturel de penser que les couches du sphéroïde terrestre croissent en densité, à mesure qu'elles se rapprochent du centre. C'est ce qu'il supposait dans la première édition de ses Principes; mais il croyait que cette supposition rendait la Terre plus aplatie, et par conséquent, augmentait la précession des équinoxes; ce qui est entièrement contraire aux résultats de l'analyse qui a fait voir qu'en rectifiant toutes ces erreurs, la théorie de Newton devenait parfaitement conforme à l'observation.

Newton a remarqué l'inégalité de la nutation, produite par l'action du Soleil, et dont la période est de six mois. Mais il se contente d'observer qu'elle est très petite. Il n'a point considéré les inégalités de la précession et de la nutation, dépendantes du mouvement des nœuds de l'orbe lunaire. Dans la production de ces inégalités, l'action lunaire déjà insensible dans les inégalités de ce genre, qui sont indépendantes de l'inclinaison de cet orbe, est multipliée par cette petite inclinaison; et il fallait une analyse délicate et très épineuse pour reconnaître que les expressions de ces inégalités acquerrent par les intégrations, un très petit diviseur qui les rend sensibles. Ainsi la théorie qui, perfectionnée, a sur beaucoup de points, devancé l'observation, a été sur ce point, devancée par elle. Bradley dut à une longue suite d'observations, la découverte de la nutation de l'axe terrestre, découverte l'une des plus remarquables et des plus importantes de l'astronomie, en ce qu'elle affecte toutes les observations des astres. Ce grand astronome ayant reconnu par la précision de ses observations, l'aberration des étoiles et sa cause, s'apercut bientôt qu'elle ne suffisait pas pour représenter les observations de plusieurs années, et que ces observations indiquaient une inégalité qu'il suivit pendant une période de dix-huit ans, après laquelle les étoiles lui parurent revenir à leur première position. Cette période la même que celle du mouvement des nœuds de la Lune, lui fit penser que l'axe de la Terre avait un mouvement périodique dépendant de la longitude de ces nœuds. Mechin lui proposa l'hypothèse du pôle vrai de la Terre décrivant uniformément autour du pôle moyen, pendant une période du mouvement des nœuds lunaires, un petit cercle, de manière que le pôle vrai fût le plus près de l'écliptique, lorsque le nœud ascendant de l'écliptique coïncide avec l'équinoxe du printemps. Bradley reconnut que par là, ses observations étaient à fort peu près représentées; mais qu'elles le seraient un peu

mieux encore, si l'on substituait au cercle, une ellipse peu aplatie. Mechin n'a point fait connaître la théorie qui l'a conduit à son hypothèse, et qui, si elle eût été juste, lui aurait donné l'ellipticité de la courbe décrite par le pôle vrai de la Terre, et soupçonnée par Bradley. Il aurait vu que le grand axe de cette ellipse toujours tangent à la sphère céleste, passe constamment par le pôle moyen de la Terre et par celui de l'écliptique. Mais la découverte de ces résultats, était alors au-dessus des moyens de l'Analyse et de la Mécanique: il fallait en inventer de nouveaux pour y arriver. L'honneur de cette invention était réservé à d'Alembert. Un an et demi après la publication de l'écrit dans lequel Bradley présenta sa découverte, d'Alembert fit paraître son Traité de la précession des équinoxes, ouvrage aussi remarquable dans l'histoire de la Mécanique céleste et de la Dynamique, que l'écrit de Bradley dans les annales de l'Astronomie.

D'Alembert détermine d'abord les résultantes des attractions du Soleil et de la Lune sur toutes les molécules du sphéroïde terrestre qu'il suppose être un solide de révolution; résultantes auxquelles il applique en sens contraire, la résultante de ces attractions sur le centre de la Terre, que l'on doit ici considérer comme immobile. Pour avoir la vraie situation de la Terre autour de ce point, d'Alembert choisit pour coordonnées, l'inclinaison de l'axe du sphéroïde, au plan de l'écliptique; l'angle que l'intersection de ces deux plans ou la ligne des équinoxes forme avec une droite fixe, menée sur l'écliptique par le centre de la Terre; enfin l'arc compris entre un point déterminé de l'équateur terrestre, et le point où cet équateur coupe l'écliptique à l'équinoxe du printemps. Les variations de ces coordonnées pendant un instant, donnent la vitesse correspondante de chaque molécule du sphéroïde. D'Alembert, en appliquant ici son principe général de Dynamique, décompose cette vitesse en deux, l'une qui subsiste dans l'instant suivant, et l'autre qui est détruite, et qui ne peut l'être que par les résultantes des attractions du Soleil et de la Lune. En déterminant ensuite les résultantes de ces vitesses détruites, et en les supposant en équilibre avec les résultantes des attractions des deux astres; il parvient au moyen des conditions de l'équilibre d'un nombre quelconque de forces, conditions qu'il a le premier établies, à trois équations différentielles du second ordre, entre les trois coordonnées. L'une de ces équations est facile à intégrer : elle donne la vitesse de rotation du sphéroïde, par rapport à l'équinoxe. D'Alembert n'intègre point les deux autres équations: il se contente de faire voir que la nutation du pôle terrestre observée par Bradley en est une conséquence nécessaire, et il détermine le rapport des deux axes de la petite ellipse décrite par le pôle vrai de la Terre, et la loi du mouvement de ce pôle sur cette ellipse, résultats précieux qui sont généralement adoptés dans les tables astronomiques. En comparant aux observations, les expressions analytiques de la nutation et de la précession, d'Alembert en conclut le rapport de l'action de la Lune à celle du Soleil; mais il observe qu'une très petite différence dans la valeur de la nutation, changerait sensiblement ce rapport, et celui de la masse de la Lune à la masse de la

Terre, que l'on conclut de ce rapport.

D'Alembert détermine ensuite les rapports de la précession et de la nutation avec la figure de la Terre, et les lois de la densité et de l'ellipticité de ses couches, depuis son centre jusqu'à sa surface: il en conclut que l'ellipticité 174, qui résulte de la comparaison des degrés mesurés en Laponie en 1536, et à l'équateur, ne peut satisfaire à ces rapports. Ce grand géomètre croit cependant qu'il est possible de concilier avec ces mesures, la théorie de l'attraction, en considérant que la Terre est recouverte en grande partie par la mer dont les molécules cédant à l'action des astres, ne doivent point, suivant lui, contribuer aux mouvemens de l'axe terrestre; en sorte qu'il ne faut employer dans le calcul de ces mouvemens, que l'ellipticité du sphéroïde recouvert par l'océan, ellipticité qui peut être supposée moindre que celle de la surface de la mer. Mais ayant soumis à une analyse exacte, les oscillations d'un fluide qui recouvrirait le sphéroïde terrestre, et la pression qu'il exerce sur la surface du sphéroïde; j'ai fait voir que ce fluide transmet à l'axe terrestre, les mêmes mouvemens, que s'il formait une masse solide avec la Terre. M. Plana, par d'ingénieuses et savantes recherches sur les oscillations des fluides qui recouvrent les planètes, vient de confirmer ce résultat important, auquel j'avais donné dans le cinquième Livre, la plus grande généralité, en établissant par le principe de la conservation des aires, que l'action des astres sur la mer, quelle que soit la manière dont elle recouvre le sphéroïde terrestre, produit sur la nutation et la précession, les mêmes effets, que si la mer venait à se consolider. La difficulté que la théorie de l'attraction présente sur cet objet, subsiste

ELE CEL Tome P

donc si l'ellipticité de la Terre est 1/174. Cet aplatissement ne peut encore se concilier dans cette théorie, avec les observations du pendule de l'équateur aux pôles, qui donnent un aplatissement au-dessous de 1 Mais une vérification du degré de Laponie, faite par M. Swanberg astronome suédois, a montré que la mesure de ce degré à laquelle on avait accordé trop de confiance, est fautive. La nouvelle mesure de M. Swanberg comparée aux degrés mesurés en France, dans l'Inde et à l'équateur, donne un aplatissement au dessous de 1 oct par là, concilie avec la théorie de l'attraction, les phénomènes de la précession et de la nutation, et les observations du pendule. L'erreur de d'Alembert que nous venons de signaler, n'est pas le seul exemple que l'histoire des sciences nous offre de savans célèbres induits en erreur par trop de consiance dans des mesures fautives. Ce fut par la mesure inexacte de la hauteur du baromètre, faite par le père Feuillée au sommet du pic de Ténériffe, que Daniel Bernoulli fut conduit à l'étrange hypothèse de l'accroissement de la chaleur à mesure qu'on s'élève dans l'atmosphère au-dessus de la surface de la Terre. Il importe donc au géomètre de ne s'appuyer que sur des observations très exactes et vérifiées avec un soin particulier.

D'Alembert applique sa solution du problème de la précession des équinoxes aux deux cas que Newton avait considérés, celui où la Terre serait réduite à l'enveloppe qui recouvre une sphère dont le diamètre serait l'axe des pôles, et le cas où les molécules de cette enveloppe seraient réunies sous la forme d'un anneau, à l'équateur. Il examine le cas où la Terre n'aurait point de mouvement de rotation. Je tiens de ce grand géomètre, qu'il avait d'abord pensé que la Terre étant supposée un solide de révolution, sa rotation ne devait avoir aucune influence sur les phénomènes de la précession et de la nutation; parce que tous les méridiens étant semblables et se présentant successivement de la même manière au Soleil et à la Lune, l'action de ces astres sur l'axe terrestre est la même, soit que la l'erre tourne sur elle-même, soit qu'elle ne tourne pas. C'était, en effet, conformément à cette idée, qu'il avait précédemment considéré les oscillations de l'atmosphère, dans sa pièce sur la cause des vents. Il parvint ainsi, sur la précession et sur la nutation, à des résultats contraires aux observations. Mais avant que de rien prononcer sur un objet de cette importance, il voulut revoir avec le plus grand soin ses calculs,

et soumettre à un nouvel examen, les principes qui leur servaient de base, et spécialement celui de la non influence de la rotation de la Terre sur les mouvemens de l'axe terrestre. Ayant donc traité cette question en considérant le mouvement de rotation, il parvint à des résultats fort différens de ceux qu'il avait d'abord obtenus, et ces nouveaux résultats se trouvèrent parfaitement conformes aux observations de la précession et de la nutation.

D'Alembert détermine la position de l'axe instantané de rotation, et la vitesse de rotation. N'ayant point intégré les équations différentielles qu'il avait trouvées, il n'a point considéré les inégalités du mouvement de l'axe terrestre, qui dépendent de sa position et de son mouvement primitifs, inégalités que j'ai déterminées dans le nº 4 du cinquième Livre. Les observations les plus précises n'ayant point fait reconnaître ces inégalités; il est naturel de penser que si elles ont eu lieu primitivement, les fluides qui recouvrent le sphéroïde terrestre les ont à la longue anéanties par leur frottement et leurs chocs multipliés contre sa surface. On conçoit en effet, que ces causes diminuent sans cesse la force vive du système de ces fluides et du sphéroïde; mais elles n'altèrent point la somme des aires que toutes les molécules de ce système décrivent sur le plan du maximum des aires. La diminution de la force vive doit donc avoir une limite qu'elle finit par atteindre; ce qui ne peut arriver que dans le cas où ces fluides sont en repos sur la surface du sphéroïde, l'axe de rotation de la Terre étant immobile autour de son centre. J'ai prouvé dans l'onzième Livre, qu'un tel axe est toujours possible, quelle que soit la manière dont l'océan recouvre le sphéroïde terrestre. Il devient, lorsque l'équilibre est établi, perpendiculaire au plan du maximum des aires; et la rotation de la Terre autour de cet axe, doit être telle que la somme des aires décrites par chaque molécule de la Terre, soit la même qu'à l'origine. Ainsi cette somme et le plan du maximum des aires, qui restent toujours l'un et l'autre les mêmes qu'à l'origine, s'il n'y a point d'action étrangère, déterminent la position de l'axe de rotation de la Terre et sa vitesse de rotation, lorsqu'elle parvient à l'état d'équilibre.

D'Alembert a étendu dans les Mémoires de l'Académie des Sciences pour l'année 1754, sa solution du problème de la précession des équinoxes, au cas où l'équateur et les parallèles terrestres seraient elliptiques; ce qui donne la solution générale de ce problème, lorsque dans

l'action du Soleil et de la Lune, on ne porte l'approximation que jusqu'aux termes divisés par le cube de leurs distances à la Terre. Enfin il a déterminé par la même analyse, le mouvement d'un corps solide animé par des forces quelconques, autour de son centre de gravité.

Euler a traité depuis les mêmes sujets, avec beaucoup d'élégance, soit dans les Mémoires de l'Académie de Berlin, soit dans son Traité de la Mécanique des Corps durs. Son premier Mémoire sur la précession des équinoxes, parut dans le volume des Mémoires de cette Académie pour l'année 1749. Il n'y fait aucune mention du traité de d'Alembert; mais dans le volume suivant, il reconnut expressément, qu'il n'avait composé son Mémoire, qu'après la lecture de l'ouvrage du géomètre français. La méthode d'Euler est identique avec une seconde solution du problème de la précession des équinoxes, que d'Alembert avait donnée dans son ouvrage; solution moins rigoureuse que la première, mais qui conduit fort simplement aux mêmes résultats.

C'est à Euler que l'on est redevable des équations générales du mouvement d'un corps solide animé par des forces quelconques, que j'ai développées dans le chapitre VII du premier Livre. La découverte des trois axes principaux de rotation, due à Ségner, apporte d'utiles simplifications dans un sujet aussi compliqué; et les équations auxquelles Euler est parvenu, me paraissent être les plus simples qu'il soit possible d'obtenir.

Plusieurs géomètres ont essayé de traiter synthétiquement le problème de la précession des équinoxes; mais leurs solutions inexactes, du moins pour la plupart, sont autant d'exemples de la supériorité de l'analyse sur la synthèse.

Les recherches de d'Alembert et d'Euler laissaient encore à considérer plusieurs points importans que j'ai discutés dans le cinquième Livre. L'un de ces points est l'influence de la fluidité de la mer, de ses courans et de ceux de l'atmosphère, sur les mouvemens de l'axe terrestre: j'ai reconnu, comme je l'ai dit précédemment, que cette influence est la même que si ces fluides formaient une masse solide adhérente au sphéroïde terrestre.

Un second point est l'influence de l'aplatissement de la Terre, sur l'obliquité de l'écliptique et sur la longueur de l'année. Si le Soleil et la Lune agissaient seuls sur la Terre, l'inclinaison moyenne de l'équateur à l'écliptique serait constante. Mais l'action des planètes

change continuellement la position de l'orbe terrestre, et il en résulte dans son obliquité sur l'équateur, une diminution confirmée par toutes les observations anciennes et modernes. La même cause donne aux équinoxes, un mouvement annuel direct d'environ un dixième de seconde centésimale. Ainsi la précession annuelle produite par l'action du Soleil et de la Lune est diminuée de cette quantité, par l'action des planètes. Ces effets de l'action des planètes sont indépendans de l'aplatissement du sphéroïde terrestre. Mais l'action du Soleil et de la Lune sur ce sphéroïde doit les modifier et en changer les lois.

Rapportons à un plan fixe, la position de l'orbite de la Terre et le mouvement de son axe de rotation. Il est clair que l'action du Soleil supposé mu constamment sur cette orbite, produira dans cet axe en vertu des variations de l'écliptique, un mouvement d'oscillation analogue à la nutation, avec cette différence, que la période de ces variations étant incomparablement plus longue que celle des variations du plan de l'orbe lunaire, l'étendue de l'oscillation correspondante dans l'axe de la Terre, est beaucoup plus grande que celle de la nutation. L'action de la Lune produit dans ce même axe, une oscillation semblable; parce que l'inclinaison moyenne de son orbe sur l'écliptique vraie, est constante. Le déplacement de l'écliptique, en se combinant avec l'action du Soleil et de la Lune sur la Terre, produit donc dans son obliquité sur l'équateur, une variation très différente de ce qu'elle serait en vertu de ce seul déplacement. L'étendue entière de cette variation due à ce déplacement, se trouve par là réduite environ au quart de sa valeur.

La variation du mouvement des équinoxes, produite par les mêmes causes, change la longueur de l'année tropique dans les différens siècles. Cette durée diminue quand ce mouvement augmente, ce qui a lieu présentement, et l'année actuelle est plus courte d'environ 13" centésimales, qu'au temps d'Hypparque. Mais cette variation dans la longueur de l'année a des limites qui sont encore restreintes par l'action du Soleil et de la Lune sur le sphéroïde terrestre. L'étendue de ces limites serait d'environ 500", par le déplacement seul de l'écliptique: elle est réduite à 120" par cette action.

J'ai recherché avec tout le soin qu'exige l'importance de l'objet dans l'Astronomie, si les inégalités séculaires des mouvemens de la Terre et de la Lune, pouvaient déplacer sensiblement l'axe de rotation, sur la surface du sphéroïde terrestre, et altérer le mouvement de rotation. J'ai reconnu que ces effets seront toujours insensibles. M. Poisson a confirmé depuis, ce résultat important, par une savante analyse insérée dans le tome VIII du Journal de l'École Polytechnique. Il restait à discuter une cause de variation du mouvement diurne de rotation, que les expériences faites sur la température des mines profondes, m'a paru indiquer. Ces expériences donnent un accroissement de température, à mesure que l'on s'enfonce au-dessous de la surface de la Terre Il est naturel d'en conclure que la Terre a une chaleur intérieure, croissante de la surface au centre, et qui diminue sans cesse, par les pertes qu'elle éprouve à cette surface. En vertu de cette diminution, les parties de la Terre se resserrent; et comme cette cause n'altère point l'aire décrite par le rayon vecteur de chaque molécule du sphéroïde terrestre projetée sur le plan de l'équateur, le mouvement de rotation doit par là s'accélérer. On a vu dans l'onzième Livre, que l'effet de cette cause est jusqu'à présent, insensible; en sorte que l'on peut regarder comme constante, la durée du jour, que les astronomes ont prise pour étalon du temps.

Enfin un troisième point de discussion, est la nutation de l'orbe lunaire, correspondante à la nutation de l'équateur terrestre. Il résulte du no 10 du second Livre, que, vu la grande distance du Soleil à la Terre et à la Lune, le centre de gravité du système de ces deux derniers corps, est à très peu près attiré par le Soleil, comme si toutes les molécules de ce système étaient réunies à ce centre. De là il suit que la somme des aires décrites autour de ce point, par le rayon vecteur de chaque molécule projetée sur le plan mené par le même point parallèlement à l'écliptique, est toujours le même en temps égal, quelle que soit la manière dont ces molécules agissent et réagissent les unes sur les autres. Or, en vertu de la nutation de l'axe terrestre, la somme des aires décrites par les molécules du sphéroïde terrestre, autour du centre de gravité du système de la Terre et de la Lune, est assujettie à une inégalité semblable à la nutation; l'aire décrite par le rayon vecteur de la Lune, doit donc être assujettie à une inégalité contraire, ce qui ne peut avoir lieu qu'autant que l'expression de la latitude de la Lune, contient une inégalité proportionnelle au sinus de la longitude moyenne de la Lune, et dont le coefficient dépend, comme celui de la nutation, de l'aplatissement de la Terre. Je retrouve ainsi l'inégalité à laquelle je suis parvenu dans le second chapitre du Livre VII, par la considération directe de l'action du sphéroïde terrestre sur la Lune.

J'avais négligé dans le cinquième Livre, la petite nutation dépendante du double de la longitude du nœud lunaire, parce qu'elle me paraissait devoir être insensible. Mais comme on peut facilement la comprendre dans les tables de la précession et de la nutation, j'en donne ici l'expression qui confirme ce que j'avais dit à son égard.

Quelques astronomes ont pensé qu'il serait avantageux dans le calcul de ces phénomènes, d'employer la longitude vraie de la Lune, au lieu de sa longitude moyenne. Mais il est aisé de voir par l'expression différentielle de la nutation, réduite en sinus et cosinus du temps, que la différence entre la longitude vraie du nœud de la Lune et sa longitude moyenne serait insensible dans l'intégrale, parce qu'elle n'acquiert point par l'intégration pour diviseur, le très petit coefficient du temps dans la valeur de la longitude du nœud; en employant donc la longitude vraie du nœud, au lieu de sa longitude moyenne, on s'exposerait à une erreur qui pourrait devenir sensible.

Enfin, pour ne rien négliger sur un objet de cette importance dans l'Astronomie, j'ai considéré les termes dépendans des variations séculaires des mouvemens de la Lune, et ceux qui dépendent de la quatrième puissance de sa parallaxe et de celle du Soleil; et j'ai trouvé

qu'ils sont insensibles.

Formules générales du mouvement de l'équateur terrestre.

2. Les expressions différentielles de ce mouvement, que j'ai données dans le nº 4 du Livre V, me paraissent être les plus simples auxquelles on puisse parvenir. Mais on peut leur donner la forme suivante qui présente quelques résultats utiles que nous allons exposer.

Soient x', y', z' les coordonnées d'une molécule dm de la Terre, rapportées au centre de gravité de cette planète, et à un plan fixe. Désignons par x', y'', z'', les coordonnées de la même molécule, rapportées au même centre et au premier, au second, et au troisième axe principal de la Terre que nous supposerons être à très peu près son axe de rotation. Nommons el le complément de l'angle que ce troisième axe forme sur le plan fixe; et 4 le complément de l'angle que la projection de cet axe sur ce plan forme avec l'axe de x';  $\sqrt{}$  sera l'angle que ce dernier axe fait avec la ligne d'intersection du plan fixe, et du plan formé par le premier et le second axe principal. Désignons encore par  $\varphi$  l'angle que cette ligne d'intersection fait avec le second axe principal. Cela posé, on aura par le n° 26 du premier Livre,

$$x' = x''(\cos\theta \cdot \sin\phi \cdot \sin\phi + \cos\phi \cdot \cos\phi) + y''(\cos\theta \cdot \sin\phi \cdot \cos\phi - \cos\phi \cdot \sin\phi) + z'' \cdot \sin\theta \cdot \sin\phi;$$

$$y' = x''(\cos\theta \cdot \cos\phi \cdot \sin\phi - \sin\phi \cdot \cos\phi) + z'' \cdot \sin\theta \cdot \cos\phi;$$

$$z' = z'' \cdot \cos\theta - y'' \cdot \sin\theta \cdot \cos\phi - x'' \cdot \sin\theta \cdot \sin\phi.$$

Soit

 $\int (y''^2 + z''^2) dm = A;$   $\int (x''^2 + z''^2) dm = B;$   $\int (y''^2 + x''^2) dm = C;$  on aura, par les propriétés des axes principaux,

$$\int x''y''dm = 0; \quad \int x''z''dm = 0; \quad \int y''z''dm = 0;$$

toutes ces intégrales étant étendues à la masse entière de la Terre. On aura, par la nature du centre de gravité,

$$\int x' \cdot dm = 0$$
;  $\int y' \cdot dm = 0$ ;  $\int z' \cdot dm = 0$ ;  $\int z'' \cdot dm = 0$ ;  $\int z'' \cdot dm = 0$ .

Considérons l'action d'un astre L sur la molécule dm. Soient x, y, z les coordonnées de cet astre, rapportées au centre de la Terre, et aux axes des x', des y' et des z'. Faisons

$$r_1 = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

$$\frac{L}{\sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}} = V;$$

dt étant l'élément du temps, supposons

$$\frac{dN}{dt} = \int dm \left[ x' \left( \frac{dV}{dy'} \right) - y' \left( \frac{dV}{dx'} \right) \right],$$

$$\frac{dN'}{dt} = \int dm \left[ x' \left( \frac{dV}{dz'} \right) - z' \left( \frac{dV}{dx'} \right) \right],$$

$$\frac{dN''}{dt} = \int dm \left[ y' \left( \frac{dV}{dz'} \right) - z' \left( \frac{dV}{dy'} \right) \right];$$

V est fonction de x, y, z, x', y', z'. En y substituant pour x', y', z', leurs valeurs précédentes, V devient fonction de neuf quantités  $x, y, z, x'', y'', z'', \phi, \psi$  et  $\theta$ , parmi lesquelles x'', y'', z'' sont invariables pour la même molécule. On a donc

en ne faisant varier que  $\varphi$ ,  $\psi$  et  $\theta$ , dans les valeurs précédentes de x', y', z'. Si l'on différencie ces valeurs, et qu'après les différentiations on fasse pour plus de simplicité,  $\psi$  nul; on aura

$$dx' = d\varphi(z' \cdot \sin \theta - \gamma' \cdot \cos \theta) + \gamma' \cdot d\downarrow;$$
  

$$dy' = x' \cdot \cos \theta \cdot d\varphi - x'd\downarrow + z'd\theta;$$
  

$$dz' = -x' \cdot d\varphi \cdot \sin \theta - \gamma' d\theta.$$

Substituant ces valeurs dans l'équation précédente aux différences partielles, on aura en comparant séparément les coefficiens de  $d\varphi$ ,  $d\psi$  et  $d\theta$ , les trois équations suivantes:

d'où l'on tire

$$z'\left(\frac{dV}{dx'}\right) - x'\left(\frac{dV}{dz'}\right) = \frac{\left(\frac{dV}{d\varphi}\right) + \cos\theta\left(\frac{dV}{d\psi}\right)}{\sin\theta}.$$

Maintenant, les variables  $\varphi$ ,  $\psi$  et  $\theta$  étant les mêmes pour toutes les molécules dm; il est clair que si l'on fait

$$V' = \int V dm = L \cdot \int \frac{dm}{\sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}};$$

on aura

$$\int dm \left[ x' \left( \frac{d\mathbf{V}}{dy'} \right) - y' \left( \frac{d\mathbf{V}}{dx'} \right) \right] = -\left( \frac{d\mathbf{V}'}{d\psi} \right);$$

$$\int dm \left[ x' \left( \frac{d\mathbf{V}}{dz'} \right) - z' \left( \frac{d\mathbf{V}}{dx'} \right) \right] = \frac{-\left( \frac{d\mathbf{V}'}{d\phi} \right) - \cos \theta \left( \frac{d\mathbf{V}'}{d\psi} \right)}{\sin \theta};$$

$$\int dm \left[ y' \left( \frac{d\mathbf{V}'}{dz'} \right) - z' \left( \frac{d\mathbf{V}}{dy'} \right) \right] = -\left( \frac{d\mathbf{V}'}{d\beta} \right).$$

Les seconds membres de ces équations sont les valeurs de  $\frac{dN}{dt}$ ,  $\frac{dN'}{dt}$ ,  $\frac{dN'}{dt}$  présentées sous une autre forme.

Soient

$$\frac{p}{\sqrt{p^2+q^2+r^2}}$$
,  $\frac{q}{\sqrt{p^2+q^2+r^2}}$ ,  $\frac{q}{\sqrt{p^2+q^2+r^2}}$ ,  $\frac{q}{\sqrt{p^2+q^2+r^2}}$ ,

les cosinus des angles que l'axe instantané de rotation de la Terre fait avec le troisième axe, le second et le premier de ses axes principaux; soit encore dt.  $\sqrt{p^2 + q^2 + r^2}$ , la vitesse angulaire de rotation autour de cet axe instantané; on aura par les n° 26 et 28 du premier Livre, les équations

$$Cdp + (B - A)qrdt = -dN \cdot \cos \theta - dN' \cdot \sin \theta;$$

$$Adq + (C - B)prdt = -(dN \cdot \sin \theta + dN' \cdot \cos \theta) \sin \varphi + dN'' \cdot \cos \varphi;$$

$$Bdr + (A - C)pqdt = -(dN \cdot \sin \theta + dN' \cdot \cos \theta) \cos \varphi - dN'' \cdot \sin \varphi.$$

Substituant pour  $\frac{dN}{dt}$ ,  $\frac{dN'}{dt}$ ,  $\frac{dN''}{dt}$ , leurs valeurs précédentes, on aura

$$C \cdot \frac{dp}{dt} + (B - A) qr = \left(\frac{dV'}{d\varphi}\right),$$

$$A \cdot \frac{dq}{dt} + (C - B) pr = \frac{\sin \varphi}{\sin \theta} \left[ \left(\frac{dV'}{d\psi}\right) + \cos \theta \left(\frac{dV'}{d\varphi}\right) \right] - \left(\frac{dV'}{d\theta}\right) \cos \varphi,$$

$$(F)$$

$$B \cdot \frac{dr}{dt} - (C - A) pq = \frac{\cos \varphi}{\sin \theta} \left[ \left(\frac{dV'}{d\psi}\right) + \cos \theta \left(\frac{dV'}{d\varphi}\right) \right] + \left(\frac{dV'}{d\theta}\right) \sin \varphi.$$

C'est sous cette forme générale, que M. Poisson a présenté les équations (G) du n° 4 du cinquième Livre.

Si l'on développe V', ou

$$\frac{dm}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}}, \quad (4-4)+ab$$

dans une série ordonnée suivant les puissances négatives de la distance  $r_i$  de l'astre L au centre de la Terre; on aura, en ne portant l'approximation que jusqu'aux termes de l'ordre  $\frac{1}{r_i^3}$ ,

$$V' = \frac{LT}{r_1} - \frac{L}{2} \int \frac{dm(x'^2 + y'^2 + z'^2)}{r_1^3} dx + \frac{3L}{2} \int \frac{dm(xx' + yy' + zz')^2}{r_1^5},$$

T étant la masse entière de la Terre. En substituant pour x', y', z' leur valeurs précédentes, on trouvera

$$V' = \frac{LT}{r_1} + \frac{3L}{4r_1^5} (B - A) \left\{ \frac{[X^a - (Y \cdot \cos \theta - Z \cdot \sin \theta)^a] \cos 2\varphi}{+ 2X (Y \cdot \cos \theta - Z \cdot \sin \theta) \sin 2\varphi} \right\} + \frac{3L}{4r_1^5} (2C - A - B) [X^2 + (Y \cdot \cos \theta - Z \cdot \sin \theta)^a - \frac{a}{3} r_1^a],$$

X, Y, Z étant les coordonnées x, y, z de l'astre L rapportées par la supposition de  $\psi$  nul, à l'équinoxe du printemps, et aux deux axes perpendiculaires à la ligne des équinoxes; l'écliptique fixe d'une époque donnée étant prise pour le plan fixe.

Quoique cette expression ne renferme point explicitement l'angle  $\psi$ , elle le renferme implicitement, parce que les coordonnées X et Y en dépendent. Si l'on nomme R la projection du rayon r, sur l'écliptique, et v l'angle que cette projection fait avec l'axe fixe d'où l'on compte les angles, on aura

$$X = R \cdot \cos(\upsilon + \psi); \quad Y = R \cdot \sin(\upsilon + \psi);$$

d'où l'on tire

$$\begin{pmatrix} \frac{d\mathbf{X}}{d\psi} \end{pmatrix} = -\mathbf{Y}; \quad \begin{pmatrix} \frac{d\mathbf{Y}}{d\psi} \end{pmatrix} = \mathbf{X}, \quad \mathbf{X}$$

par conséquent

C'est sous conte form 
$$\left(\frac{dV'}{dY}\right) = X\left(\frac{dV'}{dY}\right) - Y\left(\frac{dV'}{dX}\right)$$
, présenté les équa-

Si l'on décelonate d' siron mis-

Les équations (F) donneront ainsi

$$Cdp + (B-A)qrdt = \frac{3Ldt}{2r_1^3}(B-A)\left\{ \frac{[(Y \cdot \cos \theta - Z \cdot \sin \theta)^2 - X^2] \sin 2\varphi}{+2X(Y \cdot \cos \theta - Z \cdot \sin \theta) \cos 2\varphi}, \right\}$$

 $Adq + (C-B)prdt = \frac{3Ldt}{r_1^5} (C-B) \begin{cases} (Y \cdot \cos \theta - Z \cdot \sin \theta)(Y \cdot \sin \theta + Z \cdot \cos \theta)\cos \varphi \\ -X \cdot (Y \cdot \sin \theta + Z \cdot \cos \theta)\sin \varphi, \end{cases}$ 

 $Bdr + (A-C)pqdt = \frac{3Ldt}{r_1^5}(A-C) \left\{ \begin{array}{l} X (Y.\sin\theta + Z.\cos\theta)\cos\phi \\ + (Y.\cos\theta - Z.\sin\theta) (Y.\sin\theta + Z.\cos\theta)\sin\phi. \end{array} \right.$ 

Ces équations sont identiquement les équations (G) du n° 4 du cinquième Livre. Elles donnent en les intégrant, les valeurs de  $\varphi$ ,  $\psi$  et  $\theta$ , au moyen des équations suivantes données dans le n° 26 du I° Livre

$$d\psi \cdot \sin \theta \cdot \sin \phi - d\theta \cdot \cos \phi = qdt;$$

$$d\psi \cdot \sin \theta \cdot \sin \phi - d\theta \cdot \cos \phi = qdt;$$

$$d\psi \cdot \sin \theta \cdot \cos \phi + d\theta \cdot \sin \phi = rdt.$$

On peut substituer  $\frac{d\varphi}{dt}$ , au lieu de p, dans les termes (C—B) pr et — (C—A) pq, des équations (F); car la différence  $\frac{d\varphi}{dt}$  — p étant égale à  $\frac{d\psi}{dt}$ . cos  $\theta$ , et les valeurs de q et de r, étant de l'ordre de  $\frac{d\psi}{dt}$  et  $\frac{d\theta}{dt}$ , on ne fait que négliger des termes de l'ordre des carrés et des produits des différentielles  $d\psi$  et  $d\theta$ , et qui de plus ont les facteurs très petits C—A, et C—B. Cela posé, si l'on multiplie la seconde des équations (F) par cos  $\varphi$ , et qu'on retranche le produit de la troisième de ces équations, multipliée par sin  $\varphi$ ; on formera la suivante;

$$\left(\frac{A+B}{2}\right)d\left(\frac{r.\sin\varphi-q.\cos\varphi}{dt}\right)$$

$$-\left(\frac{A-B}{2}\right)d\left(\frac{q.\cos\varphi+r.\sin\varphi}{dt}\right)$$

$$-C.\frac{d\varphi}{dt}(r.\cos\varphi+q.\sin\varphi)=\left(\frac{dV'}{d\theta}\right).$$

On a

$$r.\sin \varphi - q.\cos \varphi = \frac{d\theta}{dt};$$

$$r.\cos \varphi + q.\sin \varphi = \frac{d\psi}{dt}.\sin \theta;$$

$$r.\sin \varphi + q.\cos \varphi = \frac{d\psi}{dt}.\sin \theta.\sin 2\varphi - \frac{d\theta}{dt}.\cos 2\varphi;$$

p serait égal à une constante n, si la Terre était un solide de révolution, et dans le cas général, la valeur de p est une constante n plus le produit de A - B, et de la force perturbatrice, par sin  $2\phi$  et  $\cos 2\phi$ ; en négligeant donc ce produit, et celui des différentielles  $d\phi$  et dJ, on pourra supposer  $\frac{d\phi}{dt} = n$ , dans l'équation précédente qui devient

$$\frac{A+B}{2} \cdot \frac{dd\theta}{dt^2} - Cn \cdot \frac{d\psi}{dt} \cdot \sin \theta$$

$$-\left(\frac{A-B}{2}\right) d\left(\frac{d\psi}{dt} \cdot \sin \theta \cdot \sin 2\phi - \frac{d\theta}{dt} \cdot \cos 2\phi\right) = \left(\frac{dV^1}{d\theta}\right).$$

Si le sphéroïde était de révolution, le terme qui a pour facteur A—B disparaîtrait: dans tous les cas il est insensible, parce que vu la rapidité du mouvement de rotation, les termes dépendans de sin 29 et de cos 29, déjà insensibles par eux-mêmes, acquièrent encore par les intégrations, le grand diviseur 2n. L'équation précédente devient ainsi

$$\left(\frac{A+B}{2}\right) \cdot \frac{dd\theta}{dt^2} - Cn \cdot \frac{d\psi}{dt} \cdot \sin\theta = \left(\frac{dV'}{dt}\right).$$

On trouvera de la même manière, en multipliant la seconde des équations (F) par sin  $\varphi$  et en l'ajoutant à la troisième multipliée par  $\cos \varphi$ ,

$$\left(\frac{A+B}{2}\right) d \frac{\left(\frac{d\psi}{dt} \cdot \sin\theta\right)}{dt} - \left(\frac{A-B}{2}\right) d \frac{\left(\frac{d\psi}{dt} \cdot \sin\theta \cdot \cos 2\phi + \frac{d\theta}{dt} \sin 2\phi\right)}{dt} + Cn \cdot \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{\sin\theta} \left[\left(\frac{dV'}{d\psi}\right) + \cos\theta\left(\frac{dV'}{d\phi}\right)\right].$$

Si l'on néglige, comme nous venons de le faire, les termes multipliés par A—B, et par  $\frac{d\psi}{dt}$ . cos  $2\phi$ , ou par  $\frac{d\theta}{dt}$ . sin  $2\phi$ ; si l'on observe de plus que la rapidité du mouvement de la Terre, permet de négliger les termes dépendans de sin  $\phi$ , et de cos  $\phi$  et par conséquent  $\left(\frac{dV'}{d\phi}\right)$ ; l'équation précédente donnera

$$\frac{(A+B)}{(A+B)} \cdot d \frac{(\frac{d\psi}{dt} \cdot \sin \theta)}{(\frac{d\psi}{dt} \cdot \sin \theta)} + Cn \left(\frac{d\theta}{dt}\right) = \frac{1}{\sin \theta} \left(\frac{dV'}{d\psi}\right);$$

Si l'on n'a égard dans les équations (i) et (i'), qu'aux termes de  $\theta$  et  $\psi$  qui dépendent de l'action des astres, et si l'on considère que le mouvement des astres est fort lent par rapport au mouvement rapide de rotation de la Terre; on pourra négliger dans ces équations les secondes différentielles de  $\theta$  et de  $\psi$  ainsi que les produits de leurs premières différences; et alors on a

$$\frac{d\psi}{dt} = \frac{\left(\frac{dV'}{d\theta}\right)}{\operatorname{Cn} \cdot \sin \theta}; \quad \theta = 0$$

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{\left(\frac{dV'}{d\psi}\right)}{\operatorname{Cn} \cdot \sin \theta}; \quad \theta = 0$$

Si dans l'expression de V' donnée ci-dessus, on néglige les termes multipliés par sin 20, et par cos 20, et si l'on suppose

$$P = \frac{3L}{r_1^5} \cdot (Y \cdot \cos \theta - Z \sin \theta) (Y \cdot \sin \theta + Z \cdot \cos \theta);$$

$$P' = \frac{3L}{r_1^5} \cdot X (Y \cdot \sin \theta + Z \cos \theta);$$

on aura

being the second side 
$$\frac{d\psi}{dt} \cdot \sin \theta = \frac{(2C - A - B)}{2nC} \cdot P$$
; and the second side  $\frac{d\theta}{dt} = \frac{(2C - A - B)}{2nC} \cdot P'$ .

Ces équations sont identiquement celles que j'ai données dans les n° 5 et 6 du cinquième Livre. Elles sont les plus simples auxquelles on puisse parvenir.

Si l'on multiplie la première des équations (F) par p, la seconde par q, et la troisième par r; qu'ensuite on les ajoute, et que dans le second membre de l'équation résultante, on substitue pour p, q, et r, leurs valeurs; on aura

C. 
$$pdp + A \cdot qdq + B \cdot rdr = \left(\frac{dV'}{d\varphi}\right) d\varphi + \left(\frac{dV'}{d\psi}\right) d\psi + \left(\frac{dV'}{d\theta}\right) d\theta;$$

ce qui donne en intégrant

$$C \cdot p^2 + A \cdot q^2 + Br^2 = constante + 2d \cdot \int V'dt;$$

la caractéristique différentielle d se rapportant aux seules variations

du mouvement du sphéroïde. Ainsi en désignant par V'' la fonction  $V' = \frac{LT}{r_1}$ ; on aura

$$C.p^2 + A.q^2 + B.r^2 = constante + 2d. \int V''dt.$$

Quelque loin que l'on porte l'approximation de la valeur de  $\int V''dt$ , tout ce qui dépend de la précession  $\psi$  des équinoxes, de l'inclinaison  $\theta$  de l'axe terrestre à l'écliptique, et de l'angle  $nt + \varepsilon$ , nt étant le mouvement de rotation de la Terre, ne peut avoir été introduit que par ces quantités; puisque les coordonnées des astres ne les renferment point. On aura donc  $d \cdot \int V'' dt$ , en faisant tout varier dans cette intégrale, à l'exception des angles introduits par les inégalités du mouvement des astres. Ce qui donne

$$d.\int V''dt = V'' - \int \left(\frac{dV''}{dt}\right)^t dt,$$

la différence partielle  $\left(\frac{dV''}{dt}\right)^1$ , étant uniquement relative à la variation du mouvement des astres. L'équation précédente devient ainsi,

$$p^{a} + q^{a} + r^{a} - \left(\frac{2C - A - B}{2C}\right) (q^{a} + r^{a}) + \left(\frac{A - B}{2C}\right) (q^{a} - r^{a})$$

$$= n^{a} + \frac{2V''}{C} - \frac{2}{C} \cdot \int \left(\frac{dV''}{dt}\right)^{a} dt.$$

On a par ce qui précède

$$q^{2} + r^{2} = \left(\frac{d\psi}{dt}\right)^{2} \sin^{2}\theta + \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^{2},$$

$$q^{2} - r^{2} = \left[\left(\frac{d\theta}{dt}\right) - \left(\frac{d\psi}{dt}\right)^{2} \sin^{2}\theta\right] \cos 2\theta$$

$$-2\left(\frac{d\theta}{dt}\right) \cdot \frac{d\psi}{dt} \cdot \sin\theta \cdot \sin 2\theta;$$

ces termes sont du second ordre, en considérant comme des quantités du premier ordre, celles qui sont de l'ordre l; lt étant la précession des équinoxes. En ne conservant donc que les quantités du premier ordre, qui sont multipliées par le sinus ou le cosinus d'un angle croissant avec une grande lenteur, ou dans lequel le coefficient du temps soit de l'ordre l; on voit que  $q^*+r^*$  et  $q^*-r^*$ , ne renferment point de

termes semblables. Ainsi en n'ayant égard qu'à des quantités de ce genre, on peut supposer

$$p^{2} + q^{2} + r^{2} = n^{2} + \frac{2V''}{C} - \frac{2}{C} \cdot \int \left(\frac{dV''}{dt}\right)^{1} \cdot dt.$$

Maintenant ne considérons dans V", que la partie qui est indépendante de sin 20 et de cos 20. Cette partie est, par ce qui précède,

$$\frac{3L}{4r_1^5} \cdot (2C - A - B) [X^2 + (Y \cdot \cos \theta - Z \cdot \sin \theta)^2 - \frac{2}{3} \cdot r_1^2].$$

Dans le cas d'un sphéroïde de révolution, dans lequel A = B, on a vu dans le n° 8 du cinquième Livre, et il résulte de la valeur donnée ci-dessus de dp, que p devient une constante, et qu'ainsi  $p^2 + q^2 + r^2$  ne contient point de quantités du premier ordre, multipliées par le sinus d'un angle croissant avec une très grande lenteur. Mais la supposition de A = B ne détruit point les quantités de ce genre, qui pourraient exister dans le cas d'un sphéroïde quelconque; puisque cette supposition ne fait que changer 2C - A - B, en 2(C - A). Il n'existe donc point de quantités semblables dans le cas d'un sphéroïde quelconque, à moins que dans une seconde approximation, elles ne soient introduites dans la fonction

$$\frac{2V''}{C} - \frac{2}{C} \cdot \int \left(\frac{dV''}{dt}\right)^{1} \cdot dt,$$

par les valeurs de  $\mathcal{I}\varphi$ ,  $\mathcal{I}\theta$  et  $\mathcal{I}\varphi$ , dépendantes des sinus et cosinus de  $\mathcal{I}\varphi$ . Mais ces valeurs ayant acquis par les intégrations, de grands diviseurs de l'ordre  $\mathcal{I}n^2$ , comme il est facile de le conclure des équations différentielles données ci-dessus; ayant de plus le facteur A - B qui est insensible jusqu'ici pour la Terre, et acquérant encore ce facteur dans les termes indépendans de  $\varphi$ , qu'ils produisent dans la fonction précédente; nous nous dispenserons d'y avoir égard. D'ailleurs il résulte de l'analyse citée de M. Poisson, que ces valeurs ne produisent dans cette fonction, aucun terme du premier ordre multiplié par le sinus ou cosinus d'un angle croissant avec une extrême lenteur. Les inégalités de l'intégrale

$$\int dt \cdot \sqrt{p^2 + q^2 + r^2}$$
 well as localization of

ou de la rotation de la Terre sont donc insensibles

Le sinus de l'angle formé par l'axe instantané de rotation et par l'axe principal étant  $\frac{\sqrt{q^2+r^2}}{\sqrt{p^2+q^2+r^2}}$ ,

il sera

$$\frac{1}{n} \cdot \sqrt{\left(\frac{d\psi}{dt} \cdot \sin\theta\right)^2 + \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2};$$

et l'on voit par les expressions précédentes de  $\frac{d\psi}{dt}$ .  $\sin\theta$  et de  $\frac{d\theta}{dt}$ , qu'il sera toujours insensible. Ces deux résultats sont très importans, en ce qu'ils assurent l'uniformité de la rotation de la Terre, et la stabilité des latitudes terrestres.

Je n'ai point eu égard dans le cinquième Livre, à l'inégalité dépendante du double de la longitude du nœud de l'orbite lunaire, par la raison qu'elle est très petite relativement à la nutation. Cependant, vu la précision des observations modernes, et parce qu'il est facile de la comprendre dans une même table avec la nutation, je vais ici la déterminer.

Pour cela, je rapporterai les coordonnées X, Y, Z au plan de l'écliptique vraie, en faisant abstraction des variations séculaires de cette écliptique, ce que l'on peut faire ici. En désignant par v' la longitude de la Lune, comptée de l'équinoxe du printemps; et par A la longitude de son nœud ascendant, on aura,

$$X = r'_1 \cdot \sqrt{1 - \gamma^2 \cdot \sin^2(v' - \Lambda)} \cos v';$$

$$Y = r'_1 \cdot \sqrt{1 - \gamma^2 \cdot \sin^2(v' - \Lambda)} \sin v';$$

$$Z = r'_1 \cdot \gamma \cdot \sin(v' - \Lambda);$$

r', étant la distance de la Lune à la Terre;  $\gamma$  étant l'inclinaison de l'orbe lunaire à l'écliptique, inclinaison dont nous négligeons les puissances supérieures au carré. On aura à très peu près,

$$XY = \frac{f_1}{2} \left[ 1 - \frac{1}{2} \gamma^2 + \frac{1}{2} \gamma^2 \cdot \cos(2v' - 2A) \right] \sin 2v'.$$

En substituant au lieu de v', sa valeur approchée

on trouvera que XY contient le terme

$$\frac{r_i^2}{4} \cdot \sin 2\Lambda$$
;  $\frac{1}{1+p+q}$  Jack isomorphism

l'expression de P' contient donc le terme

Le terme son a l'est an le terme son de le comme de la lectron de

de la même expression, contient le terme ; another de la même expression, contient le terme ; another de la même expression and de la même expressio

les deux inégalités dépendantes de cos A et de cos 2A, dans l'expression de 0, ont donc des coefficiens qui sont dans le rapport de

$$\frac{1}{16000} = \frac{1}{(22) \cdot \cos \theta}, \quad \frac{1}{8} \cdot 2^{2} \cdot \sin \theta; \quad (X - x) \end{bmatrix} I + \frac{1}{16000} = \frac{1}{(22) \cdot \cos \theta}, \quad \frac{1}{8} \cdot 2^{2} \cdot \sin \theta; \quad (X - x) = \frac{1}{16000}$$

ou dans le rapport de l'unité à  $-\frac{1}{4} \gamma$ . tang  $\theta$ . On trouve pareillement que le terme

$$o = mb \approx \frac{3L'}{r'_{1}} \circ Y^{2} \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta = mb'x$$

de l'expression de P, produit le terme one T el el es est m el T tios

$$-\frac{3L'}{8r',3}$$
  $\sin 2\theta \cdot \gamma^2 \cdot \cos 2\Lambda$ ;

produit le terme

terme 
$$\frac{3L'}{2r'_1^3} \cdot \frac{\cos 2\theta}{1+T} \cdot \frac{2}{\cos \Lambda} \cdot \frac{1}{1+T}$$
 ennob inp so

Les inégalités de la précession, dépendantes de sin A et de sin 2A, ont donc leurs coefficiens dans le rapport de l'unité à - 1/2. tang 20.

MÉCAN. CÉL. Tome V.

De la Nutation de l'orbe lunaire, correspondante à la Nutation de l'équateur terrestre.

Le centre de gravité du système formé de la Lune et de la Terre est attiré par le Soleil, à très peu près comme si toutes les molécules de ce système étaient réunies à ce centre; ce qui par le n° 10 du Livre II, résulte de la proximité de la Lune à la Terre, relativement à sa distance au Soleil. De là il suit que la somme des aires tracées à chaque instant par le rayon vecteur de chaque molécule projetée sur l'écliptique autour de leur centre commun de gravité, est constante. Soient donc X, Y, Z les coordonnées du centre de gravité de la Terre, rapportées au centre de gravité du système, et au plan de l'écliptique; soient x', y', z', celles d'une molécule dm de la Terre, et x, y, z, celles du centre de la Lune, rapportées toutes au centre de gravité de la Terre. On aura les deux inégalités dépendantes de cos A et de

$$fdm \left[ (X - x') \left( \frac{dY - dy}{dt} \right) - (Y - y') \left( \frac{dX - dx}{dt} \right) \right]$$

$$+ L \left[ (x - X) \left( \frac{dy - dY}{dt} \right) - (y - Y) \left( \frac{dx - dX}{dt} \right) \right] = \text{const.} \right\}; (1)$$

L'étant la masse de la Lune. Mais on a par la nature du centre de gravité,

$$\int x'dm = 0$$
;  $\int y'dm = 0$ ;  $\int z'dm = 0$ .

Soit T la masse de la Terre, on aura tinhorq , T ob noissorque de le

On a de plus par la propriété du centre de gravité, em est el sup de

$$L(x-X)=TX$$

ce qui donne

$$\frac{5 \text{L}}{\text{er}^{3}} \cdot \underbrace{\frac{5 \text{L}}{1 + \text{T}}}_{\text{or}} \cong \mathbf{X}^{\circ} \wedge .$$

MECAN CEL. Tome V.

l'équation (1) deviendra donc

$$\int dm \left(\frac{x'dy' - y'dx'}{dt}\right) + \frac{TL}{T + L} \left(\frac{xdy - ydx}{dt}\right) = \text{constante.}$$

La première des équations (C) du n° 26 du premier Livre donne

Aq. 
$$\sin \theta$$
.  $\sin \varphi + Br$ .  $\sin \theta$ .  $\cos \varphi - Cp$ .  $\cos \theta = -\int dm \left(\frac{x'dy' - y'dx'}{dt}\right)$ , (1)

et l'on a en vertu des expressions de p, q et r du n° précédent,

A. 
$$\sin \theta (q. \sin \varphi + r. \cos \varphi) + (B - A) \sin \theta . r. \cos \varphi$$

$$= A \cdot \frac{d\psi}{dt} \cdot \sin^2\theta + \frac{(B-A)}{2} \frac{d\psi}{dt} \sin^2\theta + \frac{(B-A)}{2} \left\{ \begin{array}{l} \frac{d\psi}{dt} \cdot \sin^2\theta \cdot \cos 2\phi \\ + \frac{d\theta}{dt} \cdot \sin\theta \cdot \sin 2\phi \end{array} \right\}$$

L'équation précédente (l) deviendra en négligeant les termes multipliés par le sinus et le cosinus de  $2\varphi$ , ce qui par le n° précédent, réduit p à la constante n,

$$n C \cdot \cos \theta = \frac{(A+B)}{2} \frac{d\psi}{dt} \cdot \sin^2 \theta + \frac{TL}{T+L} \left( \frac{xdy-ydx}{dt} \right) = \text{constante.}$$
 (2)

L'aire tracée dans l'instant dt, par le rayon vecteur de la Lune, est xdy - ydx. En désignant par a le demi-grand axe de l'orbe lunaire, par e son excentricité et par y l'inclinaison de cet orbe à l'écliptique; on a, en regardant cet orbe, comme une ellipse variable,

$$xdy - ydx = a^{2} m'dt \cdot \cos \gamma \cdot \sqrt{1 - e^{2}},$$

m't étant le moyen mouvement de la Lune. La partie de V' qui produit la nutation de l'équateur terrestre, est par le n° précédent,

$$-\frac{3L}{4r_4^3}(2C-A-B)\gamma \cdot \sin\theta \cdot \cos\theta \cdot \cos\Lambda,$$

A étant la longitude du nœud de l'orbe lumaire. J'ai donné dans le n° r, du Supplément au Traité de Mécanique céleste, les expressions différentielles des élémens d'une ellipse variable, par une force perturbatrice R. Cette force est augmentée par la considération de l'aplatissement de la Terre, de

la fonction—V, comme il est facile de le voir par le n° cité. Il résulte encore des expressions différentielles du demi grand-axe, et de l'excentricité e, que la partie de V' dont je viens de parler, ne produit aucun terme sensible, dans ces expressions; en sorte que l'on peut supposer relativement à cette partie, a et e constans. L'équation (2) donne donc, en y substituant pour  $\frac{xdy-ydx}{dt}$ , sa valeur précédente; en désignant par  $\theta$  et  $\theta$ , les nutations de l'équateur terrestre et de l'orbe lunaire, et en observant que  $\frac{d\psi}{dt}$  peut être négligé relativement à  $\theta$  qui par l'intégration, a acquis pour diviseur, le très petit coefficient du temps, dans l'expression du mouvement des nœuds de l'orbe lunaire; enfin en négligeant le carré  $e^a$ ;

$$nC.S\theta.\sin\theta = -\frac{TL}{T+L}.a^2.m^1.S\gamma.\sin\gamma.$$

Telle est la relation fort simple qui existe entre les nutations de l'équateur terrestre et de l'orbe lunaire.

On a par le nº 5 du Livre V,

$$nC.\mathcal{H}.\sin\theta = \frac{3m^2}{4}.\frac{\lambda \cdot c'}{f'}(2C - A - B)\sin\theta \cdot \cos\theta \cdot \cos(f't + C),$$

e' étant l'inclinaison de l'orbe lunaire, que nous désignons ici par  $\gamma$ , et  $-f't-\mathcal{E}$  étant la longitude de son nœud ascendant. On a

Laire trace dans l'instant 
$$\frac{d}{dt} + \mathbf{T}$$
 is rayon vecteur de la Lame) est  $xdy - ydx$ . En désigi;  $z^l m = \frac{d}{dt} + \mathbf{T}$  i;  $\frac{1}{ta} = \frac{d}{dt} + m$  are de l'orbe lumaire,

on aura donc en comparant les deux expressions précédentes de  $\delta\theta$ , et désignant f't par (g-1)m't,

$$\delta \gamma = -\frac{3}{4a^2} \cdot \frac{(2C - A - B)}{(g - 1)} \sin \theta \cdot \cos \theta \cdot \cos \left[ (g - 1) m't + \beta \right].$$

On a par le nº 2 du Livre V perrot metaupo l' ob notatun al traborq

$$2C - A - B = \frac{4}{3} \cdot T \left(\alpha h - \frac{\tau}{2} \alpha \varphi\right) D^{a}$$

ah étant l'ellipticité du sphéroïde terrestre, αφ le rapport de la force centrifuge à la pesanteur à l'équateur, et D étant le rayon moyen du sphéroïde terrestre; on a donc

$$\delta \gamma = -\left(\alpha h - \frac{1}{2}\alpha \varphi\right) \frac{D^2}{a^2} \cdot \frac{\sin \theta \cdot \cos \theta}{g-1} \cdot \cos \left[\left(g-1\right)m't + 6\right].$$

Soient

$$H \cdot \sin(it+k) + H' \cdot \sin(i't+k') + \text{etc.}$$

les inégalités de la latitude de la Lune, dépendantes de l'aplatissement de la Terre; les angles it + k, i't + k', étant rapportés comme la longitude A du nœud ascendant de l'orbite lunaire, à l'équinoxe du printemps. La latitude lunaire étant

$$\gamma \cdot \sin(m't - \Lambda)$$
,

sa variation relative aux variations de ses élémens, sera

ou 
$$\int_{\gamma} \cdot \sin \left( m't - \Lambda \right) - \gamma \int_{\gamma} \Lambda \cdot \cos \left( m't - \Lambda \right);$$

$$\sin m't \left( \int_{\gamma} \cdot \cos \Lambda - \gamma \int_{\gamma} \Lambda \cdot \sin \Lambda \right)$$

$$- \cos m't \left( \int_{\gamma} \cdot \sin \Lambda + \gamma \int_{\gamma} \Lambda \cdot \cos \Lambda \right).$$

En l'égalant à la fonction

$$H \cdot \sin(it+k) + H' \cdot \sin(it+k') + \text{etc.},$$

mise sous cette forme

$$\sin m' t \{ H \cdot \cos [(i - m') t + k] + H' \cdot \cos [(i' - m') t] + k' \} + \text{etc.},$$
  
  $+ \cos m' t \{ H \cdot \sin [(i - m') t + k] + H \cdot \cos [(i' - m') t] + k' \} + \text{etc.};$ 

on aura

$$\delta \gamma \cdot \cos \Lambda - \gamma \delta \Lambda \cdot \sin \Lambda = H \cdot \cos[(i-m')t+k] + H' \cdot \cos[(i'-m)t+k'] + \text{etc.},$$
  
 $\delta \gamma \cdot \sin \Lambda + \gamma \delta \Lambda \cdot \cos \Lambda = -H \cdot \sin[(i-m')t+k] - H' \cdot \sin[(i'-m)t+k'] - \text{etc.},$ 

Si l'on multiplie la première de ces équations par cos A, et qu'on l'ajoute à la seconde multipliée par sin A, on aura

$$\delta \gamma = H \cdot \cos \left[\Lambda + (i - m')t + k\right] + H' \cdot \cos \left[\Lambda + (i' - m')t + k'\right] + \text{etc.}$$

En comparant cette valeur de Sy, à la précédente, on aura

$$H = -\alpha \left(h - \frac{i}{2}\phi\right) \frac{D^2}{a^2} \cdot \frac{\sin\theta \cdot \cos\theta}{g - 1};$$

$$H' = 0; \text{ etc.} \Delta = 0 \text{ and } \frac{\sin\theta \cdot \cos\theta}{g - 1};$$

Les inégalités lunaires en latitude, dues à l'aplatissement de la Terre, se réduisent ainsi à la suivante

$$-(ah-\frac{1}{2}a\phi)\cdot\frac{D^2}{a^2}\cdot\frac{\sin\theta\cdot\cos\theta}{g-1}\cdot\sin m't;$$

ce qui est conforme à ce que j'ai trouvé dans le chapitre II du Livre VII.

Des inégalités de la Précession et de la Nutation de l'équateur terrestre, dépendantes de la quatrième puissance des parallaxes du Soleil et de la Lune.

4. Si l'on nomme v la déclinaison d'un astre L; v sa longitude à l'équinoxe du printemps;  $\psi$  la distance de cet équinoxe à une ligne fixe sur l'écliptique; V' la somme des produits de la masse L de l'astre par chaque molécule dm de la Terre, divisée par la distance de cette molécule au centre de L; enfin si l'on nomme T la masse de la Terre, et r la distance de son centre, à celui de L; on aura par le n° 35 du troisième Livre

$$V' = \frac{TL}{r} + \frac{(\frac{1}{2}a\phi - ah)}{r^{\frac{1}{2}}} \cdot TL \left(\sin^{2}\phi - \frac{1}{3}\right)$$

$$\frac{aq}{r^{\frac{1}{2}}} \cdot TL \left(\sin^{3}\phi - \frac{3}{5} \cdot \sin\phi\right) + \text{etc.};$$

en supposant que le rayon terrestre soit

$$1 - \alpha h(\mu^3 - \frac{1}{3}) + \alpha q(\mu^3 - \frac{3}{5}\mu) + \text{etc.},$$

μ étant le sinus de la latitude terrestre. Le terme

$$\frac{\alpha q \cdot TL}{r_1} \left( \sin^3 v - \frac{3}{5} \cdot \sin u \right)$$

est le terme que la considération de la quatrième puissance de la parallaxe de L ajoute à l'expression de V' donnée ci-dessus. Pour en déterminer la valeur, nous observerons que s étant la latitude de L; y l'inclinaison de son orbite, et A la longitude de son nœud ascendant, on a

$$\sin v = \cos \theta \cdot \sin s + \sin \theta \cdot \sin v \cdot \cos s;$$
  
 $\tan g s = \tan g \gamma \cdot \sin (v - \Lambda).$ 

Ces équations donnent

En effet, si F est formé d'angles rapportés à l'équinoxe mobile du printemps, et que i soit le nombre de ces angles pris positivement, et i' le nombre des angles pris négativement, on a généralement

$$\theta$$
 ab quality of an  $\left(\frac{d \cdot \sin F}{d\psi}\right) = (i - i') \cos F$ ;  $\phi$  where  $\phi$  and  $\phi$ 

il est clair que par la variation de 4, l'angle A - 4 reste invariable. De la il est facile de conclure que le terme précédent dépendant de  $\frac{1}{r^4}$ , ajoute à la valeur de  $\frac{d\theta}{dt}$ , donnée ci-dessus, la quantité

$$\frac{3\alpha q. \text{TL.} \cos v. \cos s}{n \text{C.} r^{\frac{1}{4}}} \left( \sin^{2} v - \frac{1}{5} \right),$$
self-dispersion and properties of the self-dispersion and the self-dispersio

en négligeant le carré de 2, cette fonction devient

$$\frac{3aq. \text{TL}}{n\text{C.}r^{\frac{1}{4}}} \cdot \cos \upsilon \left\{ -\frac{1}{2} \cdot \sin^{2}\theta - \frac{1}{5} - \frac{1}{2} \cdot \sin^{2}\theta \cdot \cos 2\upsilon - \frac{1}{2} \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta \left[ \sin \left( 2\upsilon - \Lambda \right) - \sin \Lambda \right] \right\}$$

On voit d'abord que cette fonction ne contient point le sinus on le cosinus de la longitude A du nœud, les seuls qui, affectés de v, puissent devenir sensibles par l'intégration qui leur fait acquérir un très petit diviseur. Ainsi le coefficient de la nutation ne recoit aucure augmentation des termes dépendans de la quatrième puissance de la parallare lunaire; ce qui a également lieu pour la précession. La seule influence que puisse avoir cette puissance, dépend de l'excentricité e de l'orbe lunaire. En effet, r étant à peu prés une de sup de  $\frac{1}{01}$  et successe une de  $\frac{1}{01$ 

la fonction précédente donnera le terme

$$\frac{3aq \cdot TL}{4nC \cdot r_1^3} \cdot \frac{1}{r_1} \cdot e \cdot \cos \varpi \left( \sin^2 \theta - \frac{4}{5} \right)$$
.

En nommant it le mouvement du périgée lunaire, il en résultera dans la valeur de  $\theta$ , le terme

printemps, et que 
$$i$$
 soit le nombre des argles  $\frac{3aq.TL}{i}$ .  $\frac{1}{i}$ .  $\frac{e.\sin \pi}{i}$  a généralement et  $i$  le nombre des argles  $\frac{1}{i}$ .  $\frac{e.\sin \pi}{i}$ .

Le terme de V' dépendant de  $\frac{1}{r_t^2}$ , produit dans la valeur de  $\theta$ , le terme

$$(\alpha h - \frac{1}{2}\alpha \phi) \frac{\text{TL}}{4\text{C.} r_1^3} \cdot \cos \theta \cdot \frac{\gamma \cdot \cos \Lambda}{f'}; \text{ where } 1 \text{ de } 1 \text{ det}$$

f't étant le mouvement rétrograde du nœud. Ainsi en nommant b le coefficient de  $\cos \Lambda$ , ou de la nutation, le coefficient de  $\sin \varpi$  sera

$$b \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{e}{\gamma} \cdot \frac{f'}{i} \cdot \frac{1}{r_1} \cdot \frac{(\sin \theta - \frac{4}{5})}{\cos \theta} \frac{\alpha q}{\alpha h - \frac{1}{2} \alpha \varphi}; \quad (\mu)$$

coefficient insensible; car i' est à peu près égal à 2f';  $\frac{e}{\gamma}$  est environ  $\frac{3}{5}$ ; et  $\frac{1}{r_1}$  environ  $\frac{1}{60}$ ; et les expériences du pendule prouvent que  $\alpha q$  doit être beaucoup plus petit que  $\alpha h - \frac{1}{4} \alpha \phi$ ; comme on peut le voir dans le Livre XI.

Relativement au Soleil, l'expression de  $e \cdot \sin \varpi$  est, par le chapitre VII du second Livre, composée de termes de la forme  $c \cdot \sin it + \varepsilon$ . Lagrange a donné dans les Mémoires de l'Académie de Berlin, pour l'année 1782, les valeurs numériques de c et de it, d'après des suppositions sur les masses des planètes, qui ne sont pas, sans doute, exactes, mais que l'on peut regarder comme suffisamment approchées pour notre objet; il en résulte que la plus grande des valeurs de c est au-dessous de  $\frac{1}{10}$  et que les valeurs annuelles de it, diffèrent peu de  $\pm 50''$  sexagésimales. En adoptant pour it cette valeur; en faisant

c égal à  $\frac{1}{10}$ ; observant ensuite que  $\frac{1}{r_1}$  est environ  $\frac{1}{24000}$  et que la formule  $(\mu)$  doit être divisée par le rapport de l'action de la Lune à celle du Soleil, rapport égal à 2,3 à fort peu près; on trouve que la formule (u) est au-dessous d'une demi-seconde sexagésimale multipliée par

De la i ah - i ap al ela Lune.

De là il suit que ce genre d'inégalités sera toujours insensible.

Les Anciens avaient reconnu que la Lune vous présente toujours

corps qui circule autone d'un centre. Cette erreur, ou platot cette illusion, força Copernic, pour maintenir le parallélisme de l'axe ter-

vement de la Terre dans son orbite, et assujetti aux mêmes inegalités; ce qui compliquait beaucoup son système. Képler remarqua le propier,

que le parellélieure de l'axe de rotation d'un globe doit conserver toujours de lui-même, une situation jarrellèle dans les civers mouvemens du centre de ce globe. Par cette romarque de livestème de

Copernio est devenu plus simple; ce qui ini est arrivé constamment par les progrès successifs de l'observation, de l'amilyse et de la Dyna-

et de certitude. En étendant la remarque de Répler n la Lone, le phénomène suivent lequel cet actre nous présente taniours la même

hémisphère, et qui semblait si naturel, devenir très difficile à expliquer. Il fallait admettre que égalité rigourouse entre la dirée de la

rotation de la Lune et la durée de sa révolution autour de la Terre, évalité dont il était impossible slors d'entroyoir la cause

Galilée recounut par des considérations tirces de l'Optiques que

c egal à 10 doit être divisée par le rapport de l'action de la Lune à

## celle du Soleil, rapport egal à 2,3 à fort peu près; on trouve que la formule (u) est au-de His ARTIGA HDe sexagésimale multi-

### De la Libration de la Lune.

De là il suit que ce genre d'inégalités sera toujours insensible.

Notice historique des travaux des Astronomes et des Géomètres sur cet objet.

4. Les Anciens avaient reconnu que la Lune nous présente toujours la même face, dans son mouvement autour de la Terre; mais loin de s'en étonner, ils regardaient ce phénomène, comme naturel à tout corps qui circule autour d'un centre. Cette erreur, ou plutôt cette illusion, força Copernic, pour maintenir le parallélisme de l'axe terrestre, à donner à cet axe un mouvement annuel contraire au mouvement de la Terre dans son orbite, et assujetti aux mêmes inégalités; ce qui compliquait beaucoup son système. Képler remarqua le premier, que <del>le parallélisme de</del> l'axe de rotation d'un globe doit conserver toujours, de lui-même, une situation parallèle dans les divers mouvemens du centre de ce globe. Par cette remarque, le système de Copernic est devenu plus simple; ce qui lui est arrivé constamment par les progrès successifs de l'observation, de l'analyse et de la Dynamique, progrès qui l'ont enfin élevé au plus haut degré de simplicité et de certitude. En étendant la remarque de Képler à la Lune, le phénomène suivant lequel cet astre nous présente toujours le même hémisphère, et qui semblait si naturel, devenait très difficile à expliquer. Il fallait admettre une égalité rigoureuse entre la durée de la rotation de la Lune et la durée de sa révolution autour de la Terre, égalité dont il était impossible alors d'entrevoir la cause.

Galilée reconnut par des considérations tirées de l'Optique, que l'hémisphère visible de la Lune varie sans cesse par le changement

Mecan. cei. Tome V

de sa parallaxe de hauteur et de sa latitude, et il s'en assura par l'observation el sa shutial al a sudiribal il delicion el si sudiribal al a sudiribal al

Riccioli reconnut da libration en longitude, qu'il expliqua ainsi qu'Hévelius, par la supposition que la Lune présente toujours la même face au centre de son orbite; ce qui ne donne que la moitié de cette libration, si l'on considère l'orbite comme une ellipse; mais ce qui la donne tout entière, si l'on considère avec Riccioli, cette orbite comme un cercle excentrique. Newton, dans une lettre écrite à Mercator en 1675, donna une explication semblable, en faisant mouvoir uniformément la Lune autour de son axe de rotation, pendant qu'elle se meut inégalement autour de la Terre; mais il supposait l'axe de rotation perpendiculaire à l'écliptique. Enfin, Dominique Cassini reconnut par l'observation, que cet axe est incliné à l'écliptique; et que ses nœuds coincident toujours avec les nœuds de l'orbite lunaire, en sorte que les pôles de cette orbite, de l'écliptique et de l'équateur lunaire, sont constamment sur un même cercle de latitude, le pôle de l'écliptique étant entre les deux autres. Cassini, par cette découverte l'une des plus importantes qu'il ait faites, et qu'il publia en 1693 dans son Traité de l'origine et des progrès de l'Astronomie, compléta la théorie astronomique de la libration de la Lune.

En 1748, Tobie Mayer confirma la théorie de Cassini, par une suite nombreuse d'observations dont il calcula les résultats, suivant un procédé fort ingénieux; seulement il trouva l'inclinaison de l'équateur lunaire à l'écliptique, moindre que Cassini; mais il assure que des observations faites du temps de ce grand astronome, donnent l'inclinaison qu'il trouva en 1748.

Lalande, en 1764, parvint au moyen de nouvelles observations, aux résultats de Mayer. MM. Bouvard et Arago voulurent bien à ma prière, entreprendre en 1806, une nouvelle suite d'observations qui fut continuée par MM. Bouvard et Nicollet, et qui par le nombre et la précision des observations, surpasse les précédentes et confirme l'invariabilité de l'inclinaison de l'équateur lunaire à l'écliptique, et la coîncidence constante de ses nœuds avec ceux de l'orbe lunaire.

Newton parle de la libration de la Lune, dans les propositions XVII et XXXVIII du troisième Livre de son ouvrage des Principes. Dans la proposition XVII de la première édition, antérieurement à la publication du Traité de Cassini, il attribue la libration en latitude,

à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Lune au plan de son orbite dans la troisième édition, il l'attribue à la latitude de la Lune, et à l'inclinaison de son axe sur l'écliptique, inclinaison que le Traité de Cassini avait fait connaître.

C'est dans la proposition XXXVIII du troisième Livre, que Newton parle de la cause physique de la libration de la Lune. Il détermine d'abord la figure de la Lune qu'il considère comme un ellipsoïde de révolution homogène et fluide. Il trouve que son grand axe doit être dirigé vers la Terre, et qu'il surpasse d'environ soixante mètres, le diamètre de son équateur. Ce grand géomètre n'a point eu égard à la force centrifuge due au mouvement de rotation de la Lune, sans doute parce qu'il la jugeait insensible relativement aux forces résultantes de l'attraction terrestre. Mais elle est du même ordre, et elle change la figure de la Lune supposée fluide et homogène, dans une ellipsoïde qui n'est pas de révolution, et dont l'axe de rotation est le plus petit axe. L'axe moyen et le grand axe, sont dans le plan de l'équateur, et le plus grand axe est dirigé vers la Terre : l'excès du plus grand sur le plus petit axe, est quadruple de l'excès de l'axe moyen sur le plus petit axe, et environ 1/27640 de ce petit axe. «C'est ce qui fait, dit Newton, que la » Lune présente toujours le même côté à la Terre; car elle ne peut être

» en repos dans une autre position, mais elle doit retourner sans cesse » à celle-là, en oscillant. » Cela suppose que le moyen mouvement de rotation de la Lune est rigoureusement égal à son moyen mouvement de révolution. Il y a une invraisemblance infinie à supposer que cette égalité rigoureuse a eu lieu à l'origine; en sorte que l'on peut regarder comme certain qu'il y a eu primitivement une très petite différence entre ces mouvemens, et que l'attraction de la Terre a établi et maintient constamment entre eux une rigoureuse égalité. Newton n'a point considéré cet effet de l'attraction terrestre, qu'il aurait pu cependant reconnaître par un de ces concepts au moyen desquels il a souvent suppléé à l'état d'imperfection où était de son temps l'analyse de l'infini, pour arriver à des résultats que cette analyse perfectionnée a confirmés et généralisés. Concevons que l'on transporte à chaque instant le mouvement du centre de gravité de la Lune, à toutes ses parties et à la Terre; ce centre sera immobile, et la Terre tournera autour de lui, avec une vitesse angulaire que nous supposerons uniforme. Donnons au sphéroïde lunaire, un mouvement moyen angulaire de rotation égal à cette vitesse. Si son grand axe eût été à l'origine, sur le rayon mobile qui joint les centres de la Lune et de la Terre, et qu'au premier instant il l'eût exactement suivi; il ne s'en serait jamais écarté. Mais s'il y avait eu au premier instant, une très petite différence entre les vitesses angulaires du rayon vecteur et de l'axe du sphéroïde, ces deux lignes se seraient successivement écartées l'une de l'autre; mais à cause de l'extrême petitesse que nous supposons à cette différence, l'attraction terrestre tendant sans cesse à ramener l'axe sur le rayon, aurait fini par la diminuer. On voit à priori et un calcul fort simple prouve, que l'axe doit alors osciller sans cesse de part et d'autre du rayon vecteur dans des limites d'autant plus rapprochées, que la différence primitive des vitesses de l'axe et du rayon aura été plus petite. La vitesse angulaire de rotation du grand axe ou de la Lune variera donc sans cesse : sa valeur moyenne sera la vitesse moyenne angulaire de révolution de la Lune, dont elle a pu différer primitivement d'une quantité arbitraire, mais extremement petite; ce qui fait disparaître l'invraisemblance infinie d'une égalité rigoureuse à l'origine.

D'Alembert appliqua ses formules de la précession des équinoxes, à la libration de la Lune. Mais ce grand géomètre qui avait si bien senti l'influence de la rapidité du mouvement de rotation de la Terre sur les mouvemens de nutation et de précession de son équateur, ne fit pas attention aux changemens que la lenteur du mouvement de rotation de la Lune, et surtout la circonstance de l'égalité de ce mouvement à celui de révolution, doivent produire dans les mouvemens de précession et de nutation; ce qui le conduisit à des résultats inexacts.

L'Académie des Sciences ayant proposé pour le sujet du prix de Mathématiques qu'elle devait décerner en 1764, la théorie de la libration de la Lune; Lagrange remporta ce prix. Sa pièce est remarquable par une profonde analyse, et surtout par l'union du principe de Dynamique de d'Alembert avec le principe des vitesses virtuelles de Jean Bernoulli; ce qui réduit de la manière la plus générale et la plus simple, la recherche des mouvemens d'un système de corps, à l'intégration des équations différentielles: alors l'objet de la Mécanique est rempli, et l'Analyse doit achever la solution des problèmes. C'est ce que Lagrange a fait voir en détail dans sa Mécanique analytique. Ce

grand géomètre, dans sa pièce, détermine d'abord la libration de la Lune en longitude. Il prouve que dans le cas où il y aurait en à l'origine une très petite différence entre les mouvemens de rotation et de révolution de la Lune, l'attraction terrestre a suffi pour établir entre ces mouvemens une égalité rigoureuse. Cette différence primitive a fait naître un mouvement d'oscillation du grand axe du sphéroïde lunaire. dirigé vers la Terre, de part et d'autre du rayon vecteur de la Lune. Lagrange détermine les lois de ce mouvement, ainsi que les petites inégalités du mouvement de rotation, correspondantes aux inégalités du mouvement de révolution. Passant ensuite à la libration de la Lune en latitude, il donne les éguations différentielles de l'inclinaison de l'équateur lunaire et du mouvement de ses nœuds. Mais avant négligé en les intégrant, comme on le peut relativement à l'équateur terrestre. les différences secondes, ce qui, par ce qui précède, simplifie considérablement l'intégration de ces équations; il ne put expliquer le phénomène singulier de la coïncidence des nœuds de l'équateur et de l'orbite lunaire : seulement, il trouva que cette coincidence existe dans un cas particulier qui fait entrevoir sa possibilité dans le cas général. Mais les inégalités arbitraires introduites par l'intégration complète des équations aux différences secondes, peuvent seules expliquer comment, dans le cas infiniment vraisemblable d'une très petite différence initiale entre les positions des nœuds de l'orbite et de l'équateur lunaire, l'attraction terrestre établit et maintient la coincidence de leurs nœuds movens. Lagrange, dans les Mémoires de l'Académie de Berlin pour l'année 1780, reprit la théorie de la libration de la Lune, au moyen d'une très belle analyse : il expliqua de la manière la plus heureuse la coïncidence des nœuds moyens de l'équateur et de l'orbite lunaire, et il détermina la loi des oscillations du nœud vrai de l'équateur lunaire, Autour de son nœud moyen a recorner de son nœud moyen autour de son nœud moyen a recorner de son nœud m

Il restait, pour compléter la théorie de la Lune, à déterminer l'influence des grandes inégalités séculaires des mouvemens de la Lune, sur les phénomènes de sa libration : c'est ce que j'ai fait dans le chapitre II du cinquième Livre. Les inégalités séculaires de son mouvement de révolution s'élevant à plusieurs circonférences, devraient à la longue, présenter à la Terre toutes les parties de sa surface. Mais je démontre que l'attraction de la Terre sur le sphéroïde lunaire donne au mouvement de rotation de ne sphéroïde, les inégalités

séculaires de son mouvement de révolution, et rend invisible à jamais, l'hémisphère opposé à celui qu'elle nous présente. Je fais voir encore que cette même attraction maintient les mêmes inclinaisons moyennes de l'équateur et de l'orbite lunaire sur l'écliptique vraie et la coïncidence de leurs nœuds, au milieu des mouvemens séculaires de cette écliptique. Ce résultat est analogue à celui que l'attraction du Soleil et de la Lune sur le sphéroïde terrestre produit, en réduisant au quart environ, les variations séculaires de l'obliquité de l'écliptique et de la longueur de l'année, qui auraient lieu par l'action des planètes, si la Terre était sphérique, et qui deviendraient insensibles, si le mouvement des équinoxes était aussi rapide que celui des nœuds de l'orbite lunaire.

En discutant avec un soin particulier les inégalités de la libration en latitude, M. Poisson a reconnu une petite inégalité qui dépend de la différence en longitude, du nœud et du périgée lunaire. Un nouvel examen de la théorie de la libration, m'a fait voir ensuite que rien de sensible n'avait été omis; en sorte que cette théorie ne laisse maintenant à désirer qu'une longue suite d'observations au moyen desquelles on puisse déterminer avec précision, les quantités inconnues que cette théorie renferme, et surtout les rapports des momens d'inertie des trois axes principaux du sphéroide lunaire. C'est dans cette vue, que j'avais invité les astronomes de l'Observatoire royal, à vouloir bien entreprendre cette suite d'observations, et à la comparer aux formules de la théorie. M. Nicollet a exécuté ce travail important en y employant 174 observations faites par lui et par MM. Bouvard et Arago. L'inclinaison de l'équateur lunaire à l'écliptique qu'il trouve en degrés sexagésimaux de 1° 28' 45", et qui ne diffère que de 15" de celle que Mayer avait trouvée, est une donnée précieuse en ce qu'elle détermine avec beaucoup d'exactitude, les rapports des momens d'inertie du plus grand et du plus petit axe du sphéroïde lunaire. La plus sensible des inégalités de la libration, est l'inégalité de la libration en longitude, dépendante du sinus de l'anomalie moyenne du Soleil. M. Nicollet trouve en secondes sexagésimales, 4'48",7 pour le coefficient de cette inégalité qui donne le rapport des momens d'inertie du plus grand axe et de l'axe moyen du sphéroïde lunaire. Mais pour que l'on puisse compter sur ce rapport, il faut un nombre plus grand encore d'observations.  $= \frac{3L}{4} \left( \frac{(C-B)}{A} \cdot \sin(u-\varphi) \left[ s' \cdot \sin(u-\varphi) + s \cdot \cos(u-\varphi) + \gamma \cdot \sin u \right] \right)$ 

91

#### Remarques sur la théorie de la libration de la Lune.

5. Les formules que j'ai données dans le chapitre II du cinquième Livre, me paraissent laisser peu de chose à désirer. Il y a quelques fautes d'impression, dont je donnerai l'errata à la fin de ces remarques.

L'expression de la libration en latitude, renferme une petite inégalité qui pouvant devenir sensible dans des observations exactes, mérite d'être considérée. Pour la déterminer, nous transporterons à la Lune, les expressions de dp, dq et dr du n° 2; et nous observerons que l'inclinaison de l'équateur lunaire à l'écliptique, étant très petite, nous pouvons négliger son carré et son produit par le carré de l'inclinaison de l'orbite lunaire. Cela posé, on aura par le nº 2,

$$Adq + (C - B) \cdot prdt = \frac{3L \cdot dt}{r_1^{3}} (C - B) \sin(\upsilon - \varphi) [\theta \cdot \sin \upsilon + \gamma \cdot \sin \upsilon],$$

$$Bdr + (A - C) \cdot pqdt = \frac{3L \cdot dt}{r_1^{3}} (A - C) \cos(\upsilon - \varphi) [\theta \cdot \sin \upsilon + \gamma \cdot \sin \upsilon].$$

L'est ici la Terre, v est sa longitude vue de la Lune et rapportée au nœud de l'orbite lunaire, en sorte que y sin v est sa latitude vue pareillement de la Lune. Soit

Les équations différentielles précédentes relatives à dq et dr, deviendront, en y substituant m pour p, et en négligeant les différentielles  $s \frac{dp}{dt}$  et  $s' \frac{dp}{dt}$ , ce que l'on peut faire ici, et anno imperiment

$$\frac{dds}{dt^2} - \frac{(A+B-C)}{B} \cdot m \frac{ds'}{dt} + \frac{m^2(C-A)}{B} \cdot s$$

$$= \frac{3L}{t'^3} \cdot \frac{(A-C)}{B} \cdot \cos(\upsilon - \varphi) [s' \cdot \sin(\upsilon - \varphi) + s \cdot \cos(\upsilon - \varphi) + \gamma \cdot \sin\upsilon].$$

 $v - \varphi$  est, comme on le voit dans le chapitre II du cinquième Livre, un très petit angle, en sorte qu'on peut le supposer nul, et faire son cosinus égal à l'unité.

 $\sin(\upsilon-\varphi)$  contient à fort peu près, par le chapitre II du cinquième Livre, le terme  $2e \cdot \sin(mt-\varpi)$ , e étant l'excentricité de l'orbe lunaire;  $\varpi$  étant la longitude de son périgée; les angles mt et  $\varpi$  étant comptés du nœud ascendant de l'orbite lunaire. Le second membre de la première des deux équations précédentes contient donc le terme

$$3m^2$$
.  $\frac{(G-B)}{A}(\gamma+\theta)$  2e.  $\sin(mt-\varpi)\sin mt$ ,

et par conséquent celui-ci,

$$3m^2 \cdot \frac{(C-B)}{A}(\gamma+\theta) e \cdot \cos \varpi$$
.

On trouvera de la même manière, que le second membre de la deuxième des mêmes équations, contient le terme

$$3m^2 \cdot \frac{(A-C)}{B} (\theta + \gamma) 3e \cdot \cos(mt - \varpi) \sin mt + 2e \cdot \sin(mt - \varpi) \cos mt$$

et par conséquent celui-ci,

$$\frac{3m^2(A-C)}{2B}(\theta+\gamma)e \cdot \sin \varpi;$$

ces deux équations deviennent ainsi, en ne considérant dans leurs seconds membres, que ces termes,

$$-\frac{dds'}{dt^2} - \frac{(A+B-C)}{A} \cdot m \frac{ds}{dt} - \frac{(C-B)}{A} \cdot m^2 s'$$

$$= 3m^2 \cdot \frac{(C-B)}{A} (\gamma + \theta) e \cdot \cos \varpi,$$

$$\frac{dds}{dt^2} - \frac{(A+B-C)}{A} \cdot m \frac{ds'}{dt} + \frac{m^2(C-A)}{B} \cdot s$$

$$= -3m^2 \cdot \frac{(C-A)}{2B} (\theta + \gamma) e \cdot \sin \varpi;$$

MECAN. CÉL. Tome V.

 $\varpi$  étant rapporté au nœud ascendant de l'orbite lunaire. La longitude du périgée de la Terre vue de la Lune est la longitude du périgée de la Lune vue de la Terre, moins la demi-circonférence de l'orbite lunaire; Si l'on suppose it+L, la longitude de ce dernier périgée, rapportée à un point fixe, et O-g't la longitude du nœud rapportée au même point, on aura

$$\varpi = (i + g')t + L - O -$$
la demi-circonférence;

alors  $m \cdot \frac{(C-A)}{B}$  et  $m \cdot \frac{(C-B)}{A}$  étant fort petits par rapport à  $m \cdot (i+g')$ ; on aura à fort peu près

$$s = 3m^{2} \cdot \frac{(C-B)}{A} \cdot \frac{(\gamma+\theta)e}{i+g'} \cdot \sin\left[(i+g')t + L - O\right],$$

$$s' = 3m^{2} \cdot \frac{(C-A)}{2B} \cdot \frac{(\gamma+\theta)e}{i+g'} \cdot \cos\left[(i+g')t + L - O\right].$$

θ étant par le chapitre II du cinquième Livre, égal à

$$\frac{3m(A-C)\gamma}{3m(A-C)+aAg'};$$

on aura par ce même chapitre, pour les expressions complètes s et de s',

$$s = \frac{3m(C-A)}{2Ag'-3m(C-A)} \cdot \gamma \cdot \sin(mt+g't-O)$$

$$+3m^2 \cdot \frac{(C-B)}{A} \cdot \frac{(\gamma+\theta)e}{i+g'} \cdot \sin[(i+g')t+L-O],$$

$$s' = \frac{3m(C-A)}{2Ag'-3m(C-A)} \cdot \gamma \cdot \cos(mt+g't-O)$$

$$+3m^2 \cdot \frac{(C-A)}{2B} \cdot \frac{(\gamma+\theta)e}{i+g'} \cdot \cos[(i+g')t+L-O].$$

M. Nicollet a trouvé par la comparaison de 174 observations de la libration de la Lune, en longitude, et d'un même nombre d'observations de la libration en latitude, l'inclinaison  $\theta$  de l'équateur lunaire à l'écliptique, en degrés sexagésimaux, égale à 1°28'45"; ce qui ne dif-

fère que de 15" du résultat de Mayer; et il en a conclu

$$\frac{C-A}{C} = 0,00059701$$
:

il a trouvé par les mêmes observations, l'équation de la libration en longitude dépendante de l'anomalie du Soleil, égale à

4'49",7 . sin (anomalie moyenne du Soleil),

et il en a conclu

$$\frac{B-A}{C} = 0,000563916.$$

Mais cette valeur de  $\frac{B-A}{C}$ , n'est pas aussi sûre que celle de  $\frac{C-A}{C}$ ; à cause de la petitesse de l'équation de la libration en longitude. Un nombre plus grand encore d'observations déterminera plus exactement cette valeur, et alors la théorie physique de la libration de la Lune sera complète.

### Errata du chapitre II du Livre V, Tome II.

Page 357, ligne 3 en remontant, 358, 4, 10 et 18, 361, 10 et 19, changez le signe des termes multipliés par sin π.

365, lignes 7 et 8 en remontant, changez  $gt + \varepsilon$  en  $mt - gt - \varepsilon$  Ibid., ligne 4 en remontant, changez  $\sin(lt + 1)$  dans  $\cos(lt + 1)$ 

en degrés sexagésimanx, égale à 1°28'45"; ce qui n

### CHAPITRE III.

Des anneaux de Saturne.

Notice historique des travaux des Astronomes et des Géomètres sur cet objet.

diverses parties se d'tachuraient à la longue

Mins bellie wilden doe Hyides of Isbijanstique CALILÉE observa le premier l'anneau de Saturne. Il le vit dans ses faibles lunettes, sous la forme de deux corps lumineux contigus à deux parties opposées de la surface de la planète. Quelquefois, Saturne lui parut rond comme les autres planètes. Ces apparences singulières furent ensuite observées par d'autres astronomes. Enfin, Huygens les ayant suivies au moyen d'excellens objectifs qu'il avait construits luimême, en découvrit les lois et la cause. Il fit voir que Saturne est environné d'un anneau large et d'une très mince épaisseur, suspendu autour de lui à une petite distance, et incliné à son orbite d'un douzième environ de la circonférence, ce qui lui donne une forme apparente elliptique. Cet anneau disparaît toutes les fois que le Soleil ou la Terre traversent son plan; il ne nous transmet alors de lumière, que par ses bords trop minces pour être aperçus. L'accord de cette théorie avec toutes les disparitions et toutes les réapparitions de l'anneau observées depuis Huygens, ne laisse aucun doute sur sa réalité. Jacques Cassini reconnut la division de l'anneau en deux anneaux distincts. Short crut en apercevoir un plus grand nombre. Mais Herschel, avec ses puissans télescopes qui lui ont toujours fait voir les bords éclairés de l'anneau lorsqu'il avait disparu pour les autres observateurs, n'y a vu, comme Cassini, que deux anneaux situés dans un même plan, séparés par un très petit intervalle, et dont l'extérieur a moins de largeur et une lumière moins vive que l'intérieur. Dans le mois de juin de 1790, il présenta à la Société royale de Londres, une série d'observations, d'où il conclut la durée de la rotation de l'anneau intérieur de Saturne,

d'environ dix heures et demie sexagésimales. Il avait présenté à la Société royale, en novembre 1789, une suite d'observations qui lui donnaient la durée de la rotation de Saturne, presque égale à celle de l'anneau, et plus petite seulement de seize secondes sexagésimales. Ces deux résultats ont été publiés dans le volume des Transactions Philosophiques pour l'année 1790, et qui parut en 1791.

Maintenant, par quel mécanisme les anneaux de Saturne se maintiennent-ils suspendus autour de la planète? S'ils l'étaient par la seule force de cohésion, leurs diverses parties se détacheraient à la longue, les unes des autres, et finiraient par se précipiter sur Saturne, ou par former autant de satellites; et comme cela n'est point arrivé, il est naturel d'en conclure que leur suspension repose principalement sur les loix de l'équilibre des fluides. C'est ainsi que Maupertuis les a considérés dans l'explication ingénieuse de ce phénomène, qu'il a donnée dans son Discours sur la figure des astres. Il conçoit chaque molécule d'un anneau fluide, sollicitée vers le centre de la planète et vers un point intérieur de la figure génératrice de l'anneau : je nomme ainsi la section de l'anneau par un plan mené perpendiculairement à son plan, et passant par le centre de Saturne. En combinant ces deux tendances de la molécule, avec la force centrifuge due à une rotation de l'anneau dans son plan, autour du centre de Saturne; il détermine la figure que l'anneau doit prendre pour l'équilibre de toutes ses parties. Mais dans la nature, chaque molécule de l'anneau ne tend point uniquement vers deux points; elle a un nombre infini de tendances vers les autres molécules de l'anneau et vers la planète. C'est en combinant toutes ces tendances avec la force centrifuge, qu'il faut déterminer la figure d'équilibre de la section génératrice de l'anneau. Tel est le problème que je me suis proposé dans un Mémoire inséré dans le volume des Mémoires de l'Académie des Sciences de 1787, qui parut au mois de février 1789. J'ai prouvé dans ce Mémoire et ensuite dans le troisième Livre, qu'un anneau fluide peut se maintenir en équilibre autour de Saturne, en vertu de l'attraction mutuelle de ses molécules combinée avec un mouvement de rotation; si la figure génératrice de l'anneau est une ellipse aplatie dont le grand axe est dirigé vers le centre de Saturne. La durée de la rotation doit être alors la même que celle de la révolution d'un satellite dont la distance au centre de Saturne serait celle du centre de la figure génératrice, au même point : j'en avais conclu que

cette durée était d'environ 5 de jour, avant qu'Herschel l'eût reconnue par l'observation.

J'ai remarqué ensuite que si l'anneau était parfaitement semblable dans toutes ses parties, les centres de la planète et de l'anneau se repousseraient mutuellement, pour peu qu'ils cessassent de coïncider, ce qui devrait nécessairement arriver par les attractions étrangères. Le centre de l'anneau décrirait donc alors une courbe convexe vers le centre de la planète, et l'anneau finirait par atteindre la surface de la planète à laquelle il se réunirait. Il est donc nécessaire pour la stabilité de son équilibre, que ses figures génératrices soient dissemblables et que son centre de gravité ne coïncide point avec son centre de figure. Dans ce cas, l'équilibre de la masse fluide ne sera point sensiblement troublé, si les changemens des ellipses génératrices ne deviennent sensibles qu'à des distances respectives beaucoup plus grandes que les

grands axes de ces ellipses. Morajor al trasmayurom achallencos amb Les deux anneaux de Saturne placés à des distances différentes de la planète, doivent par l'action du Soleil, avoir des mouvemens différens de précession, qui, si rien ne s'y opposait, changeraient continuellement la position respective de leurs plans; ces plans ne coincideraient donc sensiblement que pendant de courts intervalles. Il est contre toute vraisemblance, de supposer que les anneaux de Saturne ont été découverts dans un de ces intervalles; il est donc très probable qu'il existe une cause qui maintient ces anneaux à peu près dans un même plan, quoique l'action du Soleil tende sans cesse à les en écarter. J'ai annoncé comme un résultat de la théorie de la pesanteur, dans le Volume cité de l'Académie des Sciences, que cette cause est l'aplatissement du sphéroide de Saturne, produit par un mouvement rapide de rotation de cette planète, mouvement qu'Herschel a confirmé depuis par l'observation. L'Analyse fait voir qu'en supposant les anneaux peu inclinés au plan de l'équateur de Saturne, cet aplatissement les maintient toujours à peu près dans ce plan dont l'action du Soleil tend à les écarter. En même temps que ces anneaux tournent autour de leurs centres de gravité, ces centres se meuvent autour du centre de la planète. De là naissent dans les positions respectives des plans des anneaux, des variations continuelles qui produisent dans la manière dont ils sont éclairés par le Soleil vers leurs apparitions et leurs disparitions, et dans celle dont ils se présentent à l'observateur,

des différences propres à expliquer les apparences singulières que l'on a quelquesois observées. Telle est la disparition d'une des anses avant l'autre qui continue de paraître du même côté de la planète, pendant une et même plusieurs périodes de la rotation de l'anneau. Tels sont encore ces points lumineux qui semblent immobiles, et qui ont porté quelques observateurs à douter de la rotation des anneaux, dont cependant la nécessité est démontrée par les lois de la Mécanique.

Suivant les observations d'Herschel, la durée de la rotation de l'anneau est de 0<sup>i</sup>,438; celle de Saturne est de 0<sup>i</sup>,427, presque égale à la précédente, mais un peu plus petite, comme cela doit être suivant l'hypothèse que j'ai proposée sur la formation des planètes, des satellites et des anneaux. Dans cette hypothèse, les satellites et les anneaux de Saturne ont été formés par les zones que l'atmosphère de la planète a successivement abandonnées à mesure qu'elle s'est resserrée en se refroidissant. Le mouvement de rotation de Saturne s'est accéléré de plus en plus en vertu du principe des aires. La durée de la rotation d'une planète doit donc être, d'après cette hypothèse, plus petite que la durée de la révolution du corps le plus voisin qui circule autour d'elle; ce qui a lieu pareillement pour le Soleil, relativement aux planètes qui sont toutes, les produits des zones abandonnées successivement par l'atmosphère solaire. Tout cela confirmé par l'observation, augmente la probabilité que beaucoup de phénomènes singuliers du système solaire donnent à l'hypothèse dont il s'agit; comme on peut le voir dans l'Exposition du Système du monde. On conçoit que dans cette hypothèse, l'anneau intérieur de Saturne étant fort voisin de la planète; la durée de sa rotation ne doit surpasser que très peu celle de la rotation de Saturue. En considérant combien la différence observée entre ces durées est petite, il est difficile de ne pas admettre que l'atmosphère de Saturne s'est étendue jusqu'à ses anneaux, et qu'ils ont été formés par la condensation de ses couches.

d analy toward tops in position are stored as a series of the series

same of the state colories par le Soleil vers lettes apparations et

des différences propres à explique les apparences singulières que l'on encore es rount lamineux qui semblent hamolides, et qui carregorie The varieties observations d'Herschel, le durce de la rotation de literate des acrocons. Dong entle hier othisse, ha satellites et les anneuns refroidissant. Le mouvement de rotation de Saturne s'est acceleve de metro elacro ino meio reala el apos un collulo par la collicia de la collicia del collicia del collicia de la collicia del collicia d into emiliaria e emigranolla el almandan el cap infliciado de el citarregas store las de cherche de sa requiere de deste une assanque fres per relle de later os for the father that the horizon is a street of order outh des formities pay lie cotrilensation de seu conches. L'esq at sous e co

LIVRE XV.

DU MOUVEMENT DES PLANETES ET DES COMETES

## TRAITÉ

DÉ

Notice historique des travens des Géomètres sur cet objet

# MÉCANIQUE CÉLESTE.

être les plus prefaits, et devoir ainsi

fection des corps terres LIVRE XV. dont copéndant ils subserdonnaient l'existence à la Terre. La complicat on des cercles qui de

DÉCEMBRE 1824.

de rechtercher un moyen plus sample d'expliquer les mouven us consent. Considérant que plusieurs enciens philosophes avaient fait traumer les Terre cer elle-même et antière du Soleil; il applique certe hypothèse aux phémomèmes, et il reconnut que le mécanisme de l'univers en devenant beuncomp plus simple, kille affrachissant la sphém des étailes, de l'incompensable viteue que sa révolution danne étainent, dans le système de Pholèmée, à ces asires éçan en communent déjà le grand éloignement. Les mouvemens rétrogrades des planètes a étaient que de

celui de la Terrer et le monvement géneral du ciel, d'ob résulte la précession des équinones, se réduinait à un monvement has tent écon-

### LIVRE XV.

DU MOUVEMENT DES PLANÈTES ET DES COMÈTES.

# TRAFFIE

Notice historique des travaux des Géomètres sur cet objet.

DE

Es ancieralization Carathagariamiaqui et Ptolemee. deterministrant les represents apparents des astres. Ils desayer entrie tes representation of whenever the set with the squitt interior être les plus parfaits, et devoir ainsi appartenir aux corps célestes; n'attribuant, par une bizarrerie de l'esprit humain, aucune imperfection des corps terrestifes Vote mêmes dires dont cependant ils subordonnaient l'existence à la Terre. La complication des cercles qu'ils avaient imaginés et qu'ils multipliaient à chaque mégalité que l'observation faisait decouvrir, avic Hraphe des bons esprits et leur avait inspiré des doutes sur le système de Ptolémée. Elle engagea Copernic à rechercher un moyen plus simple d'expliquer les mouvemens célestes. Considérant que plusieurs anciens philosophes avaient fait tourner la Terre sur elle même et autour du Soleil; il appliqua cette hypothèse aux phénomènes, et il reconnut que le mécanisme de l'univers en devenait beaucoup plus simple. Elle affranchissait la sphère des étoiles, de l'inconcevable vitesse que sa révolution diurne donnait, dans le système de Ptolémée, à ces astres dont on connaissait déjà le grand éloignement. Les mouvemens rétrogrades des planètes n'étaient que de simples apparences produites par leur mouvement réel, combiné avec celui de la Terre; et le mouvement général du ciel, d'où résulte la précession des équinoxes, se réduisait à un mouvement fort lent dans MECAN, CÉL. Tome F.

### opta lanca VX BAVILL en el multipont

DU MOUVEMENT DES PLANÈTES ET DES COMÈTES.

### CHAPITRE Ier.

Notice historique des travaux des Géomètres sur cet objet.

1. Les anciens astronomes et spécialement Hypparque et Ptolémée, déterminèrent les mouvemens apparens des astres. Ils essayèrent de les représenter par des mouvemens circulaires et uniformes qu'ils jugeaient être les plus parfaits, et devoir ainsi appartenir aux corps célestes: n'attribuant, par une bizarrerie de l'esprit humain, aucune imperfection des corps terrestres, à ces mêmes astres dont cependant ils subordonnaient l'existence à la Terre. La complication des cercles qu'ils avaient imaginés et qu'ils multipliaient à chaque inégalité que l'observation faisait découvrir, avait frappé de bons esprits et leur avait inspiré des doutes sur le système de Ptolémée. Elle engagea Copernic à rechercher un moyen plus simple d'expliquer les mouvemens célestes. Considérant que plusieurs anciens philosophes avaient fait tourner la Terre sur elle-même et autour du Soleil; il appliqua cette hypothèse aux phénomènes, et il reconnut que le mécanisme de l'univers en devenait beaucoup plus simple. Elle affranchissait la sphère des étoiles, de l'inconcevable vitesse que sa révolution diurne donnait, dans le système de Ptolémée, à ces astres dont on connaissait déjà le grand éloignement. Les mouvemens rétrogrades des planètes n'étaient que de simples apparences produites par leur mouvement réel, combiné avec celui de la Terre; et le mouvement général du ciel, d'où résulte la précession des équinoxes, se réduisait à un mouvement fort lent dans

MÉCAN. CÉL. Tome V.

l'axe terrestre. Mais pour expliquer les inégalités des mouvemens réels, Copernie adopta l'ancienne hypothèse des mouvemens circulaires et uniformes. Képler, après avoir essayé long-temps et inutilement de représenter dans cette hypothèse les observations de Ticho-Braé sur la planète Mars, reconnut enfin qu'elle se meut dans une ellipse dont le centre du Soleil occupe un des foyers; et que son rayon vecteur trace autour de ce point, des aires proportionnelles au temps. Il étendit ces résultats, à la Terre et aux autres planètes; et il découvrit que toutes leurs ellipses sont liées entre elles par ce beau rapport, savoir que les cubes des grands axes sont proportionnels aux carrés des temps des révolutions.

Quoique Képler donne dans la préface de son ouvrage de stella Martis, des idées justes sur l'attraction réciproque de la Lune et de la Terre, et sur la tendance des eaux de la mer vers la Lune, et qu'il reconnaisse dans ce même Ouvrage, que les inégalités elliptiques du mouvement des planètes sont dues à l'action du Soleil; il attribue cependant à une autre cause, la périodicité des mouvemens planétaires. Il suppose que le Soleil, par sa rotation, envoie à chaque instant, dans le plan de son équateur, des espèces immatérielles douées d'une activité décroissante en raison des distances, et qui en s'étendant, conservent le mouvement circulaire qu'elles avaient à la surface de cet astre, et donnent aux planètes qu'elles entraînent, leur mouvement de révolution. Pai montré ailleurs comment la rotation du Soleil a pu imprimer à chaque planète, son mouvement initial. Mais pour le rendre presque circulaire, il est nécessaire de le combiner avec une tendance de la planète vers le Soleil. Borelli a eu le premier, l'heureuse idée de cette combinaison qu'il a étendue aux satellites relativement à leur planète. Newton, Halley, Wren et Hook, en comparant cette idée aux théorèmes d'Huygens sur la force centrifuge, et au rapport trouvé par Képler entre les carrés des temps des révolutions des planètes et les cubes des grands axes de leurs orbites, trouvèrent qu'en supposant ces orbites circulaires, les tendances des planètes vers le Soleil étaient réciproques aux carrés de leurs distances à cet astre. En effet, la vitesse d'une planète étant alors la circonférence de son orbite, divisée par le temps de sa révolution; le carré de cette vitesse est proportionnel au carré du rayon de l'orbite divisé par le carré de ce temps qui, d'après la loi de Képler, est proportionnel à la puissance 3 du rayon; le de la vitesse mitiale, qui font décrire au mobile, un cercle

carré de la vitesse est donc réciproque au rayon. Par les théorèmes d'Huygens, la force centrifuge d'un corps mu dans un cercle, est égale au carré de sa vitesse divisé par le rayon; elle est donc pour une planète, réciproque au carré de sa distance au Soleil; or cette force doit être balancée à chaque instant par la tendance de la planète vers le Soleil, pour que l'orbite se maintienne circulaire; cette tendance est donc réciproque au carré de la distance.

Mais les planètes ne se meuvent point exactement dans des orbes circulaires. On pouvait d'ailleurs douter qu'une planète transportée sur l'orbite d'une autre planète, éprouverait la même tendance qu'elle, vers le Soleil. Il était donc nécessaire de démontrer que la même planète, dans ses diverses distances au Soleil, tend vers lui réciproquement à leurs carrés, et que la tendance vers cet astre, ne varie d'une planète à l'autre, qu'à raison de la distance. Cette démonstration, alors très difficile, fut vainement tentée par les trois géomètres qui, conjointement avec Newton, avaient déduit des théorèmes d'Huygens, la tendance des planètes vers le Soleil, réciproque au carré de leur distance : elle commença la Mécanique céleste. Newton prouva d'abord que la loi des aires décrites par le rayon vecteur d'une planète, indique nécessairement une tendance de la planète vers le centre du Soleil. Il fit voir ensuite par une application délicate de sa Méthode des Fluxions, que l'ellipticité de l'orbite exige une tendance réciproque au carré du rayon vecteur. Enfin, il conclut de la loi du carré des temps des révolutions, proportionnel au cube des grands axes, que la tendance vers le Soleil ne varie d'une planète à l'autre, qu'à raison de la distance. Les trois lois de Képler furent ainsi ramenées au seul principe d'une tendance des planètes vers le Soleil, réciproque au carré de leurs distances au centre de cet astre. Ce principe avait déjà été énoncé par Bouillaud : son analogie avec l'émission de la lumière, pouvait le faire soupconner. Il paraît être la loi de toutes les forces qui sont perceptibles à des distances sensibles, telles que le magnétisme et l'électricité. Mais l'honneur d'une découverte appartient à celui qui, le premier, l'établit solidement par le calcul ou par des observations décisives; et c'est ce que Newton a fait incontestablement à l'égard de la pesanteur universelle.

Ce grand géomètre détermina les conditions de direction et de quantité de la vitesse initiale, qui font décrire au mobile, un cercle, une ellipse, une parabole ou une hyperbole. Quelles que soient ces conditions, il assigna une section conique dans laquelle le mobile peut et doit conséquemment se mouvoir; car, avec les mêmes conditions, il ne peut décrire qu'une seule courbe; ce qui répond au reproche que lui fit Jean Bernoulliet de n'avoir point démontré que les sections coniques sont les seules courbes qu'un corps peut décrire en vertu d'une loi d'attraction réciproque au carré de la distance. Newton remarqua que l'on peut, par sa méthode, déterminer la nouvelle section conique que le mobile décrirait, si à un instant quelconque, on lui imprimait une nouvelle force; et il en conclut que l'on pourrait suivre ainsi le mouvement du mobile dérangé continuellement par des actions étrangères. Lagrange en a déduit dans les Mémoires de l'Académie de Berlin pour l'année 1786, les variations différentielles des élémens du mouvement elliptique; mais Newton n'ayant point fait cette application délicate, on doit considérer sa remarque, comme une des choses de son admirable Ouvrage, qui ont été le germe des belles théories de ses successeurs.

Newton a étendu sa méthode, au cas général d'un point sollicité par une force centrale, variable suivant une fonction quelconque de la distance. Il donne l'expression du carré de la vitesse du point, et il en conclut, au moyen des quadratures des courbes, la nature de la courbe décrite et le temps employé par le mobile à décrire ses diverses parties. Il parvient à ce résultat singulier, savoir qu'un point qui décrit une courbe en vertu d'une force centrale, pourra décrire de la même manière, cette courbe supposée mobile; si l'on augmente la force centrale, d'une quantité réciproque au cube du rayon vecteur. Alors, les vitesses angulaires du point et de la courbe sont en raison constante. Newton déduit de ce théorème, un procédé fort ingénieux pour avoir le mouvement des apsides, dans une orbite presque circulaire décrite en vertu d'une force centrale exprimée par une fonction quelconque de la distance. Ce procédé réduit en formule générale, donne l'angle décrit par le mobile, en allant d'un apside au suivant, égal à la demi-circonférence multipliée par la racine carrée d'une fraction dont le numérateur est le produit de l'expression de la force centrale ; par le carré du rayon vecteur, et dont le dénominateur est le coefficient de la différentielle du rayon vecteure, dans la différentiation du produit de l'expression de la force centrale par le cube de ce rayon; cette fraction étant rapportée après les différentiations, sà la moyenne distance du mobile, à l'origine de la force centrale se ont sagistes li apoit become

Newton applique son procédé, au cas où la force centrale étant réciproque au carré de la distance, une action étrangère la diminue d'une quantité proportionnelle au rayon vecteur. En supposant cette quantité de la force centrale dans les moyennes distances, ce qui a lieu à fort peu près, relativement à l'action du Soleil sur la Lune, décomposée suivant le rayon vecteur lunaire; il trouve le mouvement de l'apogée, plus petit de moitié que celui de l'apogée de la Lune. C'est ce qu'une première approximation donna ensuite aux géomètres qui appliquèrent, les premiers, l'analyse à la théorie de la Lune. Mais il est remarquable que Newton, dans la proposition IV du troisième Livre des Principes, cherchant à corriger la tendance de la Lune vers la Terre, de l'effet de l'action solaire, suppose cet effet égal à  $\frac{2}{357}$  de la pesanteur de ce satellite, c'est-à-dire, tel qu'il résulte du mouvement observé de l'apogée lunaire.

Newton transporta facilement ses résultats, au mouvement de deux points matériels A et B qui s'attirent en raison de leurs masses et suivant une fonction quelconque de leur distance mutuelle. Il avait établi que le mouvement du centre de gravité d'un système de corps ne reçoit aucun changement par leur action réciproque; en imprimant donc à ces points une vitesse égale et contraire à la vitesse initiale de leur centre commun de gravité, ce qui ne change point leur mouvement relatif; ce centre devient immobile. Le point A est attiré vers lui, par l'attraction du point B. En substituant ainsi dans l'expression de l'attraction de ce dernier point, au lieu de la distance mutuelle des deux points, le rayon vecteur mené du centre de gravité, au point A, et multiplié par le rapport de la somme des masses A et B à la masse B; le mouvement de A autour du centre de gravité, sera ramené au cas d'un point attiré suivant une fonction du rayon vecteur, vers un centre de forces immobile.

Par la nature du centre de gravité, les deux points A et B sont toujours avec lui, sur une même droite; et leurs distances à ce centre sont en raison constante soit entre elles, soit avec leur distance mutuelle. De là il suit que ces points décrivent dans le même temps, des courbes semblables, autour de leur centre de gravité et l'un autour de l'autre supposé immobile. Le cas de deux points matériels est celui de deux sphères dont les molécules s'attirent en raison des masses et réciproquement au carré des distances; Newton ayant démontré qu'alors ces corps s'attirent, comme si leurs masses étaient réunies à leurs centres respectifs. Cette propriété très remarquable de la loi de la nature, contribue à la simplicité des mouvemens célestes; parce que le Soleil, les planètes et les satellites étant à très peu près sphériques; leurs mouvemens ne sont que très peu troublés par leurs figures.

Le système de tous ces corps est constitué de manière que la masse du Soleil surpasse considérablement celles des planètes; en sorte que l'on peut, dans une première approximation, négliger, avec Newton, leur action les unes sur les autres et sur le Soleil. Alors elles obéissent exactement aux lois de Képler. Le système d'une planète et de ses satellites est pareillement constitué de manière que la masse de la planète surpasse considérablement celles de ses satellites. En négligeant donc dans une première approximation, leur action les uns sur les autres et sur la planète, ils décriraient autour d'elle, des orbes rigoureusement elliptiques, sans la force perturbatrice du Soleil. Heureusement, la distance de la planète au Soleil étant considérablement plus grande que celle des satellites à la planète, cette force est très petite. Si cette distance était infinie, le Soleil agissant également sur la planète et sur ses satellites, ne troublerait point leur mouvement relatif; la différence de ses actions sur ces différens corps, est donc très affaiblie par sa grande distance à la planète, et elle altère peu ce mouvement. Newton établit que le centre de gravité du système de la planète et de ses satellites décrit à très peu près, un orbe elliptique autour du Soleil, et il fait voir que la pesanteur du satellite vers la planète, n'est que très peu changée par l'action solaire : elle n'est diminuée que d'un 360<sup>me</sup> au plus pour la Lune. En négligeant donc cette action et l'action mutuelle des satellites, chacun d'eux peut être censé décrire un orbe Pour venner ce beau resultat, il fallalt l'assender se du rour de sa planete! l'allalt l'allalt l'assender ce beau resultat, il fallalt l'assender ce beau resultat l'asse

Newton conclut de ce résultat, les rapports des masses des planètes accompagnées de satellites, à la masse du Soleil. Si l'on augmente la distance moyenne du satellite à sa planète, en sorte qu'elle soit égale à la moyenne distance de la planète au Soleil; le carré du

temps de la révolution de ce satellite autour de sa planète sera , par la loi de Képler, augmenté dans le rapport du cube de la seconde de ces distances au cube de la première. Mais il résulte des théorèmes de Huygens sur la force centrifuge, que les masses de la planète et du Soleil sont réciproques aux carrés des temps des révolutions des corps qui circulent autour de chacun d'eux à la même distance. De là, il est facile de conclure que le rapport de la masse de la planète à celle du Soleil, est égal à une fraction dont le numérateur est le produit du cube de la movenne distance du satellite à sa planète, par le carré du temps de la révolution de la planète, et dont le dénominateur est le produit du cube de la moyenne distance de la planète au Soleil par le carré du temps de la révolution du satellite. Newton détermina de cette manière, les rapports des masses de Jupiter, de Saturne et de la Terre à la masse du Soleil. La masse étant égale à la densité multipliée par le volume, les densités de ces quatre corps sont comme leurs masses divisées par les cubes de leurs diamètres apparens vus de la même distance, et les pesanteurs à leurs surfaces sont comme leurs masses divisées par les carrés de ces diamètres. Newton a conclu ainsi ces densités et ces pesanteurs respectives, des mesures astronomiques de ces diamètres, drutten parot el surs somptigille mamesure

L'une des plus heureuses applications du principe de la pesanteur universelle, est celle que Newton en fit aux comètes. Ces astres se montrent dans toutes les régions du ciel : ils se meuvent dans tous les sens et d'une manière très compliquée, et finissent après quelque temps, par disparaître. On avait essayé vainement avant Newton, de déterminer la loi de leurs mouvemens. Ce grand géomètre considéra que les comètes devaient être soumises, comme les planètes et les satellites, à l'attraction du Soleil; et qu'elles décrivaient par conséquent autour de lui, des orbes elliptiques, avec la différence que n'étant visibles pour nous que dans la partie de leurs orbes, la plus voisine du Soleil; ces orbes, au lieu d'être presque circulaires, étaient fort alongés et pouvaient même être des paraboles ou des hyperboles. Pour vérifier ce beau résultat, il fallait le comparer aux observations; mais cette comparaison offrait des difficultés. A la vérité, le grand alongement des ellipses décrites par les comètes permet, du moins dans une première approximation, de considérer la partie visible de ces ellipses, comme un arc de parabole; ce qui simplifie le problème

il reste cependant encore très difficile. Newton le résolut par une méthode dans laquelle le génie inventeur ne brille pas moins que dans les autres parties de l'ouvrage des Principes. Ce grand géomètre appliqua sa méthode à la fameuse comète de 1680, qui parut pendant un intervalle de temps considérable, et qui reparaissant après avoir été perdue dans les rayons du Soleil, fut regardée par divers astronomes comme formant deux comètes distinctes. Newton fit voir qu'elles étaient identiques, et il représenta toutes les bonnes observations de la comète, avec une précision qui ne laissait aucun doute sur la vérité de sa théorie du mouvement de ces astres. Dans la troisième édition de son ouvrage, Newton n'ajouta rien à sa méthode. Seulement, il en présenta de nouvelles applications faites principalement par Halley qui soumit à cette théorie, les observations de vingt-quatre comètes parmi lesquelles il reconnut l'identité des comètes de 1531, 1607 et 1682. Il en conclut que cet astre décrit un orbe elliptique dans une période d'environ 75 ans, et qu'il devait reparaître à la fin de 1758 ou au commencement de 1750; ce que l'observation a confirmé. La même théorie a représenté exactement les observations de toutes les comètes qui ont paru depuis Newton; en sorte que chaque apparition de ces astres a fourni une nouvelle preuve de cette admirable théorie et du principe de la pesanteur universelle qui en est la base.

Plusieurs grands géomètres se sont occupés depuis Newton, du problème de la détermination des orbites des comètes par les observations. Ils sont parvenus sur cet objet, à des résultats intéressans parmi lesquels on doit distinguer l'expression élégante et simple que Lambert a donnée, du temps employé à décrire un arc parabolique, en fonction de cet arc et de la somme des rayons vecteurs extrêmes; expression qu'il a étendue aux arcs elliptiques, et qui est démontrée

dans le n° 27 du second Livre.

Les diverses solutions de ce problème employaient à la recherche des premières valeurs des élémens, trois observations assez rapprochées pour que l'on pût se permettre de négliger la troisième puissance de l'intervalle de temps qui sépare les deux observations extrêmes. Il me parut qu'au lieu de faire porter l'approximation sur les valeurs analytiques, il serait à la fois plus exact et plus simple d'employer une analyse rigoureuse, et de ne faire porter l'approximation que sur les données des observations. C'est ce que j'ai fait par la méthode exposée dans les

nº 31 et suivans du second Livre. Les données dont je me sers, sont la longitude et la latitude de la comète à l'époque de l'observation moyenne, et leurs différences premières et secondes, divisées par les puissances correspondantes de l'élément du temps. Au moyen de ces données, je détermine rigoureusement par la seule considération des équations différentielles du mouvement de l'astre, sa distance périhélie et l'instant de son passage par le périhélie. Cette méthode a l'avantage de pouvoir employer pour déterminer les données, toutes les observations faites dans l'intervalle des observations extrêmes; car si cet intervalle est peu considérable, on peut étendre sans erreur sensible, les mêmes données à ces observations, et former ainsi pour les obtenir, deux fois autant d'équations de condition qu'il y a d'observations. Je corrige ensuite par trois observations éloignées entre elles, la distance périhélie et l'instant du passage, directement et sans avoir besoin de connaître les autres élémens de l'orbite. Persuadé que l'analyse, lorsqu'elle est convenablement appliquée, peut toujours fournir aux astronomes les méthodes les plus faciles et les plus abrégées pour les calculs numériques; je me suis étudié à leur en offrir un exemple dans ce problème, l'un des plus difficiles de toute l'Astronomie. Les nombreuses applications qui ont été faites de cette méthode, prouvent de da presintamenta arebelaro en det di che presintamento en contione son utilité.

Newton n'a point considéré les perturbations que l'action des planètes sur le Soleil et sur elles-mêmes produit dans leur mouvement elliptique. Seulement, il fait voir qu'en considérant le mouvement autour du Soleil, de deux planètes qui s'attirent réciproquement au carré de la distance, et qui sont attirées suivant la même loi; le mouvement elliptique de la planète inférieure et la proportionnalité des aires que son rayon vecteur décrit autour du Soleil seront moins troublés, si cet astre obéit à l'attraction des planètes, que s'il est immobile. Il observe encore que l'action de Jupiter sur Saturne dans la conjonction de ces planètes, étant à l'action du Soleil sur Saturne, dans le rapport de l'unité à 211, elle ne doit point être négligée. « De la vient, dit-il, » que l'orbe de Saturne est dérangé si sensiblement dans chaque con-» jonction avec Jupiter, que les astronomes s'en aperçoivent; » cependant, la théorie analytique des mouvemens de ces deux planètes, qui représente exactement toutes les observations, nous montre que le dérangement de Saturne dans sa conjonction avec Jupiter, est presque insensible. Le dérangement correspondant de Jupiter est environ six fois plus grand, quoique l'action de Saturne sur Jupiter, ne soit à la pesanteur de Jupiter sur le Soleil, que dans le rapport de l'unité à 500. Cette remarque déjà faite par Euler, fait voir qu'il ne faut adopter qu'avec une extrême réserve, les aperçus les plus vraisemblables, tant qu'ils ne sont point vérifiés par des preuves décisives.

Depuis la publication de l'ouvrage des Principes, jusqu'aux premiers travaux d'Euler sur les perturbations des planètes, les géomètres n'ont rien ajouté de remarquable aux grandes découvertes consignées dans cet Ouvrage. Ils ont traduit en analyse, les démonstrations de Newton qui, probablement, était parvenu par cette méthode, à ses résultats que sa grande prédilection pour la synthèse lui a fait démontrer synthétiquement. Cependant les applications de l'analyse aux découvertes Newtoniennes, ont préparé celles qu'Euler et ses contemporains en ont faites à la théorie des perturbations des mouvemens célestes. Les recherches sur le Calcul intégral et sur la Mécanique, dont les géomètres s'étaient fort occupés dans l'intervalle dont je viens de parler, ont surtout contribué aux progrès de cette théorie qui leur offrait les applications les plus importantes de l'analyse infinitésimale, sans laquelle il eût été impossible de résondre les questions difficiles du système du monde. C'est principalement dans la considération des équations différentielles et dans leur intégration, que réside la puissance de cette analyse. Newton ne paraît pas s'être occupé de leur calcul si fécond en résultats, surtout depuis son extension aux équations à différences partielles. C'est à Leibnitz et aux Bernoulli qu'il doit ses premiers progrès. Ces illustres géomètres n'adoptèrent point la découverte de la gravitation universelle, à sa naissance; mais leurs recherches perfectionnées et appliquées par leurs disciples, à cette découverte, l'ont élevée au plus haut point de perfection et de certitude.

Si l'on conçoit un système de corps sphériques dont toutes les molécules s'attirent proportionnellement à leurs masses, et réciproquement au carré de la distance; on peut rapporter chacun de ces corps, à trois axes fixes perpendiculaires entre eux, et décomposer parallèlement à ces axes, les attractions qu'il éprouve de la part des autres corps. En égalant énsuite les différences secondes des coordonnées, divisées par le carré de l'élément du temps, supposé constant, à ces attractions ainsi décomposées; on aura les trois équations différentielles du second ordre,

MECAN CEL. Tome F.

qui déterminent le mouvement du corps. Chaque corps du système fournit trois équations semblables, en sorte que le nombre de ces équations est triple de celui des corps. Leurs intégrales complètes renferment donc six fois autant d'arbitraires, qu'il y a de corps. Ces constantes sont déterminées par les coordonnées initiales de chaque corps, et par ses vitesses initiales suivant ces coordonnées.

On a presque toujours besoin de rapporter les corps du système, à un corps principal. Il suffit pour cela, de retrancher les équations différentielles de son mouvement suivant chaque coordonnée, des équations différentielles correspondantes du mouvement des autres corps dont on aura ainsi les équations différentielles relatives à leurs mouvemens autour du corps principal.

On n'a pu obtenir jusqu'ici, que sept intégrales des équations différentielles du mouvement du système. Les trois premières sont finies et ne sont qu'une traduction du beau théorème de Newton, sur le mouvement du centre de gravité d'un système de corps qui n'éprouvent point d'actions étrangères. Les quatre autres intégrales données par les principes des aires et des forces vives, sont différentielles du premier ordre : elles sont une généralisation de la loi des aires proportionnelles aux temps, et de l'expression du carré de la vitesse, que Newton a trouvées dans le mouvement du système de deux corps. Le problème de ce mouvement est ainsi ramené à l'intégration d'équations différentielles du premier ordre, qu'il est facile ensuite d'intégrer par les quadratures. C'est ce que Newton a développé avec une grande élégance, sous une forme synthétique. Mais, dans le cas d'un plus grand nombre de corps, le problème présente d'extrêmes difficultés. Heureusement la constitution du système solaire apporte des simplifications considérables qui permettent de résoudre ce problème par des approximations convergentes.

Les planètes, comme nous l'avons déjà dit, se meuvent autour du Soleil, dans des orbes peu excentriques et peu inclinés à l'écliptique. De plus, leurs masses sont fort petites relativement à la masse de cet astre. En négligeant donc leur action sur le Soleil et sur elles-mêmes, on a par une première approximation, le mouvement elliptique dont Newton a développé les lois. Si l'on considère ensuite cette action, en négligeant les carrés et les produits des masses planétaires; on a une seconde approximation qui peut être ordonnée suivant les puissances

et les produits des excentricités et des inclinaisons des orbites. En considérant de la même manière, les carrés et les produits des masses des planètes; on obtient une troisième approximation, et ainsi de suite. Le mouvement des satellites autour de leur planète, offre des simplifications semblables. L'action perturbatrice du Soleil est toujours peu considérable par rapport à l'action directe de la planète sur ces corps, quoique l'action du Soleil sur eux soit fort grande. Mais leur distance à la planète étant très petite relativement à la distance de la planète au Soleil, cet astre attire à peu près de la même manière, la planète et ses satellites; en sorte que la force perturbatrice de leurs mouvemens relatifs, qui n'est que la différence de ces diverses attractions du Soleil, est fort petite par rapport à l'attraction de la planète sur ses satellites. Malgré toutes ces simplifications, les divers problèmes de la théorie des perturbations des planètes et des satellites, présentent de grandes difficultés dont la solution exige des considérations délicates et minutieuses, soit pour choisir les coordonnées qui doivent donner dans les divers cas, les approximations les plus convergentes; soit pour démêler dans le nombre infini des inégalités, celles qui, quoique très petites dans les équations différentielles, acquièrent par les intégrations, de grandes valeurs, et donnent ainsi la cause et les lois des singularités observées par les astronomes, dans les mouvemens célestes.

C'est à la première pièce d'Euler, sur les mouvemens de Jupiter et de Saturne, qu'il faut rapporter les premières recherches sur les perturbations des mouvemens planétaires. Cette pièce couronnée par l'Académie des Sciences en 1748, fut remise au secrétariat de cette Académie, le 27 juillet 1747, quelques mois avant que Clairaut et d'Alembert communiquassent à l'Académie les recherches analogues qu'ils avaient faites sur le problème des trois corps, qu'ils nommèrent ainsi parce qu'ils avaient appliqué leurs solutions au mouvement de la Lune attirée par le Soleil et par la Terre. Mais les différences de leurs méthodes à celles d'Euler, prouvent qu'ils n'avaient rien emprunté de sa pièce. Elle fut imprimée en 1749, année où parut l'ouvrage de d'Alembert sur la précession des équinoxes, et qui par là, est remarquable dans l'histoire de la Mécanique céleste.

Euler, ainsi que les géomètres qui se sont occupés les premiers de la théorie des perturbations, a choisi pour coordonnées, celles que les astronomes employaient alors dans les Tables astronomiques, savoir la longitude de la planète comptée d'une droite invariable prise sur un plan fixe, son rayon vecteur, l'inclinaison de l'orbite au même plan, et la longitude de son nœud ascendant. Mayer a le premier introduit directement dans les Tables, la latitude, au lieu de ces deux dernières coordonnées; ce qui est plus commode pour le calcul des perturbations, et pour les calculs astronomiques. Euler donne entre les quatre coordonnées dont il fait usage et le temps dont il suppose l'élément constant, quatre équations différentielles : les deux premières relatives à la longitude de la planète et à son rayon vecteur projeté sur le plan fixe, sont différentielles du second ordre. Les deux autres équations sont relatives à l'inclinaison de l'orbite et à la longitude de son nœud : elles sont différentielles du premier ordre. Euler ne donne point dans sa pièce, l'analyse qui l'a conduit à ces équations. La commission nommée par l'Académie pour juger cette pièce, et dont Clairaut et d'Alembert étaient membres, persuadée que la formation d'équations différentielles propres aux approximations et aux usages astronomiques, était l'un des points les plus intéressans de la théorie des perturbations, témoigna ses regrets de ce que l'auteur se fût contenté de présenter ces équations sans les démontrer. L'analyse par laquelle il y est parvenu, est exposée dans deux de ses Mémoires dont le premier parut en 1740, dans les Mémoires de l'Académie de Berlin pour la même année: le second parut en 1750 dans le volume des Mémoires de l'Académie de Pétersbourg, pour les années 1747 et 1748. On y voit que le procédé d'Euler, consiste à transformer les équations différentielles du second ordre, relatives aux coordonnées parallèles à trois axes fixes perpendiculaires entre eux, en quatre autres qui se rapportent aux coordonnées précédentes; et à combiner ces équations différentielles ainsi transformées, de manière à obtenir les équations différentielles qu'il a présentées dans sa pièce. Le premier des deux Mémoires cités, est surtout remarquable en ce que ce grand géomètre y parvient aux équations différentielles du premier ordre, de l'inclinaison et de la longitude du nœud, en faisant varier les constantes arbitraires qui expriment ces deux élémens dans l'orbite invariable : c'est le premier essai de la méthode de la variation des constantes arbitraires.

Euler considère d'abord les perturbations indépendantes des excentricités et des inclinaisons. Pour cela, il développe les forces perturbatrices, en sinus et cosinus d'angles croissans comme le temps. Mais ce développement sans lequel la formation des Tables astronomiques des 1747

planètes devenait impossible, présentait une difficulté que ce grand géomètre a très heureusement surmontée. Elle consiste à développer les puissances du radical qui exprime la distance mutuelle des deux planètes, dans une série d'angles multiples de leur élongation. Euler donne des expressions élégantes des divers termes de ce développement, et de plus, une relation très simple entre trois termes consécutifs, au moyen de laquelle on peut facilement conclure des deux premiers termes, tous les suivans. Il fait la remarque importante, que cette série, quoique peu convergente pour Jupiter et Saturne, le devient beaucoup par les diviseurs que ses divers termes acquièrent en vertu des intégrations.

Euler ne considère dans sa pièce, que les perturbations du mouvement de Saturne par l'action de Jupiter. Il suppose d'abord les deux orbites, dans un même plan, et il détermine les perturbations du rayon vecteur et de la longitude, en faisant abstraction des excentricités des orbites. Les résultats auxquels il parvient, sont peu différens de ceux que j'ai donnés dans le sixième Livre. Il considère ensuite les inégalités dépendantes des excentricités des orbites. Ici, de graves erreurs de calcul qui ne tiennent point à sa méthode, rendent ses résultats inexacts. Les deux seules inégalités de ce genre, qu'Euler détermine et qui sont en effet, les plus grandes de cet ordre, ont pour argument; la première, l'élongation de Saturne à Jupiter, moins l'anomalie de Saturne; la seconde, le double de cette élongation, moins l'anomalie de Jupiter. Il trouve à cette dernière inégalité, un signe contraire à son véritable signe. La comparaison des observations avec sa formule de la longitude de Saturne, lui fit voir qu'elles s'en écartent considérablement, mais qu'elles s'en rapprochent beaucoup, si l'on change le signe de cette inégalité. Soupconnant alors qu'il s'était trompé dans son calcul, il le revit, mais sans en reconnaître l'erreur; et il en conclut que la loi newtonienne de l'attraction réciproque au carré des distances, devait être modifiée. Dans le même temps, Clairaut tira la même conclusion, en appliquant l'analyse différentielle au mouvement de l'apogée lunaire. Mais cet illustre géomètre ayant porté plus loin les approximations, reconnut bientôt que la loi newtonienne donne le véritable mouvement de cet apogée. Des lors tous les géomètres et Euler lui-même admirent cette loi sans aucune restriction, quoique plusieurs phénomènes astronomiques, tels que les grandes irrégularités de Jupiter et de Saturne, et l'accélération du moyen mouvement de la Lune, leur parussent inexplicables en vertu de cette loi : plutôt que de la modifier, ils préférèrent de recourir à des causes étrangères.

Euler détermine le mouvement de l'aphélie de Saturne; mais sa formule est inexacte. En considérant les inégalités dépendantes de l'excentricité de l'orbite de Jupiter, l'intégration des équations différentielles lui donna une inégalité en longitude, dont le coefficient croît proportionnellement an temps, et dont l'argument est la distance de Saturne à l'aphélie de Jupiter. L'apparition de cet arc de cercle l'embarrassa; mais dans un supplément à sa pièce, il reconnut que cette inégalité atteignant son maximum, dans le même temps à peu près, que l'équation du centre de Saturne; elle pouvait être représentée par une diminution séculaire de l'excentricité de l'orbite de cette planète. On verra bientôt par quel moyen ce grand analyste a fait disparaître cet arc.

Enfin, Euler détermine les variations du nœud et de l'inclinaison de l'orbite de Saturne, sur l'orbite de Jupiter supposée fixe. Il fait voir que l'inclinaison moyenne reste constante, mais que le nœud rétrograde sans cesse, et il donne l'expression exacte de ce mouvement rétrograde. En transportant ses formules au mouvement de l'orbite terrestre produit par l'action de Jupiter, il en conclut la variation correspondante de la latitude des étoiles; et il en forme une Table dont l'argument est la longitude de l'étoile. Ce grand géomètre n'ayant point eu égard à l'action de Vénus dont l'influence sur ce phénomène est plus grande que celle de Jupiter, sa table est incomplète; mais elle est la première de ce genre.

Cette pièce d'Euler étant le premier pas que l'on a fait dans la théorie des perturbations planétaires, j'ai cru devoir en donner une analyse étendue. L'auteur y a tracé la route la plus directe et la plus simple pour arriver aux divers résultats de cette théorie. Il a surmonté par son génie et par son profond savoir en analyse, des obstacles qui dès les premiers pas, auraient arrêté la plupart des géomètres. Enfin, il a donné les formules des inégalités périodiques et séculaires du monvement des planètes, dont plusieurs sont fautives; mais qu'il serait facile de rectifier en suivant ses méthodes analytiques.

L'Académie, en couronnant la pièce dont je viens de parler, et voulant donner à la théorie dont elle est l'objet, une plus grande perfection; proposa cette théorie pour le sujet du prix de Mathématiques qu'elle devait décerner en 1750. Aucune pièce digne du prix ne lui

étant parvenue, elle remit le même sujet pour le prix de l'année 1752, qui fut adjugé à une seconde pièce d'Euler. Ce grand géomètre part des équations différentielles de sa première pièce, mais il les transforme en d'autres dans lesquelles l'élément de l'élongation de Saturne à Jupiter est supposé constant. Il considère simultanément les mouvemens des deux planètes, et il détermine leurs inégalités indépendantes des excentricités. Passant ensuite aux inégalités dépendantes des excentricités, il cherche à obtenir des intégrales sans arcs de cercle, et pour cela, il emploie un moyen très ingénieux et, peut-être, le plus direct et le plus simple que l'on puisse imaginer. On sait que si l'on néglige le carré de l'excentricité, la partie elliptique du rayon vecteur d'une planète, se réduit au produit pris négativement de l'excentricité par le cosinus de la distance de la planète à son aphélie. Euler conçoit dans le rayon vecteur de Jupiter, deux termes semblables rapportés à deux aphélies différens; ce qui revient à supposer une double excentricité à l'orbite. La partie elliptique du mouvement de la planète en longitude est alors formée, comme dans le mouvement elliptique simple, des termes elliptiques du rayon wecteur, dans lesquels on change les cosinus en sinus, en leur donnant pour coefficiens, le double de ceux des cosinus, pris avec un signe contraire. Euler suppose les parties elliptiques du rayon vecteur et de la longitude de Saturne, formées de termes semblables rapportés à ces deux aphélies. En substituant dans l'équation différentielle du rayon vecteur de Jupiter, les termes relatifs à l'un de ces aphélies; la comparaison des mêmes cosinus, lui donne une expression de mouvement de cet aphélie, qui contient le rapport de l'excentricité de l'orbite de Jupiter relative à cet aphélie, à l'excentricité correspondante de l'orbite de Saturne. La même substitution dans l'équation différentielle du rayon vecteur de Saturne, lui donne une seconde expression du mouvement de cet aphélie, pareillement dépendante du rapport des excentricités. De la comparaison de ces deux expressions, il obtient pour déterminer ce rapport, une équation du second degré, dont il choisit une des racines qu'il substitue dans ces expressions pour avoir le mouvement de l'aphélie. En considérant de la même manière, les parties elliptiques relatives à l'autre aphélie; Euler parvient à une autre équation du second degré, qui détermine le rapport des deux excentricités des orbites, correspondantes à cet aphélie. Les racines de cette équation sont imaginaires; mais il les rend réelles et égales, par un léger chan-

WEEKAN CER. TOMAS

gement dans les valeurs des masses des planètes. On est étonné qu'un aussi profond analyste n'ait pas cherché ce que signifiait la racine qu'il négligeait, et ce qui devait faire préférer l'autre racine. Mais s'il eût bien fait son calcul, il aurait trouvé que les deux équations du second degré, qu'il obtenait, n'en forment qu'une dont les deux racines sont réelles et donnent les rapports des excentricités correspondantes dans les deux orbites. Euler, malgré l'inexactitude de ses résultats, fit par la considération d'une excentricité multiple des orbites, une découverte importante dont le développement a démontré la stabilité du Système du monde. Ce grand géomètre prouve que les excentricités et les positions des aphélies de Jupiter et de Saturne déterminées par les astronomes, varient sans cesse, mais inégalement dans les différens siècles, et qu'elles se rétablissent dans une période d'environ trente mille ans. Il en conclut dans la longitude des deux planètes, une grande inégalité séculaire, la même pour chaque planète, maintenant additive à leur longitude et qui se rétablit dans la période précédente. Les observations semblaient indiquer au contraire, une accélération dans le mouvement de Jupiter et un ralentissement dans celui de Saturne; mais les recherches ultérieures ont prouvé que cette inégalité introduite par Euler, n'existe pas. some ael am ancient e le la manier de la secucione

D'Alembert publia en 1754, les deux premiers volumes de ses recherches sur le Système du monde. Il y appliqua au mouvement des planètes troublé par leur action mutuelle, les formules par lesquelles il avait calculé les mouvemens de la Lune. Mais il n'a rien ajouté aux recherches d'Euler, si ce n'est la remarque de la relation qui existe entre les termes de la série dans laquelle Euler avait développé une puissance quelconque du radical qui exprime la distance mutuelle de deux planètes, et les termes de la série de ce développement, lorsqu'on diminue de l'unité cette puissance. On doit encore à ce grand géomètre, pour calculer les perturbations du mouvement d'une planète par l'action de ses satellites, perturbations qu'Euler n'avait point considérées, le moyen le plus simple fondé sur le mouvement à très peu près elliptique du centre commun de gravité de tous ces corps, autour du Soleil. D'Alembert avait fait disparaître par un moyen ingénieux, l'arc de cercle que sa méthode d'intégration introduisait dans l'expression du rayon vecteur de la Lune. Il pensa que le même moyen peut être appliqué au mouvement des planètes. Mais ce moyen ne réussit qu'autant que l'arc de cercle est introduit par le mouvement de l'apogée; ce qui a lieu pour la Lune. Si l'arc dépend de ce mouvement et d'une variation séculaire de l'excentricité, ce qui a lieu pour les planètes; le moyen proposé par d'Alembert ne réussit plus, et la question devient beaucoup plus difficile. On vient de voir par quel artifice Euler l'a résolue. D'Alembert membre des commissions nommées par l'Académie pour juger les pièces d'Euler, ne paraît pas avoir remarqué cet artifice; mais ce qui doit surprendre, c'est qu'Euler lui-même n'en ait pas senti l'importance, et qu'il n'ait pas cherché à l'étendre au Système entier des planètes.

En 1756, l'Académie des Sciences couronna une troisième pièce d'Euler sur les inégalités du mouvement des planètes, produites par leurs actions réciproques. La méthode que ce grand géomètre y expose, est très belle et fort importante dans la Mécanique céleste. Elle consiste à regarder les élémens du mouvement elliptique, comme variables en vertu des forces perturbatrices. Ces élémens sont, 1°. le grand axe de l'orbite, qui donne par la loi de Képler, le rapport de la différentielle de la longitude movenne, à l'élément du temps; 2°. l'époque de cette longitude; 3°. l'excentricité de l'orbite; 4°. le mouvement de l'aphélie; 5°. l'inclinaison de l'orbite à un plan fixe; 6°, la longitude de son nœud. Euler se propose de déterminer les variations que les forces perturbatrices introduisent dans ces élémens. Il l'avait déjà fait, comme on l'a vu ci-dessus, par rapport à l'inclinaison et à la longitude du nœud de l'orbite. Pour cela il considère qu'à la fin d'un instant infiniment petit, l'expression de la tangente de la latitude peut être censée appartenir également au plan de l'orbite de cet instant, et au plan de l'orbite de l'instant suivant. En différentiant l'expression de la latitude dans l'hypothèse des deux élémens constans; on a la différentielle relative à l'orbite invariable pendant un instant. En différentiant la même expression dans l'hypothèse où la longitude et les élémens varient; on a la différentielle relative à l'origine de l'instant suivant. En égalant ces deux différentielles, Euler obtient une équation entre les différentielles de l'inclinaison et de la longitude du nœud. Il différencie de nouveau la différentielle de la tangente de la latitude, obtenue dans la première hypothèse; ce qui lui donne entre les différentielles de ces élémens, une seconde équation dans laquelle il substitue, au lieu de la différence seconde de la tangente de la latitude, sa valeur donnée par les équations différentielles du mouvement de la planète, modernistrassinas establishent openinas inflienz

र्वादे

MECAN, CEL. Tome F.

La méthode suivie par Euler pour déterminer les variations des autres élémens du mouvement elliptique, n'est pas aussi directe que la précédente; mais au fond, elle revient au même. Le plan auquel ce grand géomètre rapporte d'abord les coordonnées, est celui de l'orbite de la planete dont il considere les perturbations. Il suppose ce plan fixe; ce que l'on peut faire dans le calcul du rayon vecteur et de la longitude, du moins si l'on néglige le carré de la force perturbatrice. Il détermine les expressions différentielles de ces deux coordonnées, différentielles que l'on déduit immédiatement du principe des aires et du principe des forces vives. Ensuite, il considere l'expression elliptique du rayon vecteur qui, comme l'on sait, est égal au paramètre divisé par l'unité diminuée du produit de l'excentricité, par le cosinus de l'anomalie rapportée à l'aphélie. Il différencie cette expression, en supposant les élémens constans; en comparant ensuite cette différentielle à celle du rayon vecteur, qu'il a trouvée en fonction des forces perturbatrices, il détermine le paramètre et l'excentricité, de manière à faire coïncider ces différentielles; ce qui lui donne les expressions de ces deux élémens. Euler en conclut la différentielle du quotient de l'unité divisée par le grand axe. Il est facile de s'assurer qu'elle est une différence exacte des coordonnées de la planète troublée, résultat important auquel Lagrange est parvenu d'une manière directe, et d'où il a conclu, comme nous le dirons bientôt, l'invariabilité des moyens mouvemens planétaires. La différentielle de l'expression elliptique ou du rayon vecteur, prise en y faisant varier les élémens et l'anomalie, donne la différentielle de l'anomalie, qui retranchée de la différentielle de la longitude, donne la différentielle du mouvement de l'aphélie. Euler ne considère point la variation de l'époque; ce qui rend incomplète, sa théorie de la variation des élémens elliptiques.

Dans l'évaluation des forces attractives, Euler rapporte le mouvement de la planète troublée, au plan de la planète perturbatrice; mais il observe que la projection de l'ellipse de la planète troublée, sur ce plan, est une ellipse dans laquelle le Soleil n'étant plus au foyer, les lois de Képler ne sont point observées autour de ce point, ce qui complique les calculs. Il juge donc avec raison, que dans le calcul des perturbations du rayon vecteur et de la longitude, il convient de rapporter le mouvement de la planète troublée, au plan de son orbite. Il y a de l'avantage à rapporter ce mouvement au plan de l'orbite de la planète perturbatrice, dans le calcul des variations de l'inclinaison de l'orbite et de ses nœuds; et sur cet objet, il parvient aux résultats de sa première pièce.

Plusieurs des formules de ce grand géomètre sont incomplètes; ainsi l'expression qu'il donne, du mouvement de l'aphélie, ne renferme point la partie de ce mouvement, dépendante du rapport de l'excentricité de l'orbite de la planète perturbatrice, à celle de l'orbite de la planète troublée. En général dans cette pièce, comme dans les deux précédentes, le mérite des méthodes fait regretter que leur auteur ait été souvent, par de nombreuses erreurs de calcul, conduit à des résultats fautifs qui l'ont, peut-être, empêché lui-même de reconnaître les avantages de ces méthodes sur lesquelles il n'est plus revenu.

Enfin Euler termine sa pièce, par une application étendue de ses formules au mouvement de la Terre. En partant de suppositions assez vraisemblables, sur le rapport des masses des planètes, à la masse du Soleil; il détermine la variation séculaire de l'obliquité de l'écliptique qu'il trouve de 48" sexagésimales, ce qui s'écarte fort peu des observations. Il a mis par là, hors de doute, la diminution séculaire de cette obliquité, que de savans astronomes regardaient alors comme incertaine.

C'est à fort peu près à ces trois pièces, que se réduisent les travaux d'Euler sur la théorie des perturbations du mouvement des planètes. On n'a rien ajouté à cette théorie, jusqu'aux recherches de Lagrange, publiées dans le tome III des Mélanges de la Société royale de Turin, qui parut en 1766. Lagrange y considère les objets traités par Euler dans sa seconde et dans sa troisième pièces; savoir, la variation des élémens du mouvement elliptique, et le moven d'intégrer les équations différentielles du mouvement des planètes, sans introduire d'arcs de cercle dans les intégrales. Lagrange ne paraît pas avoir connu ces pièces d'Euler, qui n'ont été publiées qu'en 1760. Pour obtenir les variations différentielles des élémens du mouvement elliptique, Lagrange étend au rayon vecteur, les mêmes considérations par lesquelles Euler dans les Mémoires de l'Académie de Berlin pour l'année 1750, avait déduit de l'expression de la latitude, les variations différentielles de l'inclinaison de l'orbite et du nœud. Il différencie l'expression elliptique du rayon vecteur; et il égale à zéro, la partie de cette différentielle, qui dépend des variations de l'excentricité et de la longitude de l'aphélie; ce qui lui donne une première équation entre les différentielles de ces élémens. La différentielle du rayon vecteur devient ainsi la même que dans l'ellipse invariable. Il la différencie de nouveau, et il obtient entre les variations des deux mêmes élémens, une seconde équation dans laquelle il substitue au lieu de la différence seconde du rayon vecteur, sa valeur donnée par les équations différentielles du mouvement de la planète. Mais ces équations sont inexactes, parce qu'elles ne renferment point la variation du grand axe, à laquelle Lagrange n'a point eu égard, non plus qu'à la variation de l'époque.

Le moyen par lequel Lagrange obtient les intégrales du mouvement des planètes, sans arcs de cercle, quoique beaucoup moins simple que celui d'Euler, est très ingénieux. Il consiste à égaler chaque terme des équations différencielles des mouvemens de Jupiter et de Saturne, à une nouvelle variable; à différencier ces variables et leurs valeurs; et à combiner les équations qui en résultent, avec les équations difrentielles des coordonnées des planètes, de manière à obtenir entre toutes ces variables, un système d'équations différentielles linéaires à coefficiens constans, qu'il intègre par un procédé fort simple. Il détermine ainsi les rayons vecteurs des deux planètes, et il est conduit par son analyse, aux deux excentricités qu'Euler avait imaginées pour chaque planète. Mais son calcul étant exact, il ne trouve qu'une seule équation du second degré, pour déterminer les rapports des excentricités des orbites des deux planètes, relatives au même aphélie. En appliquant cette méthode aux équations différentielles de la latitude. ce grand géomètre représente la latitude de chaque planète, au moyen de deux inclinaisons rapportées à deux nœuds différens; et il détermine par les racines d'une seule équation du second degré, les rapports des inclinaisons des orbites des deux planètes, relatives au même nœud. En développant ses formules en séries; il donne les expressions analytiques et numériques des variations séculaire, des excentricités, des aphélies, des inclinaisons et des nœuds des orbites de Jupiter et de Saturne, expressions dont j'ai reconnu l'exactitude. Il parvient enfin à deux équations séculaires proportionnelles au carré du temps, l'une additive à la longitude moyenne de Jupiter, l'autre plus grande et soustractive de la longitude moyenne de Saturne. Euler, comme nous l'avons dit, trouvait ces inégalités, les mêmes et toutes deux additives à la longitude. Mais le résultat de Lagrange, quoique plus conforme que celui d'Euler, à ce que les observations semblaient indiquer,

n'en est pas plus exact.

du moven mouvement. Cela suffissit a Je présentai en 1773, à l'Académie des Sciences, mes premières Recherches sur le Système du Monde. Elles ont paru dans le volume des Mémoires des Savans étrangers de la même année, qui n'a été publié qu'en 1776. Mon objet principal dans ces recherches a été de donner les expressions exactes des inégalités séculaires du mouvement des planètes. Frappe des différences qu'offraient à cet égard, les expressions trouvées par Euler et Lagrange, et considérant qu'ils avaient négligé plusieurs quantités du même ordre que celles dont ils avaient tenu compte; je déterminai ces expressions avec l'attention la plus scrupuleuse. Celle du moyen mouvement était surtout importante dans l'Astronomie : elle paraissait fort sensible dans le mouvement de Saturne. En substituant dans ma formule, les valeurs numériques des quantités relatives à l'action de Jupiter sur cette planète; je fus surpris de trouver un résultat nul, et j'en conclus que l'action de Jupiter n'altère point le mouvement moven de Saturne. Une substitution semblable relative à l'action de Saturne sur Jupiter, me donna pareillement un résultat nul. L'égalité à zéro de ces deux résultats, me fit soupconner qu'elle ne tenait point aux valeurs propres des élémens de ces deux planètes, et que l'expression analytique ellemême était identiquement nulle. Cette expression renferme un nombre considérable de termes multipliés par les coefficiens des angles multiples de l'élongation des deux planètes, dans le développement des puissances du radical qui exprime leur distance mutuelle. On a vu que ces cofficiens ont entre eux des rapports tels, que si le premier et le second coefficiens du développement de l'une de ces puissances sont donnés, on peut en conclure tous les autres. La formule analytique de l'inégalité séculaire du moyen mouvement pouvait être ainsi, réduite à ne renfermer que ces deux coefficiens. Je reconnus que par cette réduction, chacun de ces coefficiens disparaissait, et que la formule se réduisait à zéro. Il fut ainsi bien prouvé que l'action mutuelle des planètes ne produit aucune altération séculaire dans leurs moyens mouvemens, du moins en négligeant les carrés et les produits des masses des planètes, et les produits de quatre dimensions, des excentricités et des inclinaisons des orbites; car il est facile de s'assurer que les quantités de dimensions impaires de ces élémens ne peuvent entrer dans l'expression analytique de l'inégalité séculaire du moven mouvement. Cela suffisait aux besoins de l'Astronomie et montrait qu'il fallait chercher ailleurs que dans l'action mutuelle. des planetes, la cause des inégalités séculaires que les observations paraissaient indiquer dans les mouvemens de Jupiter et de Saturne.

En réduisant d'une manière semblable, les expressions analytiques des inégalités séculaires de l'excentricité et de l'aphélie; je leur donnai la forme la plus simple.

Je discutai dans le Mémoire qui contient ces recherches, le principe de la gravitation universelle, et la manière dont il avait été employé par Newton et par ses successeurs. La propagation instantanée qu'ils supposaient à cette force, me parut peu vraisemblable. Déjà Daniel Bernoulli avait soupçonné que le retard d'environ un jour et demi, des plus grandes marées sur les instans des syzygies, pouvait dépendre du temps que l'attraction de la Lune emploie à se transmettre à la mer. Une transmission aussi lente n'est pas sans doute, admissible; mais cette transmission, quoique incomparablement plus prompte, peut cependant être successive, et il était intéressant d'en calculer les effets. Je trouvai que son effet le plus sensible serait une inégalité séculaire dans le moyen mouvement de la Lune, croissante comme le carré du temps; et que pour expliquer par ce moyen, l'inégalité déduite des observations par Mayer, il fallait supposer à l'attraction terrestre, une vitesse de transmission, près de huit millions de fois plus grande que celle de la lumière. Maintenant que nous connaissons la vraie cause de l'équation séculaire de la Lune, nous pouvons affirmer que la première de ces vitesses est au moins cinquante millions de fois plus grande que la seconde.

Lagrange envoya en 1774, à l'Académie des Sciences, un beau Mémoire sur les variations des inclinaisons et des nœuds des orbites planétaires, Mémoire qui parut dans le volume de l'Académie, de la même année. Ce grand géomètre y détermine les mouvemens des orbites, par la méthode de la variation des élémens; mais au lieu de l'inclinaison et de la longitude du nœud, il considère deux autres variables qui sont les produits de l'inclinaison par le sinus et par le cosinus de la longitude du nœud, et il détermine leurs expressions différentielles. Cette transformation des variables, dont il a fait ensuite un heureux usage dans sa théorie de la libration de la Lune, a l'avantage de réduire les équations différentielles qui déterminent les inclinaisons et les nœuds d'un système d'orbites, à des équations différentielles linéaires à coefficiens constans, et dont le nombre est double de celui des planètes. Ayant ramené les variations séculaires de l'excentricité et de la longitude du périhélie, à leur forme la plus simple; il me devint facile de leur appliquer une fransformation analogue, en considérant au lieu de ces deux variables, les produits de l'excentricité par le sinus et par le cosinus de la longitude du périhélie. J'en conclus les variations séculaires de ces nouvelles variables. Je considérai ensuite ces variations, comme le développement en série, de ces variables, suivant les puissances du temps; or le coefficient de la première puissance du temps dans ce développement, est la différentielle de la variable, divisée par l'élément du temps ; j'égalai donc ce quotient, au coefficient du temps dans l'expression de l'inégalité séculaire de la variable; ce qui me donna une équation linéaire du premier ordre, entre les variables. L'autre variable me donna une équation pareille. En étendant la même considération à toutes les variables semblables d'un système quelconque de planètes; j'obtins pour les déterminer, un nombre d'équations différentielles linéaires du premier ordre, double de celui des planètes; et je fis ainsi disparaître les arcs de cercle introduits par l'intégration des équations différentielles suivant la méthode ordinaire qui a l'avantage de conduire par la voie la plus simple, aux approximations les plus convergentes et les plus appropriées aux usages astronomiques. Je publiai dans la première partie des Mémoires de l'Académie des Sciences pour l'année 1772, et qui parut en 1776, ces résultats et cette nouvelle méthode de faire disparaître les arcs de cercle puisée dans la nature même des séries. La forme très simple des équations différentielles des élémens elliptiques auxquelles j'étais parvenu, me fit reconnaître un des élémens les plus importans du Système du Monde, sa stabilité. Ces équations étant linéaires à coefficiens constans; leur intégration donne l'expression finie de chacune des variables, par une suite de sinus et cosinus d'angles croissans proportionnellement au temps, et dont les coefficiens du temps dans chaque angle, sont les racines d'une équation algébrique d'un degré égal au nombre des planètes. Si toutes les racines sont réelles et inégales, ces diverses expressions sont périodiques, et le variables restent toujours fort petites; le système des planètes ne fait

MECAN CEL Torne F

donc alors qu'osciller autour d'un état moyen, dans d'étroites limites. Mais si quelques-unes des racines étaient imaginaires ou égales entre elles; les sinus et les cosinus correspondans se changeraient en exponentielles ou en arcs de cercle qui, croissant indéfiniment avec le temps, donneraient aux variables, de grandes valeurs; et changeraient considérablement la forme des orbites. Heureusement, je suis parvenu d'une manière fort simple exposée dans les Mémoires de l'Académie des Sciences pour l'année 1784, à faire voir que, quelles que soient les masses des planètes pourvu qu'elles soient fort petites par rapport à la masse du Soleil, par cela seul qu'elles se meuvent toutes dans le même sens autour de cet astre et dans des orbes presque circulaires et peu inclinés entre eux; l'équation algébrique dont je viens de parler, n'a que des racines réelles et inégales. En appliquant les mêmes raisonnemens aux équations différentielles relatives à l'inclinaison et à la longitude du nœud; j'ai trouvé pareillement que les racines de l'équation algébrique dont dépendent leurs intégrales sont réelles et inégales; et qu'ainsi les inclinaisons des orbites sont toujours fort petites. De là il suit que le système des planètes est stable. Comme les systèmes des satellites satisfont à la condition que tous les satellites de chaque système se meuvent dans le même sens, autour de leur planète; on peut affirmer, quoique leurs masses soient pour la plupart inconnues, que ces divers systèmes jouissent de la même stabilité, que celui des planètes.

Je développai dans la seconde partie des Mémoires de l'Académie des Sciences, pour l'année 1772, la méthode précédente de faire disparaître les arcs de cercle des intégrales, en faisant varier les élémens; et je l'étendis aux équations différentielles d'un ordre quelconque. Cette manière de faire varier les constantes arbitraires, diffère de celle qu'Euler avait employée, en ce qu'elle n'embrasse que les inégalités dont la période est indépendante de la configuration mutuelle des planètes; ce qui apporte une grande simplicité dans les calculs. Elle s'étend à tous les cas où les élémens d'un système de corps éprouvent par des causes quelconques, telles que la résistance d'un milieu rare, des altérations qui ne deviennent sensibles qu'après un long intervalle de temps.

Fontaine remarqua, le premier, qu'une équation différentielle d'un ordre quelconque, a autant d'intégrales de l'ordre inférieur, qu'il y a d'unités dans son ordre. Lagrange, dans sa pièce sur les perturbations des

comètes qui remporta en 1780, le prix de l'Académie des Sciences, et dans les Mémoires de Berlin pour l'année 1782, considéra sous ce point de vue général, les intégrales des équations différentielles du mouvement des planètes. Le mouvement d'une planète soumise à la seule attraction du Soleil, est donné par trois équations différentielles du second ordre dont les trois intégrales finies renferment par conséquent six constantes arbitraires qui sont les élémens du mouvement elliptique. En différenciant ces intégrales, on a six équations au moyen desquelles on peut par l'élimination, déterminer chaque élément en fonction des coordonnées du mouvement de la planète, et de leurs différentielles divisées par l'élément du temps. Lagrange conçoit que ces six équations différentielles du premier ordre, ont également lieu dans l'ellipse invariable et dans l'ellipse troublée; mais que dans ce dernier cas, les élémens sont variables. Pour avoir les différentielles des élémens, il fait tout varier en différenciant chacune de ces intégrales du premier ordre; et il substitue après la différentiation, au lieu de la différence seconde de chaque coordonnée, sa valeur donnée par les équations différentielles du mouvement de la planète troublée. Il obtient ainsi la différentielle de chaque élément. Ensuite il observe que dans la substitution de la valeur de la différence seconde de chaque coordonnée, on peut ne considérer que la partie de cette valeur, due aux forces perturbatrices; l'autre partie devant disparaître dans l'expression de la différentielle de l'élément, puisque cette expression serait identiquement nulle, si ces forces n'existaient pas. Lagrange, dans sa pièce sur l'équation séculaire de la Lune, qui remporta en 1774 le prix de l'Académie des Sciences, exprima les forces attractives décomposées suivant la direction des coordonnées, par les différences partielles d'une fonction prises par rapport à ces coordonnées. Si l'on rapporte le mouvement du point attiré, au centre de gravité du système de corps; cette fonction est la somme des molécules attirantes, divisées respectivement par leurs distances au point attiré. Si l'on rapporte le mouvement, au centre de l'un des corps du système, considéré comme immobile; il faut ajouter à cette somme, la demi-somme des produits de chaque molécule attirante, par le carré de sa distance au point attiré, diminué des carrés des distances de la molécule et du point au centre du corps supposé immobile, chacun de ces produits étant divisé par le cube de la distance de la molécule attirante à ce même centre. Je nommerai cette fonction, fonction

perturbatrice. La propriété dont elle jouit, d'exprimer par ses différences partielles, les forces perturbatrices du mouvement du point attiré, simplifie extrêmement les calculs, et donne à leurs résultats, une forme qui fait voir facilement leurs rapports, surtout quand on considère une infinité de molécules attirantes ou attirées, comme dans les théories de la figure des planètes, du flux et du reflux de la mer, et de la précession des équinoxes. Son introduction dans la Mécanique céleste est, à cause de son utilité, une véritable découverte.

Lagrange, en appliquant la méthode précédente de la variation des élémens elliptiques, à l'expression du quotient de l'unité divisée par le grand axe, reconnut que la différentielle de cette expression prise en moins est la différentielle exacte de la fonction perturbatrice, prise par rapport aux seules coordonnées de la planète troublée. Si l'on développe cette fonction dans une série de sinus et de cosinus d'angles croissans proportionnellement au temps, et si l'on néglige le carré des forces perturbatrices; on obtient cette différentielle, en ne faisant varier dans ces sinus et cosinus, que les angles qui se rapportent à la planète. Lagrange en conclut que l'expression du grand axe ne contient que des inégalités périodiques; et qu'ainsi la longitude moyenne que l'on en déduit par les lois de Képler, ne contient elle-même que des inégalités de ce genre, et ne renferme point d'inégalités séculaires. Ce théorème auquel j'étais parvenu en négligeant les produits de quatre dimensions des excentricités et des inclinaisons des orbites, fut ainsi, non-seulement confirmé par ce grand géomètre, de la manière la plus élégante et la plus simple, mais encore étendu à des excentricités et à des inclinaisons quelconques.

J'ai fait voir dans le sixième Livre, qu'en ayant égard aux carrés et aux produits des masses de Jupiter et de Saturne, leurs grandes inégalités n'altèrent point ce résultat. M. Poisson est ensuite parvenu par une savante analyse insérée dans le tome VIII du Journal de l'École Polytechnique, à démontrer généralement, que le carré de la force perturbatrice n'introduit que des quantités périodiques, dans l'expression de la longitude moyenne; résultat important dans l'Astronomie, parce qu'une inégalité séculaire dans l'expression différentielle du grand axe, quoique multipliée par le carré des masses planétaires, donnerait par la double intégration qu'elle subit dans l'expression de la longitude moyenne, une inégalité du même ordre que l'inégalité du mouvement

elliptique, dont l'argument est le double de l'anomalie. Ces recherches de M. Poisson et celles qu'il a publiées dans le même volume, sur la précession des équinoxes et sur l'uniformité de la rotation de la Terre, lui ont acquis de justes droits à la reconnaissance des géomètres et des astronomes.

Le résultat précédent cesse d'avoir lieu, si les moyens mouvemens ont entre eux des rapports commensurables. Ce cas très singulier se présente dans le système des satellites de Jupiter, et je l'ai discuté dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de 1784. La longitude moyenne du premier satellite moins trois fois celle du second, plus deux fois celle du troisième est égale à la demi-circonférence. L'approximation avec laquelle les Tables des satellites de Jupiter par Vargentin donnent ce rapport, me fit soupconner qu'il est rigoureux. Il était contre toute vraisemblance de supposer que le hasard a placé originairement les trois premiers satellites, aux distances et dans les positions convenables à ce rapport; et il était extrêmement probable qu'il est dù à une cause particulière. Je cherchai donc cette cause dans l'action mutuelle des satellites. L'examen approfondi de cette action, me fit voir qu'elle a suffi pour rendre ce rapport rigoureux, s'il a été fort approché à l'origine; d'où je conclus qu'en déterminant de nouveau par la discussion d'un très grand nombre d'observations éloignées entre elles, les longitudes moyennes des trois premiers satellites, on trouverait qu'ils approchent encore plus de ce rapport, que les Tables de Vargentin. Cette conséquence de la théorie a été confirmée avec une précision remarquable, par les recherches que Delambre a faites sur les satellites de Jupiter; et les Tables qu'il a publiées sont rigoureusement assujetties à ce rapport. La petite différence qui a pu exister primitivement à cet égard, a donné lieu à une inégalité d'une étendue arbitraire, qui se partage entre les trois satellites, et que j'ai désignée par le nom de libration des mouvemens de ces satellites. Les deux constantes arbitraires de cette inégalité, remplacent les deux arbitraires que ce rapport fait disparaître dans les moyens mouvemens et dans les époques des longitudes movennes; car le nombre des arbitraires que renferme la théorie du mouvement d'un système de corps, est nécessairement sextuple du nombre de ces corps. La discussion des observations n'ayant point fait reconnaître cette inégalité, elle est fort petite et même insensible.

Dans les Mémoires de l'Académie de Berlin pour les années 1781 et

suivantes, Lagrange détermina par la méthode de la variation des élémens elliptiques, les inégalités séculaires et périodiques du mouvement des planètes, et il les réduisit en nombres, en donnant aux masses planétaires, les valeurs qui lui parurent les plus vraisemblables. Cette méthode déjà fort longue quand on considère la première puissance des excentricités et des inclinaisons, devient presque impraticable, lorsqu'on veut l'étendre aux carrés et aux puissances supérieures de ces quantités; ce qui est indispensable dans la théorie des planètes. Mais elle peut être extrêmement simplifiée par les considérations suivantes.

On a vu que la différentielle de la puissance première inverse du grand axe prise en moins est égale à la différentielle de la fonction perturbatrice, prise en n'y faisant varier que les coordonnées de la planète troublée. En développant donc cette fonction dans une série de sinus et de cosinus d'angles croissans proportionnellement au temps, il suffira dans une première approximation où l'on néglige le carré de la force perturbatrice, de différencier chacun des termes de cette série, par rapport au seul mouvement de la planète. On aura ensuite par l'intégration de ces termes, l'expression de l'unité divisée par le grand axe : on en conclura par les lois de Képler, la différentielle de la longitude moyenne, qui intégrée de nouveau, donnera cette longitude. On peut observer ici, que cette double intégration donne à chaque terme du développement de la fonction perturbatrice, pour diviseur, le carré du coefficient du temps compris sous les signes sinus ou cosinus; ce qui rend ce terme, fort grand, lorsque ce coefficient est très petit.

La făcilité que donne l'expression très simple de la différentielle du grand axe, pour avoir la longitude, me fit rechercher s'il est possible de donner aux différentielles des autres élémens elliptiques, une forme aussi simple, dans laquelle les différences partielles de la fonction perturbatrice ne seraient prises que par rapport aux élémens, et dont les coefficiens ne renfermeraient point le temps. En effet, il suffirait alors de différencier par rapport à ces élémens, chaque terme du développement de la fonction perturbatrice et ensuite de l'intégrer. Je parvins à obtenir les différentielles des élémens sous cette forme, par l'analyse que j'ai donnée dans le Supplément à la Mécanique céleste, et que je présentai le 27 août 1807, au Bureau des Longitudes. Dans la même séance, Lagrange présenta une très belle analyse par laquelle il exprimait la différence partielle de la force perturbatrice, prise par rapport

à chaque élément, par une fonction linéaire des différentielles des élémens, divisées par la différentielle du temps, et dans laquelle les coefficiens de ces différentielles, ne renfermaient point le temps. En déterminant au moyen de ces expressions, la différentielle de chaque élément; il parvint ensuite aux mêmes équations que j'avais trouvées. Ce grand géomètre a étendu son analyse, au mouvement des corps solides, et généralement au mouvement d'un système de corps liés entre eux d'une manière quelconque. Ce travail des dernières années de sa vie, est une de ses plus belles productions : il montre que l'âge n'avait point affaibli son génie. M. Poisson a publié sur cet objet, plusieurs savans Mémoires où il a été conduit sur le mouvement des corps solides, à des équations de la même forme que pour les points libres; ce qui établit l'analogie de ces mouvemens.

Les recherches sur Jupiter et Saturne dont j'ai parlé ci-dessus, laissaient encore inconnue, la cause des grandes irrégularités que les observations anciennes et modernes indiquaient dans les mouvemens de ces deux planètes. Halley avait conclu de la comparaison des observations anciennes avec les modernes, un ralentissement dans le moyen mouvement de Saturne, et une accélération dans celui de Jupiter. Lambert avait obtenu un résultat contraire en comparant les observations du dernier siècle avec celles de Ticho-Brahé. Enfin Lalande trouvait les retours de Saturne à l'équinoxe du printemps, plus prompts que ses retours à l'équinoxe d'automne, quoique les positions de Jupiter et de Saturne, soit entre eux, soit à l'égard de leurs aphélies, fussent à peu près les mêmes. Cela portait à croire que des causes étrangères avaient altéré les mouvemens de ces deux planètes; mais en y réfléchissant, la marche de ces altérations me parut si bien d'accord avec ce qui devait résulter de leur action mutuelle, que je ne balançai point à rejeter toute action extérieure au système planétaire.

C'est un résultat remarquable de l'action réciproque des planètes, que si l'on n'a égard qu'aux inégalités dont les périodes sont très longues, la somme des masses de chaque planète divisées respectivement par les grands axes de leurs orbes considérés comme des ellipses variables, est à très peu près constante. Nous avons dit précédemment que ces inégalités acquièrent par une double intégration, dans l'expression de la longitude, pour diviseur, le carré du très petit coefficient du temps dans leur argument; ce qui peut les rendre considérables. De là il est facile de voir

que la somme des produits des inégalités de ce genre, qui résultent de l'action de Jupiter et de Saturne, multipliées respectivement par les masses de ces planètes, est nulle; ainsi, quand en vertu de ces inégalités, le mouvement de Saturne se rallențit par l'action de Jupiter, celui de Jupiter doit s'accélérer par l'action de Saturne, et le rallentissement doit être à l'accélération, dans le rapport de la masse de Jupiter multipliée par la racine carrée de son grand axe, à la masse de Saturne multipliée par la racine carrée de son grand axe; ce qui est à fort peu près conforme au résultat de Halley. Réciproquement, quand ces inégalités accélèrent le mouvement de Saturne, elles retardent celui de Jupiter dans le même rapport; ce qui s'accorde à peu près avec le résultat de Lambert. Cela indiquait avec une grande probabilité, l'existence d'une inégalité à très longue période dans les mouvemens de ces deux planètes. Il me fut aisé de reconnaître une inégalité semblable, dans les équations différentielles de ces mouvemens. Ils approchent beaucoup d'être commensurables, et cinq fois le mouvement de Saturne est à fort peu près égal à deux fois celui de Jupiter. De là je conclus que les termes qui ont pour argument, cinq fois la longitude moyenne de Saturne, moins deux fois celle de Jupiter, pouvaient devenir très sensibles par les intégrations, quoiqu'ils fussent multipliés par les cubes et par les produits de trois dimensions des excentricités et des inclinaisons des orbites. Je regardai donc ces termes, comme une cause fort vraisemblable des variations observées dans les moyens mouvemens de ces planètes. La probabilité de cette eause et l'importance de l'objet me déterminèrent à entreprendre le calcul long et pénible, nécessaire pour m'en assurer. Le résultat de ce calcul confirma pleinement ma conjecture, en me faisant voir 1°. qu'il existe dans le mouvement de Saturne, une grande inégalité de 8896" centésimales dans son maximum, dont la période est de 929 ans; 2° qu'il existe dans le mouvement de Jupiter une inégalité correspondante dont la période est à très peu près la même, mais qui, affectée d'un signe contraire, ne s'élève qu'à 3662". La grandeur des coefficiens de ces inégalités, et la durée de leur période ne sont pas toujours les mêmes : elles participent aux variations séculaires des élémens des orbites. J'ai déterminé avec un soin particulier ces coefficiens et leurs variations séculaires. Le rapport presque commensurable des moyens mouvemens de Jupiter et de Saturne, donne naissance à d'autres inégalités très sensibles. La plus considérable est celle qui affecte le mouvement de Saturne. Elle se confondrait avec l'équation du centre, si cinq fois le moven mouvement de cette planète était exactement égal à deux fois celui de Jupiter. C'est elle qui dans le dernier siècle, a rendu les retours de Saturne à l'équinoxe du printemps, plus prompts que ses retours à l'équinoxe d'automne; comme Lalande l'avait remarqué. En général, lorsque j'eus reconnu ces diverses inégalités, et déterminé avec plus de soin qu'on ne l'avait fait, celles que l'on avait déjà calculées : je vis toutes les observations anciennes et modernes représentées par ma théorie, avec la précision qu'elles comportent. Elles semblaient auparavant, inexplicables par la loi de la pesanteur universelle; elles en sont maintenant une des preuves les plus frappantes. Tel a été le sort de cette brillante découverte, que chaque difficulté qui s'est élevée, est devenue pour elle, un nouveau sujet de triomphe; ce qui est le plus sûr caractère du vrai système de la nature. Il restait à former des Tables de Jupiter et de Saturne, fondées sur ma théorie; ce qui exigeait une discussion nouvelle des meilleures observations, et leur comparaison avec ma théorie, pour en déduire les élémens du mouvement elliptique. Delambre exécuta ce travail, et les tables qu'il construisit ne s'écarterent pas d'une minute, des observations bien faites et bien discutées. Il appliqua mes formules à la planète Uranus que Herschel venait de découvrir; et il parvint à représenter par ses Tables, non-seulement les observations faites depuis cette découverte, mais encore quelques observations de Flamsteed, Mayer et Bradley qui avaient observé cette planète, en la considérant comme une étoile. Désirant donner aux Tables de ces trois planètes, la plus grande précision; j'ai revu avec un soin particulier, leur théorie; et M. Bouvard l'ayant comparée avec un grand nombre d'observations faites avec d'excellens instrumens, et par les meilleurs observateurs; il a construit de nouvelles Tables de ces trois planètes, qui ne s'écartent pas de ces observations, au-delà de treize secondes sexagésimales. Dans les équations de condition, qu'il a formées pour déterminer les élémens elliptiques, il a laissé comme indéterminées, les corrections des masses de ces planètes que l'on avait conclues des observations de leurs satellites. En résolvant ces équations, il a déterminé ces corrections. Il a trouvé nulle à fort peu près, celle de la masse de Jupiter. La correction de la masse de Saturne diminue d'un sixième environ la valeur que Newton en a donnée. Si l'on applique à ces résultats, le calcul des probabilités; on trouve qu'il est extrêmement probable que l'erreur n'est pas un centième de leur valeur. La correction de la masse d'Uranus conclue des observations de ses satellites, est peu considérable. L'action de cette planète sur Saturne n'étant pas très sensible, la valeur de sa masse est moins sûre, que celle de la masse de Saturne; mais elle confirme la valeur déduite des observations des satellites d'Uranus, et qui vu l'incertitude de ces observations, avait besoin d'être confirmée. Les Tables de M. Bouvard représentent aussi bien qu'on peut le désirer, les observations anciennes de Jupiter et de Saturne, et la conjonction de ces deux planètes observée par Ibn Junis dans l'année 1007. Cet accord prouve que depuis les temps anciens jusqu'à nous, l'action des causes étrangères a été insensible.

En considérant le peu de différence qui existe entre cinq fois le moyen mouvement de Saturne et deux fois celui de Jupiter; on voit qu'un léger changement dans les distances moyennes primitives de ces deux planètes eût suffi pour la rendre nulle. Mais cela même n'était pas nécessaire à cet objet; car l'attraction mutuelle des deux planètes eût rendu cette différence constamment nulle, dans le cas où elle ne l'aurait pas été à l'origine; pourvu qu'elle eût été contenue dans d'étroites limites. On verra bientôt que ces limites sont à peu près, plus ou moins quatre dixièmes de la différence observée; et que pour faire tomber cette différence dans ces limites, il suffirait d'augmenter d'un 530,° la moyenne distance de Saturne au Soleil, et de diminuer d'un 1300°, celle de Jupiter. Il s'en est donc fallu bien peu que les deux plus grosses planètes de notre système n'aient offert un phénomène analogue à celui des trois premiers satellites de Jupiter, mais qui eût été bien plus compliqué, par sa grande influence sur les variations séculaires des élémens de leurs orbites.

J'ai donné dans le sixième Livre, l'application de mes formules au système des planètes principales. Elles ont été appliquées aux quatre planètes télescopiques découvertes depuis le commencement de ce siècle. L'excentricité considérable des orbites de Pallas et de Junon rend les approximations peu convergentes. La recherche de nouvelles méthodes pour soumettre leurs perturbations au calcul, sera utile à l'Astronomie et à l'Analyse.

Clairant s'occupa, le premier, des perturbations des comètes. Il appliqua sa solution du problème des trois corps, au retour de la comète de 1682. Cette comète avait été observée en 1531 et 1607.

MÉCAN. CÉL. Tome V.

Halley avait déduit des observations, les intervalles de ses passages au périhélie, de 1531 à 1607 et de 1607 à 1682, et il en avait conclu son retour vers la fin de 1758, ou au commencement de 1759. Clairaut se proposa de rechercher la différence entre ces intervalles et celui de son passage au périhélie en 1682, au passage prochain. Après d'immenses calculs, il annonça à l'Académie des Sciences, dans sa séance publique du 14 novembre 1758, que le dernier de ces intervalles devait surpasser le précédent, d'environ 618 jours, et qu'en conséquence, la comète passerait à son périhélie vers le milieu d'avril 1759. Il observa en même temps que les petites quantités négligées dans ces approximations, pouvaient avancer ou reculer ce terme, d'un mois il remarqua d'ailleurs, « qu'un corps qui passe dans des régions aussi » éloignées, et qui échappe à nos yeux pendant des intervalles aussi » longs, pourrait être soumis à des forces totalement inconnues, telles » que l'action des autres comètes ou même de quelque planète trop » distante du Soleil, pour être jamais aperçue. »

Il eut la satisfaction de voir sa prédiction accomplie. La comète revint au périhélie le 12 mars 1759, dans les limites des erreurs dont il croyait son résultat susceptible. Après une révision de ses calculs, Clairaut a fixé ce passage au 4 avril, et il l'aurait avancé jusqu'au 24 mars, c'est-à-dire, à douze jours seulement de l'observation, s'il eût employé la vraie valeur de la masse de Saturne. Cette différence paraîtra bien petite, si l'on considère les erreurs inévitables dans des approximations aussi nombreuses et aussi compliquées, et l'influence de la planète Uranus dont l'existence, au temps de Clairaut, n'était pas connue. On doit donc regarder ce travail de Clairaut, comme une belle confirmation du principe de la pesanteur universelle. L'annonce de ce grand géomètre, sur le retour de la comète de 1750, donna lieu à une vive discussion sur la manière d'apprécier son erreur. Quelquesuns voulaient la répartir sur la révolution entière de la comète. D'Alembert jugea avec raison, que cette erreur devait se rapporter à la différence de l'intervalle entre les passages au périhélie de 1607 à 1682, à l'intervalle des passages au périhélie de 1682 à 1750. Il étendit aux comètes, sa solution du problème des trois corps, mais sans en faire d'applications numériques. C'est principalement aux perturbations des comètes, que la méthode de la variation des élémens elliptiques est appropriée. Cette méthode donne immédiatement ces élémens par des

MECAN. CEL. Tome V

quadratures mécaniques que l'on peut simplifier, sur-tout lorsque la comète est à une distance considérable de la planète perturbatrice. Lagrange a développé cette méthode dans la pièce qui remporta le prix de l'Académie des Sciences, en 1780; et je l'ai présentée avec étendue dans le neuvième Livre. MM. Encke et Damoiseau ont calculé les perturbations de la singulière comète dont la période n'est que de 1200 jours; et M. Damoiseau, dans une pièce couronnée par l'Académie des Sciences de Turin, a calculé le retour prochain de la comète de 1759. L'Académie des Sciences de Paris vient de provoquer de nouvelles recherches sur ces deux objets, en les proposant pour le sujet du prix qu'elle doit décerner en 1826.

Les géomètres ont soumis au calcul, les perturbations que l'action des comètes peut faire éprouver aux planètes et spécialement à la Terre. Cette action a été jusqu'à présent insensible, les perturbations produites par l'action des planètes et des satellites suffisant seules pour représenter les observations. Il en résulte que les masses des comètes sont extremement petites, ce que leur apparence nébuleuse confirme. La comète que l'on observe maintenant, est une nébulosité sans queue, dont le diamètre est d'environ deux minutes sexagésimales, et dans laquelle on ne distingue point de noyau. Cette masse de vapeurs n'exerce qu'une action insensible sur ses molécules extrêmes qui, comme la masse entière, n'obéissent qu'à l'action du Soleil. La régularité avec laquelle son mouvement suit les lois du mouvement parabolique, montre l'extrême rareté de la lumière et des autres fluides qui peuvent être répandus dans les espaces célestes; puisqu'ils n'opposent aucune résistance sensible, au mouvement d'une nébulosité aussi rare. Mais cette resistance, quoique insensible pendant l'apparition d'une comète, peut devenir sensible pendant une longue suite de ses révolutions. Son principal effet est par le chapitre VIII du dixième Livre, de diminuer sans cesse les grands axes des orbites. On peut expliquer ainsi la courte durée de la révolution de la comète qui a reparu après un intervalle de 1200 jours, et qui doit reparaître sans cesse après un semblable intervalle, à moins que l'évaporation qu'elle éprouve à chacune de ses apparitions, ne finisse par la rendre invisible.

d'applications numériques, C'est principalement aux perturbations des concètes, que les méthodes du la variation des élémens, ellipsiques, est app appropriée des lémens, par des lémens, par des appropriées des lements, est lémens, par des lements de lements

le suppléments saces fis que depet on pent simplifier, ent-tont lersen

Lagrange a développe cette metroele dans lu

## CHAPITRE TPin This one dune of mp so

Considérations sur quelques objets du second Livre

de 1750. L'Aced sin o sin A sin f. sin y

Sur les variations des élémens du mouvement elliptique.

2. J'ai donné dans le chapitre VIII du second Livre, les expressions différentielles des élémens du mouvement elliptique. J'ai repris cet objet d'une manière encore plus générale, dans le Supplément à la Mécanique céleste. Je vais ajouter ici quelques considérations à ce que j'ai dit dans ce Supplément dont je conserverai les dénominations, et que je suppose que l'on ait sous les yeux.

Les équations (5) et (6) de la page 6 de ce Supplément, supposent que l'on néglige les carrés et les puissances supérieures de p et de q, ce qui revient à les considérer comme infiniment petites. Mais il est facile d'étendre ces équations, au cas où ils sont finis. Pour cela, imaginons sur la surface d'une sphère, deux arcs AC et BC se coupant en C, et dont le premier représente un plan infiniment peu incliné à l'orbite représentée par BC, C étant le nœud ascendant de cette orbite sur AC. Représentons encore par l'arc BAM, un autre plan fixe formant avec AC, l'angle aigu et fini CAB. Je ne donne point ici cette figure, parce qu'elle est simple et facile à tracer d'après les indications précédentes. Nommons  $\sqrt[n]{}$  l'inclinaison de l'orbite BC sur BM ou le supplément de l'angle CBM. AC étant ce que j'ai nommé  $\theta$  dans le Supplément cité, et l'angle ACB étant ce que j'ai nommé  $\gamma$ ; on aura, en désignant par  $\pi$  la demi-circonférence et par A l'angle CAB, autraupe

At 7 = 2' to 7 = 7 + surface ABC. ob emusado

La surface ABC est aux infiniment petits près du second ordre, égale à  $\gamma$  (1 — cos  $\theta$ ) et par conséquent égale à  $\gamma$  — q, q désignant dans

le supplément,  $\gamma \cos \theta$ ; on a donc el moiton de mmo de q et de

ce qui donne en différenciant 7 9 T 19 A H

On a ensuite, en faisant AB tails, quelques , tiet a Austrianis an O

$$\sin \gamma$$
  $\sin \theta = \sin f$   $\sin \gamma$ 

Ce qui donne en observant que  $\gamma$  et f sont infiniment petits, et que  $\gamma$  sin  $\theta$  est ce que nous avons nommé p dans le Supplément,

Nommons présentement  $\theta'$  la distance du nœud de l'orbite sur BAM au point fixe M, et faisons de la distance du nœud de l'orbite sur BAM au point fixe M, et faisons

$$dp' = d\gamma' \cdot \cos \gamma' \cdot \sin \theta' + df \cdot \sin \gamma' \cdot \cos \theta',$$

$$dq' = d\gamma' \cdot \cos \gamma' \cdot \cos \theta' - df \cdot \sin \gamma \cdot \sin \theta'.$$

L'expression précédente de dp donne

On a ensuite par ce qui précède, dy = dq; on aura donc DA sers tram

Si l'on substitue au lieu de dp et dq leurs valeurs données par les équations (5) et (6) de la page 6 du Supplément, on aura

On a évidemment, en considérant successivement R comme fonction

de p et de q, et comme fonction de ptret de q, ; d 200 c, insurèlique el

En substituant pour dp' et dq', leurs valeurs précédentes en dp et dq, et comparant séparément les coefficiens de dp et de dq, on aura

On a ensuite, on falsent All 
$$= f$$
,  $f$   $= f$   $= f$ ,  $f$   $= f$   $= f$ ,  $f$   $= f$   $= f$ 

an point fixe M, of 
$$\frac{dR}{dq'}$$
.  $\frac{dR}{dq'}$ .  $\frac{dR}{dq$ 

On trouvera de la même manière  $df = d\theta$  servant que  $df = d\theta$ 

$$\frac{dq'}{\sqrt{1-c^2}} = \frac{andt}{\sqrt{1-c^2}} \cdot \cos \gamma \left(\frac{dR}{dp'}\right) \cdot \sqrt{b} = qb$$

Ces équations sont rigoureuses, et peuvent être substituées aux équations (5) et (6) du Supplément cité.

supplément cité, et si l'on designe ici par , et de ce que annob iup so

$$d\gamma' \cdot \sin \gamma' \cdot \cos \gamma' = p'dp' + q'dq';$$
 $d\theta' \cdot \sin^2 \gamma' = q'dp' - p'dq'.$ 

Substituant au lieu de dp' et de dq' leurs valeurs précédentes, on aura

$$d\gamma' \cdot \sin \gamma' = -\frac{andt}{\sqrt{1 - e^a}} \left[ p' \left( \frac{dR}{dq'} \right) - q' \left( \frac{dR}{dp'} \right) \right] = 0$$

On a

$$\left(\frac{d\mathbf{R}}{dp'}\right)dp' + \left(\frac{d\mathbf{R}}{dq'}\right)\frac{dq'}{dq'} = \left(\frac{d\mathbf{R}}{db'}\right)\frac{d\mathbf{R}'}{d\mathbf{R}'} + \left(\frac{d\mathbf{R}}{d\mathbf{\gamma}'}\right)d\mathbf{\gamma}'$$

En substituant pour do et dy, leurs valeurs précédentes, et en comparant séparément les coefficiens de dp' et de dq', on aura utile due na

sine no 
$$\left(\frac{dR}{dp'}\right) = \left(\frac{dR}{d\theta'}\right) \frac{\cos \theta'}{\sin x'} + \left(\frac{dR}{dy'}\right) \frac{\sin \theta'}{\cos x'}$$
; we also to hold no every sine of the description of the d

eurs de 
$$(\vec{q}_{ij}^{(R)}) = \vec{q}_{ij}^{(R)} \begin{pmatrix} dR \\ dp' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} dR \\ dR \end{pmatrix}$$
 de préce

on a donc

On trouvera de la même manière, gazial con accident de la même manière, gazial con accident de la même manière,

the equation 
$$d\theta' = \frac{d\theta'}{\sin \phi'} \cdot \sqrt{1 - e^2} \cdot \frac{dR}{d\eta'}$$
.

En ajoutant ces deux équations multipliées respectivement par  $d\theta'$  et -dy on aura itedus enter peuven to

$$0 = \left(\frac{dR}{d\gamma}\right)d\gamma' + \left(\frac{dR}{d\theta'}\right)d\theta'.$$

Ainsi, la fonction R est constante eu égard aux variations de  $\theta'$  et sine of the Mark of the sine de 2'.

Si l'on réunit ces équations, aux équations (1), (2), (3), (4) du Supplément cité, et si l'on désigne ici par y et 0, ce que nous venons de désigner par 2 et 6; on aura les six équations suivantes :

$$d\varepsilon = + \frac{andt \cdot \sqrt{1 - e^2}}{e} \left(1 - \sqrt{1 - e^2}\right) \left(\frac{dR}{de}\right) + 2a^2 ndt \left(\frac{dR}{da}\right); \quad (2)$$

$$de = \frac{a \cdot \sqrt{1 - e^2}}{e} \left(1 - \sqrt{1 - e^2}\right) dR + \frac{andt \cdot \sqrt{1 - e^2}}{e} \left(\frac{dR}{da}\right); \quad (3)$$

$$d\omega = \frac{andt \cdot \sqrt{1 - e^2}}{e} \cdot \left(\frac{dR}{de}\right); \qquad (4)$$

$$d\gamma = \frac{andt}{\sin \gamma \cdot \sqrt{1 - e^2}} \cdot \left(\frac{dR}{d\theta}\right); \qquad (5)$$

$$d\theta = -\frac{andt}{\sin \gamma \cdot \sqrt{1 - e^2}} \cdot \left(\frac{dR}{d\gamma}\right). \qquad (6)$$

On doit observer que la différence partielle  $\binom{dR}{da}$  doit être prise ici, sans faire varier n.

Dans la théorie des variations séculaires, il est plus simple d'employer au lieu des quantités e,  $\varpi$ ,  $\gamma$ ,  $\theta$ , les suivantes, h, l, p, q, en faisant

$$h = e \cdot \sin \varpi$$
;  $l = e \cdot \cos \varpi$ ;  $p = \gamma \cdot \sin \theta$ ;  $q = \gamma \cdot \cos \varpi$ .

Si l'on néglige les carrés de e et de  $\gamma$  et leurs produits, eu égard à l'unité; si l'on susbtitue pour n,  $\frac{1}{a^3}$ ; et si l'on observe qu'en n'ayant égard qu'aux variations séculaires, on doit négliger dR, ou le supposer nul; les équations (3), (4), (5) et (6) donneront les suivantes :

$$m.\frac{dh}{dt}\cdot\sqrt{a}=-m\left(\frac{dR}{dt}\right);$$

$$m.\frac{dl}{dt}\cdot\sqrt{a}=m\left(\frac{dR}{dh}\right);$$

$$m.\frac{dp}{dt}\cdot\sqrt{a}=-m\left(\frac{dR}{dq}\right);$$

$$m.\frac{dq}{dt}\cdot\sqrt{a}=m\left(\frac{dR}{dq}\right);$$

$$m.\frac{dq}{dt}\cdot\sqrt{a}=m\left(\frac{dR}{dp}\right);$$

où l'on ne doit considérer, dans une première approximation, que la partie de R, constante et dépendante de h, l, p et q. Cela posé; si l'on développe l'expression de R du n° 46 du second Livre, et si l'on désigne par F la quantité

$$\Sigma \begin{cases} \frac{3mm'ad(a, a')^{1}}{8(a'^{2} - a^{2})^{2}} \left[h^{2} + l^{2} + h'^{3} + l'^{4} - (p' - p)^{3} - (q' - q)^{2}\right] \\ -3mm' \left[\frac{(a^{2} + a'^{2})(a, a') + aa'(a, a')^{1}}{2(a'^{2} - a^{2})^{2}}\right] (hh' + ll') \end{cases}$$

Micesa che. Tome P

m Va ( min + oda) in w/d ( ddd + ddd) it etc. = 6

(a, a') étant la partie indépendante de  $\theta$  dans le développement de  $(a^2 - 2aa' \cdot \cos \theta + a'^2)^{\frac{1}{2}}$ , suivant les cosinus de  $\theta$  et de ses multiples;  $(a, a')^1$  étant le coefficient de  $\cos \theta$  dans ce développement; et la caractéristique  $\Sigma$  servant à exprimer la somme de toutes les quantités semblables à celle qu'elle précède, et que l'on peut former en considérant deux à deux les masses m, m', m'', etc.; on aura les équations suivantes:

where 
$$\frac{dh}{dt} \cdot \sqrt{a} = -\left(\frac{dF}{dt}\right);$$

$$m \cdot \frac{dl}{dt} \cdot \sqrt{a} = \left(\frac{dF}{dq}\right);$$

$$m \cdot \frac{dp}{dt} \cdot \sqrt{a} = -\left(\frac{dF}{dq}\right);$$

$$m \cdot \frac{dq}{dt} \cdot \sqrt{a} = \left(\frac{dF}{dq}\right);$$

$$m \cdot \frac{dq}{dt} \cdot \sqrt{a} = \left(\frac{dF}{dq}\right);$$

$$m' \cdot \frac{dh'}{dt} \cdot \sqrt{a'} = -\left(\frac{dF}{dt'}\right);$$

Ces équations sont les équations (A) et (C) des n° 55 et 59 du second livre. Lagrange a donné le premier les équations (C) relatives aux inclinaisons et aux nœuds des orbites, dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de 1774. J'ai donné les équations (A) dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de 1772. Toutes ces équations sont linéaires et facilement intégrables par les méthodes connues. Leur forme symétrique et fort simple m'a fait voir que leurs intégrales ne renferment par rapport aux temps, ni exponentielles ni arcs de cercle, et qu'ainsi les excentricités et les inclinaisons des orbites sont fonctions de sinus et de cosinus d'angles croissans avec une grande lenteur, et indépendans de la configuration mutuelle des planètes; en sorte que les orbites planétaires ont toujours été et seront toujours presque circulaires et peu inclinées entre elles; ce qui assure la stabilité du système planétaire. Il est facile de voir que les équations précédentes donnent

$$m \cdot \sqrt{a} (hdh + ldl) + m' \sqrt{a'} (h'dh' + l'dl') + \text{etc.} = 0,$$
  
 $m \cdot \sqrt{a} (pdp + qdq) + m' \sqrt{a'} (p'dp' + q'dq') + \text{etc.} = 0;$   
MÉCAN. CÉL. Tome V.

d'où l'on tire en intégrant : acceist do la sup bnerg aulq la ancesque

$$e^{a} \cdot m\sqrt{a} + e^{t_{2}} \cdot m' \cdot \sqrt{a'} + \text{etc.} = C;$$

$$\gamma^{2} \cdot m\sqrt{a} + \gamma'^{2} \cdot m' \cdot \sqrt{a'} + \text{etc.} = C'.$$
Some same all the meaning and all t

C et C' étant deux constantes très petites; il en résulte que e, e', etc.,  $\gamma$ , etc., seront toujours des quantités très petites.

Lagrange, dans la seconde édition de sa Mécanique analytique, observe que si la masse m' est très petite par rapport à m, comme Mars relativement à Jupiter dont il n'est pas la centième partie; alors le terme  $e'^2m'\sqrt{a'}$  sera toujours du même ordre que  $e^2m\sqrt{a}$ , quoique e' croisse considérablement et devienne même égal à l'unité. Il en conclut que l'on ne peut être alors assuré que  $e'^2$  conservera toujours une petite valeur, qu'en résolvant l'équation algébrique qui détermine les coefficiens du temps, dans les sinus et cosinus des expressions de h, l, h', l', etc.; et en s'assurant que les racines de cette équation sont toutes réelles. Mais si ce grand géomètre eût considéré ce que j'ai dit dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de 1784, et dans le n° 57 du second Livre de la Mécanique céleste; il aurait vu que sans recourir à cette résolution, je démontre que ces racines sont toutes réelles et inégales.

Sur le développement en série, des puissances du radical qui exprime la distance mutuelle de deux planètes.

On substituera cette valeur de b. dans l'équation aux differ noes

3. Si l'on nomme r et r' les rayons vecteurs de deux planètes, et  $\theta$  l'angle au Soleil, compris entre ces rayons; la distance mutuelle des deux planètes sera

r et r' diffèrent toujours peu des moyennes distances a et a' de ces planètes; en sorte qu'en désignant r par  $a+\delta r$ , r' par  $a'+\delta r^i$ ; on aura en développant le radical dans une série ordonnée suivant les puissances et les produits de  $\delta r$  et de  $\delta r'$ , une suite de termes multipliés par les puissances successivement décroissantes du radical

Supposons a' plus grand que a, et faisons  $\frac{a}{a'} \implies a'$ ; ce radical devient

$$a' \cdot \sqrt{1 - 2\alpha \cdot \cos \theta + \alpha^2}$$

Considérons généralement la puissance

et supposons qu'en la développant dans une sèrie ordonnée par rapport à cos 0, cos 20, etc., on ait la suite

en conclut que l'on ne peut être alors assuré que e' conserve toujours une petite valeur, qu'envil shrope nb et ion et par article valeur, qu'envil shrope nb et ion et petite valeur, qu'envil shrope nb et ion et l'acceptant de la conserve de la c

$$(i-s)\alpha \cdot b_i^{(i)} = (i-1)(1+\alpha^2) \cdot b_i^{(i-1)} = (i+s-2)\alpha \cdot b_i^{(i-2)}$$
 (a)

Cette équation aux différences finies peut être intégrée au moyen d'intégrales définies, par la méthode que j'ai donnée dans ma Théorie analytique des Probabilités. En faisant d'après cette méthode

$$b_{i}^{(i)} = \int x^{i} \varphi \cdot dx$$
, selles requestions and

 $\varphi$  étant une fonction de x; il faut déterminer  $\varphi$  et les limites de l'intégrale  $\int x^i \varphi dx$ ; ce que l'on fera de cette manière.

On substituera cette valeur de b, (1) dans l'équation aux différences finies (a) qui devient ainsi pale valeur de la common della common de la common della common de la common de la common de la common della commo

o=(i-s)
$$\alpha$$
.  $\int x^i \cdot \phi dx$ —(i-1)(1+ $\alpha$ )  $\int x^{i-1} \cdot \phi dx$ +(i+s-2) $\alpha$ .  $\int x^{i-2} \phi dx$ ,

En intégrant par parties, on aura

$$0 = x^{i-1} \cdot \varphi \cdot [\alpha - (1 + \alpha^2) x + \alpha x^2]$$

$$+ \int x^{i-2} \cdot \varphi dx [(s-1)\alpha + (1 + \alpha^2) x - (s+1) \alpha x^2]$$

$$- \int x^{i-1} \cdot d\varphi [\alpha - (1 + \alpha^2) x + \alpha x^2].$$

Cette équation doit, suivant la méthode que j'ai citée, se partager en deux, en égalant séparément à zéro les termes compris sous le signe

intégral se qui donne dun H recognes et de auch tiob no senenel

$$0 = \varphi \cdot [(s-1)\alpha + (1+\alpha^2)x - (s+1)\alpha x^2] \cdot dx - xd\varphi [\alpha - (1+\alpha^2)x + \alpha x^2],$$

$$0 = x^{i-1} \cdot \varphi \cdot [\alpha - (1+\alpha^2)x + \alpha x^2].$$

La première de ces équations donne en l'intégrant

$$\phi = \frac{H.x^{-1}}{[\alpha - (1 + \alpha^2) + \alpha(x^2 + 1) - \alpha]} = \phi$$

sions ferons

H étant une constante arbitraire. La seconde équation qui sert à déterminer les limites de l'intégrale, donne pour les limites de l'intégrale  $\int x^i \phi dx$ ,

the dernière interfere 
$$(x + a^*)x + ax^*$$

On peut toujours supposer s moindre que l'unité; parce qu'ayant pour ce cas, la valeur de  $b_i^{(i)}$ , on peut par le n° 49 du second Livre, en conclure la valeur relative à tous les cas où s est augmenté ou diminué d'un nombre entier. Dans le cas des planètes,  $s = \frac{1}{2}$ , et l'équation des limites devient

$$0 = \frac{1}{0 + x^{\frac{1}{2}}} \left[ a - \left( 1 + a^{2} \right) x + a x^{2} \right]^{\frac{1}{2}}$$

dont les racines sont, lorsque i est égal ou plus grand que 2,000 iup

$$(0) x = 0, \quad x = \alpha, \quad x = \frac{1}{\alpha}.$$

Ainsi l'intégrale complète de l'équation (a) est alors la distance de l'équation (b) e

$$b_{\frac{1}{a}} = H \cdot \frac{\int_{x}^{i-\frac{1}{a}} dx}{\sqrt{(a-x)(i-ax)}} + H \cdot \frac{\int_{x}^{i-\frac{1}{a}} dx}{\sqrt{(a-x)(i-ax)}} \cdot \frac{\int_{x}^{i-\frac{1}{a}} dx}{\int_{x}^{i-\frac{1}{a}} dx} = 0$$

la première intégrale étant prise depuis x = 0 jusqu'à  $x = \alpha$ , et la seconde étant prise depuis  $x = \alpha$  jusqu'à  $x = \frac{1}{\alpha}$ . H et H' sont deux arbitraires. Cette dernière intégrale introduit dans l'expression de  $b_{\frac{1}{2}}^{(i)}$ , des puissances négatives de  $\alpha$ , de l'ordre  $\frac{1}{\alpha^i}$ ; ce qui n'a point lieu pour

les planètes. On doit donc alors supposer H' nul. Pour avoir l'intégrale

$$0 = x^{l-1} \cdot \phi \cdot (x-l) - y \cdot (x-l) \cdot (x-l)$$

nous ferons

nous ferons 
$$x = \alpha(1 - t^2);$$
  $x = \alpha(1 - t^2);$  l'intégrale précédente devient ainsi $+1$ )  $+\infty$ 

cette dernière intégrale étant prise depuis t = 0, jusqu'à t = 1; c'est l'expression de b<sup>(1)</sup>. Soit

c étant le nombre dont le logarithme byperbolique est l'unité : on aura en développant en série

the development en serie the series that 
$$t^2 = \frac{u^2}{i - \frac{1}{2}} \cdot \left[ \frac{u^2}{2 \left( i - \frac{1}{2} \right)} \right] + \frac{u^4}{2 \left( i - \frac{1}{2} \right)^2} - \text{etc.}$$

dont les racines sont, lorsque i est égal ou plus grand que sanob iup so

$$t = \frac{u}{\sqrt{1 - \frac{1}{2}}} \left( 1 - \frac{u^2}{4(1 - \frac{1}{2})} + \text{etc.} \right).$$

Lorsque i est un grand nombre, les termes qui suivent le premier dans le second membre, deviennent successivement plus petits et sont des ordres  $\frac{1}{i}$ ,  $\frac{1}{i^2}$ , etc., par rapport à lui. Nous ne considérerons ici que le premier, et alors l'expression précédente de bor, devient

la première intégrale dant price depuis 
$$x_{H\overline{z}}$$
 o jusqu'a  $x = a$ , et la seconde étant prise depuis  $x = a$  d'auqu'a  $x = a$ . Het H'sont deun

t nul, donne w nul, et t = 1, donne w infini. L'intégrale fdu . c ... c devient, comme l'on sait, dans les limites, égale à 1 vn, m'étant

la demi-circonférence dont le rayon est l'unité. On a donc, lorsque i est un grand nombre

$$b^{(i)} = \frac{H\alpha^{i} \cdot \sqrt{\pi}}{\sqrt{(i-\frac{1}{2})(1-\alpha^{2})}}$$
Lacteur précédent devient ainsi — Le premier

Pour déterminer H, nous observerons que b(1) étant le coefficient de  $\cos i\theta$ , dans le développement de  $(1 - 2\alpha \cdot \cos \theta + \alpha^2)^{-\frac{1}{2}}$ , ou de

$$(1 - \alpha \cdot c^{\theta} \sqrt{os})^{-\frac{1}{2}} (1 - \alpha c^{\theta} \sqrt{-1})^{-\frac{1}{2}};$$

to a compare the entire terms of the compare terms of the compare

on a

$$2b^{(i)}_{\frac{1}{2}} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots (2i-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots 2i} \cdot \alpha^{i} \left[ 1 + \frac{2i+1}{2i+2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \alpha^{2} + \frac{2i+1 \cdot 2i+3}{2i+2 \cdot 2i+4} \cdot \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot \alpha^{i} + \text{etc.} \right].$$

Considérons  $b^{(i)}$  comme fonction de i et de  $\alpha$ , et développons cette fonction suivant les puissances descendantes de i. Le premier terme du facteur

$$1 + \frac{2i+1}{2i+2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \alpha^{2} + \frac{2i+1}{2i+2} \cdot \frac{2i+3}{2i+4} \cdot \frac{1\cdot 3}{2\cdot 4} \alpha^{4} + \text{etc.},$$

de (1-20. cost de 10 1 es envergente

Le premier terme du facteur ervis bacces ab co a ub essure l'

1.3.5...(
$$2i = 1$$
), ou  $1.2.3....2i$  our partier  $2^{2i}(1.2.3...i)^2$  our  $2^{2i}(1.2.3...i)^2$  our destroy are so and sax same as a selection of the selecti

développé suivant les puissances descendantes de i, peut être ainsi déterminé. On a par les théorèmes connus, pour le premier terme du produit, 1.2.3....2i, la quantité

$$(2i)^{2i} + \frac{1}{2} \cdot c^{-2i} \sqrt{2\pi}, \text{ and that } A$$

dagnerons par a pour Jupius et per d' pour Sature, des

et pour le premier terme du produit 1.2...i, le terme

$$i^{i+\frac{1}{2}},e^{-i}$$
.  $\sqrt{2\pi}$ ; ...

le facteur précédent devient ainsi  $\frac{1}{\sqrt{i\pi}}$ . Le premier terme de la valeur de  $b^{(i)}_{\frac{1}{2}}$  réduite en série par rapport aux puissances descendantes de i est donc

$$\frac{a^{i}}{(1-a^{2})};$$

mais par ce qui précède, ce premier terme est

1. 8. 1 8+12.14.2 H. at. 
$$\sqrt{\pi}$$
 2 (1-32)... d. 8. 1 (1-32) ... d. 8. 1

on a donc

Considérous 
$$\ell^{O_1}$$
 comme foncti;  $\frac{1}{\pi^2} = H$  de  $x_s$  et développons cel

et par conséquent, sel satualismes de sobjection del mayine montano

$$b_{\frac{1}{2}}^{(i)} = \frac{a^{i}}{\pi \cdot \sqrt{1-a^{2}}} \cdot \int \frac{(1-t^{2})^{i-\frac{1}{2}} \cdot dt}{\sqrt{(1-t^{2})\left(1+\frac{a^{2}t^{2}}{1-a^{2}}\right)}};$$

l'intégrale étant prise depuis t nul jusqu'à t égal à l'unité.  $\alpha$  étant toujours moindre que l'unité, on voit que les valeurs de  $b_{\frac{1}{2}}^{(0)}$  deviennent de plus en plus petites, et qu'ainsi la série du développement de  $(1-2\alpha.\cos\theta+\alpha^2)^{-\frac{1}{2}}$ , est très convergente.

De la grande inégalité de Jupiter et de Saturne.

4. Il résulte du n° 65 du second Livre, qu'en considérant l'orbite troublée d'une planète, comme une ellipse variable; si l'on nomme  $\zeta$  la longitude moyenne de Jupiter,  $\zeta'$  celle de Saturne; l'expression différentielle des grands axes donne les deux équations différentielles

$$\frac{dd\zeta}{dt^2} = q \cdot \sin(5\zeta' - 2\zeta + A),$$

$$\frac{dd\zeta'}{dt^2} = q \cdot \sin(5\zeta' - 2\zeta + A),$$

q, q', A étant fonctions des demi-grands axes des deux planètes, que nous désignerons par a pour Jupiter et par a' pour Saturne, des

excentricités et des inclinaisons des orbites, des longitudes des périhélies et des nœuds, ensin des époques de la longitude. Nous regarderons ici ces quantités, comme constantes; ce qui, pour notre objet, peut être supposé sans erreur sensible. En faisant donc

$$V = 5\zeta' - 2\zeta + A,$$

nous aurons

$$\frac{dd\mathbf{V}}{dt^2} = (5q' - 2q)\sin\mathbf{V},$$

d'où l'on tire, en multipliant cette équation par dV et en l'intégrant,

and the limit 
$$\frac{dV}{dt} = \sqrt{c^a - (10q' - 4q) \cos V}$$
; also also as

c étant une constante arbitraire. Relativement à Jupiter et à Saturne, c est égal à 5n'-2n, nt et n't étant les parties non périodiques de leurs longitudes moyennes.

Si  $c^*$  surpasse (10q'-4q) pris positivement, on pourra réduire en série convergente, la quantité sous le radical; et alors on obtient, pour Jupiter et Saturne, la valeur qui résulte des formules du sixième Livre. Mais si  $c^*$  est moindre que 10q'-4q pris positivement; l'angle V ne peut plus croître indéfiniment; il ne peut qu'osciller autour de l'un de ces deux points, zéro et la demi-circonférence. Ce changement de révolution en oscillation, aura lieu si, en faisant varier n et n' de n et n', on a

$$5n' - 2n + 5 \delta n' - 2\delta n = \sqrt{10q' - 4q}$$

la quantité sous le radical étant prise positivement. Cette quantité peut être supposée sensiblement la même pour toutes les valeurs de  $\Im n$  et  $\Im n'$ , pourvu qu'elles soient fort petites relativement à n et n'; parce que les demi-grands axes a et a' dont q et q' dépendent, restent alors à très peu peu près les mêmes. Les deux grandes inégalités de Jupiter et de Saturne sont à fort peu près,

$$\frac{-q}{(5n'-2n)^2} \cdot \sin V; \quad \frac{-q'}{(5n'-2n)^2} \cdot \sin V.$$

Dans les dernières tables de M. Bouvard, ces inégalités sont en secondes centésimales,

ce qui donne anoitoni astite

$$q = -(5n' - 2n)^2 \cdot 3662'',4;$$
  $q' = (5n' - 2n)^2 \cdot 8875'',7.$ 

En réduisant les arcs, en parties du rayon; on a

$$\sqrt{10q'-4q}=(5n'-2n).0,4042;$$

les deux limites de l'oscillation de  $\frac{dV}{dt}$  sont donc

Pour que la valeur de  $\frac{dV}{dt}$  soit comprise dans ces limites, il faut que l'on ait

$$5n' - 2n + 55n' - 25n' < 0,4042 \cdot (5n - 2n);$$

ce qui commence à exister, lorsque l'on a

Alors le moyen mouvement de Saturne deviendrait exactement les deux cinquièmes de celui de Jupiter. Si l'on fait In égal à In', l'équation précédente donne gel al 13 avec a raison de la  $\delta n' = -\frac{0.5958}{7}.(5n'-2n)$ .

$$\Im n' = -\frac{0.5958}{7}.(5n'-2n).$$

Or on a à fort peu près,  $5n'-2n=\frac{n'}{30}$ ; on aura donc

$$\frac{\partial n'}{n'} = -\frac{0.5958}{210}$$

On a, par les lois de Képler,  $\frac{\partial n'}{n'} = -\frac{3}{2} \cdot \frac{\partial a'}{a'}$ ; on aura ainsi

$$\delta a' = \frac{a'}{530};$$

et comme on a supposé  $\Im n = \Im n'$ , on aura

$$\delta a = \frac{a}{1320}.$$

MÉCAN. CÉL. Tome V.

Il eût donc suffi de faire varier de ces petites fractions, les distances moyennes de ces deux planètes au Soleil, pour rendre leurs moyens mouvemens commensurables. La détermination de V aurait alors présenté des difficultés; mais il est inutile de nous en occuper.

Sur la détermination des orbites des comètes par les observations.

5. J'ai donné dans les nos 28 et suivans du second Livre, une nouvelle méthode pour déterminer les orbites des comètes. Elle consiste à déterminer par les observations, en partant d'une époque fixe, la longitude et la latitude géocentriques de la comète, et leurs premières et secondes différences, divisées par les puissances correspondantes de l'élément dt du temps supposé constant. On conclut ensuite rigoureusement, des équations différentielles du mouvement de la comète, sa distance périhélie et l'instant de son passage par le périhélie. Pour obtenir avec plus de précision, les données dont je viens de parler; j'avais proposé d'employer plus de trois observations, en ayant soin d'augmenter l'intervalle des observations extrêmes, en raison du nombre des observations employées. Mais indépendamment de la longueur du calcul, les erreurs des observations nuisent à l'exactitude que l'on peut attendre de la multiplicité des observations; et il me paraît préférable de n'en employer que trois, en fixant l'époque, à l'observation intermédiaire, et en prenant les observations extrêmes, assez peu distantes entre elles pour que dans l'intervalle qui les sépare, les données précédentes puissent être supposées à fort peu près les mêmes.

Soient  $\alpha_i$ ,  $\alpha$ ,  $\alpha'$  les longitudes géocentriques de la comète, dans la première, dans la seconde et dans la troisième observation. Soient  $\theta$ ,,  $\theta$  et  $\theta'$  les latitudes géocentriques correspondantes. Désignons par i l'intervalle de la première à la seconde observation, et par i' l'intervalle de la seconde observation à la troisième. Prenons pour époque la seconde observation, et désignons par a, b, h, l, les quatre différentielles  $\frac{d\alpha}{dt}$ ,  $\frac{dd\alpha}{dt^2}$ ,  $\frac{dd\theta}{dt}$ ,  $\frac{dd\theta}{dt^2}$ . Nous aurons par les formules connues, les quatre équations,

$$\alpha - \alpha_i = ia - \frac{i^2}{2} \cdot b; \quad \theta = \theta_i = ih - \frac{i^2}{2} \cdot l,$$

$$a'-a=i'a+\frac{i'^2}{2}\cdot b; \quad \theta'-\theta=i'h+\frac{i'^2}{2}\cdot l$$

On doit observer ici, que les intervalles i et i' sont égaux aux produits du nombre des jours qu'ils comprennent, par l'arc que la Terre décrit dans un jour, en vertu de son mouvement moyen. En supposant donc que dans les équations précédentes, i et i' soient ces nombres de jours; ces équations donneront, en y changeant a, b, h, l, en d', b', h', l', les valeurs de ces dernières quantités, en secondes. Si elles sont sexagésimales, on aura les logarithmes de a et de h, en retranchant des logarithmes des nombres de secondes contenues dans a' et h', le logarithme 3,5500072. On aura les logarithmes de b et b', en retranchant des logarithmes des nombres de secondes contenues dans b' et b', le logarithme 1,7855874.

On déterminerait avec plus d'exactitude, les quatre inconnues a, b, h et l, en employant d'autres observations, pourvu qu'elles soient comprises entre les deux observations extrêmes précédentes. On aura, par ce qui précède, les équations relatives aux observations ajoutées. On formera ensuite, de toutes ces équations, par la méthode la plus avantageuse, quatre équations finales qui détermineront les inconnues a, b, h et l. Cela posé, les équations (1), (2), (3) et (4) du n° 36 du second Livre, donnent les suivantes:

$$r^{2} = \frac{x^{2}}{\cos^{2}\theta} - 2Rx \cdot \cos\left(\Theta - \alpha\right) + R^{2}; \qquad (a)$$

$$ay = \frac{1}{2}R \cdot \sin\left(\Theta - \alpha\right) \left(\frac{1}{r^{3}} - \frac{1}{R^{3}}\right) - \frac{1}{2}bx; \qquad (a')$$

$$hy = -x \left(h^{a} \cdot \tan \theta + \frac{1}{2}l + \frac{1}{2}a^{a} \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta\right); (a'')$$

$$+ \frac{1}{2}R \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta \cdot \cos (\odot - \alpha) \left(\frac{1}{R^{3}} - \frac{1}{r^{3}}\right);$$

$$0 = \frac{y^2}{\cos^2 \theta} + a^2 x^2 + \frac{h^2 x^2}{\cos^4 \theta} + \frac{2hyx \cdot \tan \theta}{\cos^2 \theta}$$

$$+ 2y \left[ \frac{\sin (\bigcirc - \alpha)}{R} - (R' + 1) \cos (\bigcirc - \alpha) \right]; (a''')$$

$$- 2ax \left[ (R' + 1) \sin (\bigcirc - \alpha) + \frac{\cos (\bigcirc - \alpha)}{R} \right]$$

$$+ \frac{1}{R^2} - \frac{1}{1}.$$

Ces équations sont relatives au mouvement parabolique; r est le rayon vecteur de la comète, au moment de l'observation prise pour époque; R, est le rayon vecteur de la Terre, sa moyenne distance au Soleil étant prise pour unité; O est la longitude du Soleil, à l'instant de l'époque; R' est le rayon vecteur de la Terre, lorsqu'on augmente O d'un angle droit!; a et  $\theta$  sont les longitudes et les latitudes géocentriques de la comète au moment de l'époque; x est la distance de la comète au centre de la Terre, projetée sur le plan de l'écliptique. Enfin y désigne  $\frac{dx}{dt}$ .

Il y a, comme on voit, plus d'équations que d'inconnues; ce qui doit avoir lieu dans le mouvement parabolique, en vertu de la supposition du grand axe infini; il faut donc alors ou choisir entre les deux équations (a') et (a''), ou les combiner de la manière la plus avantageuse. J'avais proposé dans le second Livre, d'employer l'équation (a'), ou l'équation (a'), selon que b est plus grand ou plus petit que l. Mais depuis, m'étant fort occupé de l'influence des erreurs des observations, sur leurs résultats; j'ai reconnu que le moyen le plus propre à diminuer ici cette influence, consiste là combiner ces équations, en multipliant l'équation (a') par a, l'équation (a'') par h, et en ajoutant ces produits; ce qui donne l'équation suivante:

$$y = \begin{cases} \frac{\left[a \cdot \sin\left(\odot - a\right) + h \cdot \sin\theta \cdot \cos\theta \cdot \cos\left(\odot - a\right)\right]}{2\left(a^2 + h^2\right)} \cdot R \cdot \left(\frac{1}{r^3} - \frac{1}{R^3}\right) \\ \frac{-x\left(h^3 \cdot \tan\theta + \frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}hl + \frac{1}{2}a^2h \cdot \sin\theta \cdot \cos\theta\right)}{a^2 + h^2} \end{cases} . (a^{1v})$$

On combinera donc cette équation avec les équations (a) et (a'''), pour avoir les valeurs de x, y, r. On fera une première supposition pour x, et l'équation (a) donnera la valeur correspondante de r; ensuite l'équation (a''') donnera la valeur de y. Ces valeurs substituées dans l'équation (a''') doivent y satisfaire, si la valeur de x a été bien choisie. Si cette équation n'est pas satisfaite, on prendra une seconde valeur de x; et ainsi de suite. Quelques essais feront bientôt connaître la vraie valeur de x. On en conclura, comme dans le n° 36 du second Livre, la distance périhélie, et l'instant du passage de la comète par le périhélie. On formera la quantité

46.

Ces équations sont relatives au mouvement par 
$$(x) + (x) +$$

En désignant par P cette quantité, et par D la distance périhélie; au centre de la Terre, projetée sur le plan de l'écliptique Lahre de la Terre, q = q = q

$$D = r - \frac{1}{2} P^2;$$

le cosinus de l'anomalie que nous nommerons v, sera donné par l'équation un comb sup anomalie que nous nommerons v, sera donné par doit avoir dieu dans le mouvengent parabolique, en vertu de la s

equations (a) et (a", ou les combiner de la manière la plus ava et l'on en conclura par la table du mouvement des comètes, le temps employé à parcourir l'angle v. En ajoutant ce temps à l'époque, ou en l'en retranchant suivant que P est négatif ou positif; on aura l'instant du passage au périhélie.

Ayant ainsi à peu près la distance périhélie de la comète, et l'instant de son passage au périhélie, on les corrigera par la méthode du nº 36 du second Livre.

Pour faciliter l'usage de la méthode précédente, je vais présenter ici l'application que M. Bouvard en a faite à la comète que l'on observe maintenant.

On a choisi les trois observations suivantes évaluées en mesures sexagésimales et en temps moyen à Paris, compté de minuit.

### On combinera done cette equation avec les equations (a) et (am), pour

moq nodisoque o Longitudes observées. D. Latitudes observées. el movie

$$a_1 = 237^{\circ} 29' 3'' \dots \theta_1 = 55^{\circ} 18' 42'' \text{ Bor.}$$
 $a_2 = 230^{\circ} 31' 33'' \dots \theta_n = 57^{\circ} 42' 22'' \text{ Bor.}$ 
 $a_1 = 230^{\circ} 31' 33'' \dots \theta_n = 57^{\circ} 42' 22'' \text{ Bor.}$ 
 $a_2 = 234^{\circ} 6' 30'' \dots \theta_n = 59^{\circ} 33' 58'' \text{ Bor.}$ 

En prenant pour époque moyenne, l'élonservaille du 22 aut, les les de jours t et l'isseme dans le nombres de jours t et l'instant du passage de la comete par le penhelle, et l'instant du passage de la comete par le penhelle.

On aura ainsi, relativement à la longitude, les deux équations

$$5,99352 \cdot a' - 17,96115 \cdot b' = -6^{\circ},95834;$$
  
 $5,97819 \cdot a' + 17,86938 \cdot b' = -6^{\circ},41750.$ 

La résolution de ces équations donne

$$a' = -4021'',807; b' = 52'',6188.$$

En retranchant du logarithme du nombre de secondes de cette valeur de -a', le logarithme constant 3,5500072, on aura pour le logarithme de la valeur de -a, 0,0544141. Retranchant du logarithme du nombre de secondes de cette valeur de b', le logarithme constant 1,7855874; on aura, pour le logarithme de la valeur de b, 1,9355515.  $\alpha$  est ici 230°31′33″.

En considérant d'une manière semblable les équations relatives à la latitude, on formera les équations

$$5,99352 \cdot h' - 17,96115 \cdot l' = 2^{\circ},39445,$$
  
 $5,97819 \cdot h' + 17,86938 \cdot l' = 1^{\circ},85999;$ 

d'où l'on tire

$$h' = 1278'',941; l' = -53'',1516;$$

ce qui donne pour les logarithmes de h et de -l,

$$\bar{1},5568434; \bar{1},9399266, \dots$$
 $\theta = 57^{\circ} 42' 22''.$ 

et l'on a

Pour donner un exemple de la manière d'employer plus de trois observations, on a considéré les observations du 20 et du 25 août, qui donnent

Temps moyen.	Longitude observée.	Latitude observée.
20,93635	2320 44'56"	56° 59′ 5″. Bor.
25,90792	227° 13′38″	58° 42'11". Bor.

On a formé les quatre équations suivantes relatives à la longitude

$$5,99352 \cdot a' - 17,96115 \cdot b' = -6^{\circ},95834,$$
  
 $1,96518 \cdot a' - 1,93097 \cdot b' = -2^{\circ},22305,$ 

$$3,00639 \cdot a' + 4,51919 \cdot b' = -3^{\circ},29862,$$
  
 $5,97819 \cdot a' + 17,86938 \cdot b' = -6^{\circ},41750.$ 

Pour réduire ces équations, à deux équations finales; on a multiplié chacune de ces équations par son coefficient de a', et l'on a ajouté ces produits, ce qui a donné, pour première équation,

$$+ 84,56138 \cdot a' + 8,96778 \cdot b' = -94^{\circ},35563.$$

On a multiplié chacune des mêmes équations par son coefficient de b' et l'on a ajouté les produits, ce qui a donné, pour équation finale,

$$ab = ab = 8,96778 a' + 666,06906 . b' = -0,31145. ab said to$$

De ces deux équations finales, on a conclu, comme ci-dessus,

$$\log - a = 0.0544923$$
;  $\log b = \overline{1.9343631}$ .

Ces valeurs diffèrent très peu des précédentes. La valeur de  $\alpha$  est la même que ci-dessus.

En opérant d'une manière semblable sur les latitudes, on a trouvé

$$\log h = 1,5563862$$
;  $\log - l = 1,9397564$ .

La valeur de  $\theta$  est la même que ci-dessus.

Ayant ainsi les valeurs de a, a, b,  $\theta$ , h, l, on les a substituées dans les équations (a),  $(a^{1v})$ , (a'''), en observant qu'à l'époque de l'observation du 22 août, on a

$$\odot = 149^{\circ} 38' 37'';$$

on about 10g R = 0,0046329; more an enough and 10g (1-R') = 2,1097810.

On a formé ainsi les trois équations suivantes,

$$r^{2} = 3,50341 \cdot x^{2} - 0,32033 \cdot x + 1,021565;$$

$$y = 0,32913 \cdot x + \frac{0,39060}{r^{3}} - 0,37830;$$

$$0 = 3,50341 \cdot y^{2} + 3,99184 \cdot xy + 2,87655 \cdot x^{2} - 1,945969 \cdot y + 0,38431 \cdot x - \frac{2}{r} + 0,97889.$$

On a trouvé après un petit nombre d'essais

 $x = 0,41331; \quad y = -0,026789; \quad r = 1,21970;$ 

d'où l'on a conclu

P = -0.577229;

et la distance périhélie, égale à 1,053095; ce qui a donné pour l'instant du passage au périhélie, sept.29',10239, temps moyen compté de minuit à Paris.

Les valeurs précédentes de a, b, h, l, relatives à trois observations, ont donné la distance périhélie égale à 1,053650; et pour l'instant du passage, sept.29',04587; ce qui diffère peu des résultats fondés sur cinq observations.

FIN DU LIVRE XV.

Mini Separate territoria la laporti de con contra

#### ERRATA DU SECOND LIVRE ON RIOT AO

y == 0,026780

P == 0,577229;

Page 213, nº 33, ligne 17, au lieu de ces mots, ces équations donnent, lisez cette équation combinée avec sa différentielle donne

Page 262, nº 47, l'équation (Z') du dernier alinéa de ce numéro, n'est exacte qu'en négligeant l'excentricité et le carré de l'inclinaison de l'orbite. C'est avec cette restriction, qu'elle a été employée dans tout l'Ouvrage. Il faut supprimer cet alinéa et y substituer ces mots: l'équation (Z) du nº précédent donnera d'une manière fort simple, la valeur de d's.

#### ERRATA DU SECOND LIVRE.

Page 213, nº 33, ligne 17, au lieu de ces mots, ces équations donnent, lisez cette équation combinée avec sa différentielle donne

Page 262, nº 47, l'équation (Z') du dernier alinéa de ce numéro, n'est exacte qu'en négligeant l'excentricité et le carré de l'inclinaison de l'orbite. C'est avec cette restriction, qu'elle a été employée dans tout l'Ouvrage. Il faut supprimer cet alinéa et y substituer ces mots: l'équation (Z) du n° précédent donnera d'une manière sort simple, la valeur de l's.

# TRAITÉ

DE

## MÉCANIQUE CÉLESTE.

LIVRE XVI.

AOUT 1825.

AV PARTI

EN MOUSEMENT DES SATELLITES

OF WOUVENIENT DE LA LUNE

## TRAITE

CHADETH

# MECANIQUE CELESTE.

leaders of the color of the col

Hyperson and accomplished in polarishe Chaldren of the accompanion of

### LIVRE XVI.

#### DU MOUVEMENT DES SATELLITES.

#### DU MOUVEMENT DE LA LUNE.

## emen al esta too CHAPITRE I".

soleil, n'etait point applicable and correction à la Lame; et qu'il

Notice historique des travaux des Géomètres et des Astronomes sur cet objet.

1. Les Chaldéens ont connu l'accélération du mouvement de la Lune, lorsqu'elle va de son apogée à son périgée; et sa diminution, en allant du périgée à l'apogée. Ils supposaient cette accélération et cette diminution, constantes et de 18' sexagésimales par jour; ce qui répond à une équation du centre d'environ 4° 7'. Nous ignorons l'inclinaison qu'ils supposaient à l'orbite lunaire. Ils avaient reconnu par les observations des éclipses, les mouvemens des nœuds et de l'apogée de cette orbite; et ils avaient formé la période remarquable de 6585<sup>j</sup> ½, pendant lesquels la Lune fait 223 révolutions à l'égard du Soleil, 239 révolutions anomalistiques, et 241 révolutions par rapport à ses nœuds. Ils ajoutaient ½ de la circonférence, à dix-huit circonférences, pour avoir le mouvement sidéral du soleil dans cet intervalle; ce qui suppose l'année sidérale de 365<sup>j</sup> ¼, la même que l'année tropique admise par les plus anciens astronomes. Il paraît donc que la précession des équinoxes était inconnue aux Chaldéens.

Hypparque perfectionna la période Chaldéenne, en la comparant à Mécan. cél. Tome V.

un grand nombre d'éclipses. Il fixa l'inclinaison de l'orbite de la Lune et son équation du centre, à 5 degrés dans ces phénomènes. Mais il remarqua que cette équation ne représentait point dans les quadratures, ses observations qui offraient alors de grandes anomalies. Ptolémée suivant avec soin ces anomalies, fut conduit à la découverte de l'inégalité lunaire que l'on nomme évection, dont il détermina la valeur avec beaucoup d'exactitude.

Les astronomes n'ajoutèrent rien à la théorie de la Lune de Ptolémée, jusqu'à Ticho-Brahé qui, en comparant cette théorie avec ses observations de la Lune dans les octans, reconnut l'inégalité de la variation dont le maximum correspond à ces points. L'exactitude de ces observations lui fit encore reconnaître que l'équation du temps propre au Soleil, n'était point applicable sans correction à la Lune; et qu'il fallait, pour ce dernier astre, la corriger d'une quantité dépendante de l'anomalie du Soleil. Les astronomes ont ensuite appliqué cette correction au mouvement de la Lune, en donnant à cet astre la même équation du temps qu'à tous les autres; ce qui ajoute à son mouvement, l'inégalité connue sous le nom d'équation annuelle. On supposait avant Ticho-Brahé, l'inclinaison de l'orbite lunaire, constante; et le mouvement de ses nœuds, uniforme. Ce grand astronome dut encore à la bonté de ses observations, la connaissance des deux inégalités principales de ces élémens, d'où résulte la principale inégalité de la Lune en latitude.

Tel était l'état de la théorie de la Lune, lorsque Newton entreprit d'appliquer à cette théorie, le principe de la pesanteur universelle. Il publia ses recherches sur cet objet, dans le troisième livre des Principes mathématiques de la Philosophie naturelle; et je n'hésite point à les regarder comme une des parties les plus profondes de cet admirable ouvrage (\*). Newton n'a point rattaché à son principe, la plus grande des inégalités lunaires, l'évection qu'il considérait avec Horox, comme le résultat de deux inégalités, l'une dans l'excentricité de l'orbite, l'autre dans le mouvement de l'apogée. On voit cependant qu'il avait essayé de déterminer ces inégalités, ainsi que le moyen

<sup>(\*)</sup> On voit dans la correspondance de Newton avec Halley, que Newton fatigué de ses querelles avec Hooek, voulait supprimer ce troisième Livre. Mais heureusement pour les progrès de l'Astronomie, cédant aux instances de Halley, il consentit à le publier.

mouvement de l'apogée; mais ces essais ne l'ayant point satisfait, il s'abstint de les publier. En effet, la détermination de ce mouvement a présenté aux géomètres de grandes difficultés.

Newton a été plus heureux par rapport à la variation. Pour l'obtenir, il détermine d'abord les forces dont la Lune est sollicitée par l'action du Soleil dans son mouvement relatif autour de la terre. En faisant ensuite abstraction de l'excentricité et de l'inclinaison de l'orbe lunaire, il cherche la variation de l'aire décrite par le rayon vecteur de la Lune, pendant l'élément de temps, supposé constant : il obtient la loi de cette variation depuis la syzygie jusqu'à la quadrature. Les carrés des vitesses de la Lune dans ces deux points sont, en négligeant le carré de la force perturbatrice, comme les carrés des aires instantanées, divisés respectivement par les carrés des rayons vecteurs. Les carrés des vitesses, divisés par les rayons de courbure, sont égaux aux forces centrifuges correspondantes. Aux deux points de la syzygie et de la quadrature, ces forces sont dirigées suivant les rayons vecteurs, et elles sont égales et contraires aux forces lunaires décomposées suivant la direction de ces rayons.

De là, Newton déduit le rapport des rayons de courbure aux mêmes points, en fonction des rayons vecteurs correspondans. Pour avoir un second rapport, Newton considère l'orbite de la Lune, comme une ellipse mobile dont la Terre occupe le centre, et dont le périgée suit le Soleil de manière que le petit axe de l'ellipse correspond toujours à la syzygie; et le grand axe, à la quadrature. Cette considération est exacte, mais elle exigeait une démonstration. C'est ainsi que Newton dans sa théorie de la figure de la Terre, a supposé sans démonstration, que les méridiens sont elliptiques. Ces hypothèses de calcul fondées sur des aperçus vraisemblables sont permises aux inventeurs, dans des recherches aussi difficiles; mais étant liées mathématiquement au principe que l'on veut établir, on peut toujours craindre, tant que cette liaison n'est pas démontrée, qu'elles ne soient contradictoires à ce principe. Newton détermine par sa méthode des fluxions, les rayons de courbure de l'orbite de la Lune, lorsque cet astre parvient aux extrémités des axes de l'ellipse mobile; ce qui lui donne un second rapport de ces rayons, en fonction des axes et par conséquent des rayons vecteurs correspondans à la syzygie et à la quadrature. En égalant ce rapport, au précédent; il obtient le rapport des deux axes de l'ellipse,

qu'il trouve être celui de 69 à 70. Ce rapport donne le rayon vecteur de l'ellipse dans un point quelconque; en divisant donc l'expression de la variation instantanée de l'aire, par le carré de ce rayon, on a la différentielle de la longitude vraie de la Lune; et en intégrant, on obtient cette longitude et par conséquent l'inégalité de la variation.

Le procédé de Newton, quoique moins direct, conduit au même résultat qui lui donne l'inégalité de la variation, égale à 35' 10" sexagésimales dans son maximum; ce qui est à très peu près, conforme aux observations.

Cette méthode de Newton est fort ingénieuse; et l'on verra dans le chapitre suivant, qu'en la traduisant en analyse, elle conduit facilement aux équations différentielles du mouvement lunaire.

Newton considère ensuite le mouvement du nœud ascendant, et la variation de l'inclinaison de l'orbite lunaire. Pour cela, il décompose l'action perturbatrice du Soleil sur la Lune, en deux forces : l'une est dirigée vers le centre de la Terre, et par conséquent étant dans le plan de l'orbite, elle ne dérange point la position de ce plan : l'autre force est parallèle à la ligne menée du Soleil à la Terre, et dérange le plan de l'orbite. Newton la compose avec le mouvement de la Lune à la fin d'un instant, et faisant passer un plan par la résultante et par le centre de la Terre, il détermine la position de ce plan qui devient celui de l'orbite lunaire dans l'instant suivant. Il trouve ainsi le mouvement horaire du nœud, égal au produit d'un facteur à très peu près constant, par le mouvement horaire de la Lune, par le produit des sinus des deux angles qui expriment les distances du Soleil au nœud, et du nœud à la Lune, et par le cosinus de la distance de la Lune au Soleil. En changeant dans cette fonction, le mouvement horaire de la Lune, dans la différentielle de ce mouvement; en développant en cosinus simples, le produit des sinus et des cosinus, et ensuite en intégrant; on a facilement l'expression du moyen mouvement du nœud, et ses inégalités. Ce procédé n'était point au dessus de l'analyse connue de Newton; mais il ne l'a point donné, soit qu'alors on ne fût point familiarisé avec les développemens en sinus et cosinus simples, des produits de sinus et de cosinus, et avec l'intégration de leurs différentielles; soit que Newton s'étant proposé d'exposer toutes ses théories sous une forme synthétique, ait cherché les moyens d'y parvenir par la synthèse; soit enfin qu'ayant trouvé ses résultats par l'a-

nalyse, il les ait traduits synthétiquement; ce qu'il paraît avoir fait dans plusieurs cas. La manière dont il a déterminé le mouvement moyen du nœud, et son inégalité principale, quoique compliquée, est exacte et ingénieuse. Newton observe que dans le cours de chaque mois, le mouvement du nœud s'accélère et se ralentit de manière qu'il a rétrogradé à la fin du mois, d'une quantité dépendante seulement de sa distance au Soleil. Il parvient ainsi à séparer dans l'expression du mouvement horaire du nœud, ce qui est indépendant de la position de la Lune dans son orbite, de ce qui en dépend. Cette dernière partie ne devant produire que des inégalités dont la période est à peu près d'un demi-mois, et qui disparaissent de l'expression de la latitude, en se combinant avec les inégalités correspondantes de l'inclinaison; Newton la néglige et ne considère que la première partie du mouvement horaire du nœud. Il en conclut par des considérations géométriques et par la quadrature des courbes, le moyen mouvement annuel du nœud et son inégalité principale dont l'argument est le double de la distance du Soleil au nœud. Il obtient de la même manière l'inégalité principale de l'inclinaison, qu'il trouve conforme ainsi que l'inégalité du nœud, à celles que Ticho-Brahé avait déduites de ses

Tels sont les résultats dont Newton dans la première édition de son ouvrage des Principes, a donné les démonstrations auxquelles il n'a rien changé dans les éditions suivantes. Il y a seulement ajouté quelques équations qu'il dit avoir déduites de sa théorie de la gravité, mais sans en donner les démonstrations. De ce nombre est l'équation annuelle de la Lune, pour laquelle il se contente d'observer que l'orbe lunaire se dilate par l'action du Soleil dans son périhélie, et se contracte par la diminution de cette action dans l'aphélie; et que la Lune se mouvant avec plus de lenteur, dans un orbe plus dilaté; son mouvement doit retarder, lorsque le Soleil est plus près de la terre, et s'accélérer, lorsque cet astre est plus éloigné; d'où résulte dans le mouvement lunaire, une inégalité annuelle de signe contraire à celle du Soleil, et dont il trouve une valeur conforme aux observations. Newton donne encore sans démonstration, quelques autres inégalités. Mais l'analyse peut seule conduire à la détermination exacte de toutes les inégalités lunaires. Il fallait sans doute, une force d'esprit extraordinaire, pour obtenir sans son secours, les résultats auxquels Newton est

parvenu, et qui, quoique incomplets, suffisent pour établir que l'attraction du Soleil sur la Lune et sur la Terre, est la vraie cause de toutes les anomalies du mouvement de la Lune.

Un avantage immense de la théorie et des aperçus de Newton sur ce mouvement, a été la formation de nouvelles tables de la Lune, tables qui par l'application de l'analyse à cette théorie, ont acquis le haut degré de perfection nécessaire aux besoins de la Navigation et de la Géographie.

En 1747, Clairaut et d'Alembert présentèrent à l'Académie des Sciences, les équations différentielles du mouvement d'un corps attiré par deux autres, et leurs méthodes pour intégrer ces équations, lorsque la force principale qui sollicite le corps est fort supérieure aux forces perturbatrices, ce qui est le cas de la Lune et des planètes. Ces deux illustres géomètres firent une application spéciale de leurs analyses, au mouvement de la Lune; et ils en conclurent avec une grande facilité, non-seulement l'inégalité de la variation, que Newton avait obtenue d'une manière compliquée, quoique fort ingénieuse; mais encore l'évection qu'il avait tenté inutilement de rattacher à cette théorie, l'équation annuelle et beaucoup d'autres inégalités.

Dans le calcul des perturbations du mouvement de la Lune en longitude : Clairaut considère l'orbite comme située dans le plan de l'écliptique; il donne une expression élégante et simple du rayon vecteur de la Lune. La première partie de cette expression, indépendante de la force perturbatrice, est la valeur elliptique qui sans cette force subsisterait seule. L'autre partie dépend de cette force, et renferme deux intégrales qui ne peuvent être rigoureusement déterminées qu'autant que l'on connaît déjà le rayon vecteur. Mais on peut les avoir d'une manière approchée, en substituant pour ce rayon, sa partie elliptique. On obtient ainsi une valeur du rayon vecteur approchée aux quantités près de l'ordre du carré de la force perturbatrice. En substituant cette valeur, dans les intégrales; on a une seconde valeur du rayon vecteur approchée aux quantités près de l'ordre du cube de la force perturbatrice, et ainsi de suite. Mais ce procédé introduit dans l'expression de ce rayon, des arcs de cercles qui la rendraient bientôt inexacte. Pour obvier à cet inconvénient, Clairaut rapporte la partie elliptique du rayon vecteur, à un apogée mobile. En substituant alors cette partie dans les intégrales, il n'a plus d'arcs de cercle; mais la valeur qu'il trouve pour le

rayon vecteur contient un terme elliptique relatif à un apogée immobile. En déterminant convenablement les constantes introduites par le calcul, il fait disparaître ce terme; et en comparant la valeur du rayon vecteur qu'il trouve ainsi, avec celle qu'il a supposée, il obtient le mouvement de l'apogée. Une première approximation ne lui donna que la moitié du mouvement observé.

Newton était déjà parvenu à ce résultat singulier, dans la proposition 45 du premier livre des Principes; mais dans la théorie de la Lune qu'il a donnée dans le troisième livre, il n'a point rappelé ce résultat qui pouvait paraître infirmer cette théorie, et qui, en effet, porta Clairaut à penser qu'elle devait être modifiée, en ajoutant à la loi de l'attraction, un terme proportionnel à une puissance de la distance inverse, supérieure au carré, terme qui, insensible pour les planètes, ne deviendrait sensible qu'à des distances peu considérables, telles que la distance de la Lune. Cette conclusion de Clairaut fut vivement attaquée par Buffon qui se fondait sur ce que les lois primordiales de la nature, devant être de la plus grande simplicité; leur expression ne doit dépendre que d'un seul module, et par conséquent, ne renfermer qu'un terme. Cette considération doit nous porter sans doute, à ne compliquer la loi de l'attraction que dans un besoin extrême; mais l'ignorance où nous sommes de la nature de cette force, ne nous permet pas de prononcer avec assurance sur la simplicité de son expression. Quoi qu'il en soit, le métaphysicien eut raison vis-à-vis du géomètre qui reconnut son erreur, et fit la remarque importante, qu'en poussant plus loin l'approximation, la loi de l'attraction newtonienne donne à fort peu près le mouvement de l'apogée. Ce résultat dont Clairaut fit part à l'Académie, le 17 mai 1749, dissipa tous les doutes sur la loi de l'attraction qu'Euler trompé par une erreur de calcul avait jugée contraire aux observations de Saturne, dans sa première pièce sur les mouvemens de cette planète et de jupiter.

Clairaut réunit les divers résultats de sa théorie de la Lune, dans une pièce qui remporta le prix proposé en 1750 par l'Académie des Sciences de Pétersbourg. Cette pièce imprimée d'abord en 1752 dans cette capitale, fut réimprimée à Paris en 1765, avec des additions et de nouvelles tables de la Lune déjà fort rapprochées des observations, et qui faisaient naître l'espoir que l'on parviendrait un jour à déduire de la théorie seule, des tables aussi parfaites qu'on puisse les désirer.

D'Alembert dans sa théorie de la Lune, choisit pour coordonnées, le rayon vecteur lunaire projeté sur le plan de l'écliptique, et le mouvement vrai de la Lune rapporté à ce plan. Il donne l'équation différentielle du second ordre, du rayon vecteur projeté, dans laquelle l'élément de la longitude vraie est supposé constant et l'expression de l'élément du temps est fonction de cette longitude. Ces deux équations sont les mêmes que les deux premières des équations (L) du n° 1 du Livre VH. Au lieu de la troisième de ces équations, qui détermine la latitude, d'Alembert emploie, comme Newton, les variations différentielles du mouvement du nœud et de l'inclinaison de l'orbite. Pour intégrer l'équation différentielle du rayon vecteur projeté, il ne rapporte point, comme Clairant, la partie elliptique de l'expression de ce rayon, à un apogée mobile; mais il fait disparaître par un moven ingénieux, l'arc de cercle qu'introduirait la supposition d'un apogée immobile ; ce qui le conduit sans hypothèse, à la considération d'un apogée mobile. Une seconde approximation avant presque doublé le mouvement de l'apogée donné par la première, et par là, avant accordé la théorie avec l'observation; il était à craindre que les approximations suivantes ne détruisissent cet accord. Il devenait donc important de porter encore plus loin, ces approximations. C'est ce que d'Alembert a fait, et il a trouvé que la théorie se rapprochait ainsi de plus en plus de l'observation du l'indire sont multipli doi de l'observation de l'observati

Peu de mois avant que Clairaut et d'Alembert présentassent à l'A-cadémie des Sciences, leurs solutions du problème des trois corps; elle reçut la première pièce d'Euler sur Jupiter et Saturne, qui contient une solution du même problème, appliquée au mouvement de Saturne. Ce grand géomètre sit paraître cette solution dans les Mémoires de l'Académie de Pétersbourg pour les années 1747 et 1748, et dans les Mémoires de l'Académie de Berlin pour 1759; et il en déduisit le mouvement du nœud de l'orbite lunaire, et les inégalités de son inclinaison à l'écliptique. Il publia en 1753, un ouvrage spécial sur la théorie de la Lune, dans lequel il prend pour coordonnées du mouvement lunaire, le rayon vecteur projeté sur l'écliptique, l'anomalie vraie; et au lieu de la latitude, il considère comme Newton, le mouvement du nœud et l'inclinaison de l'orbite!

On peut varier la solution du problème des perturbations lunaires, d'autant de manières qu'il y a de systèmes différens de coordonnées.

MECAN CEL. Tome V.

47

Mais un des points les plus importans de cette solution, est le choix du système qui donne les approximations les plus faciles et les plus convergentes, et qui fait le mieux démêler dans le nombre infini des inégalités de la Lune, celles qui peuvent devenir sensibles, en acquérant par les intégrations successives, de petits diviseurs. Je ne balance point à regarder le système de coordonnées dont j'ai fait usage dans le Livre VII, comme le plus avantageux sous ces rapports. La force perturbatrice du mouvement lunaire, dépend des sinus et cosinus de son mouvement vrai et de son élongation au Soleil: leur réduction en sinus et cosinus d'angles dépendans du mouvement moyen de la Lune, est pénible et peu convergente à cause de la grandeur de son équation du centre et de ses principales inégalités. Il y a donc de l'avantage à éviter cette réduction, et à déterminer d'abord la longitude moyenne en fonction de la longitude vraie; ce qui peut être utile dans le cas où l'on cherche le temps correspondant à la longitude vraie. On détermine ensuite par le retour des séries, la longitude vraie, en fonction de la longitude moyenne; et l'on n'a point à craindre dans ce retour, le peu de convergence des approximations, que l'intégration des équations différentielles laisse toujours incertaine. A la vérité, il faut dans cette méthode, convertir le mouvement vrai du Soleil, en fonction de la longitude vraie de la Lune. Mais dans cette conversion, les grandes inégalités lunaires sont multipliées par le rapport du moyen mouvement du Soleil à celui de la Lune, ou par un treizième environ; ce qui les rend fort petites.

Mayer publia en 1753 dans les Mémoires de l'Académie de Gottingue, de nouvelles tables de la Lune: pour les former, après avoir reconnu par la théorie les argumens des diverses inégalités lunaires, il détermina leurs coefficiens par les observations. Il perfectionna ces tables et la théorie qui l'avait guidé; et il les adressa en 1755, au Bureau des Longitudes de Londres. Après sa mort arrivée en 1762, sa veuve envoya au même Bureau, une copie de ces tables encore perfectionnées; et Bradley les ayant comparées à beaucoup d'observations les trouva si exactes, qu'on leur adjugea un prix de trois milles livres sterlings. Elles ont été imprimées ainsi que la théorie de l'auteur, en 1765. Dans cette théorie, Mayer prend pour coordonnées de la Lune, son rayon vecteur, un angle dont la différentielle est proportionnelle à l'élément du temps, divisé par le carré du rayon vecteur; et la lati-

tude qu'il substitue au mouvement du nœud et à l'inclinaison de l'orbite; ce qui est plus direct et plus simple. Il a porté fort loin les approximations analytiques, et il a rectifié par les observations, les coefficiens déjà fort approchés par sa théorie, des diverses inégalités lunaires. Mason perfectionna ces tables, en les assujettissant à un très grand nombre d'observations de Bradley, et en leur ajoutant quelques inégalités indiquées par la théorie. La comparaison des observations avec ses tables lui donna une inégalité en longitude, proportionnelle au sinus de la longitude du nœud de l'orbite et dont il trouva le coefficient égal à 7",7 sexagésimales, inégalité que Mayer avait déjà reconnue, mais avec un coefficient plus petit et seulement de quatre secondes. Cette inégalité ne paraissant pas résulter de la théorie de l'attraction, fut négligée par les astronomes.

Les tables de Mayer rectifiées par Mason, ont servi pendant plusieurs années, au calcul des éphémérides destinées aux navigateurs. Mais elles laissaient à désirer des tables aussi parfaites, uniquement fondées sur la théorie. C'est ce qu'Euler tenta d'exécuter au moyen d'une nouvelle théorie de la Lune. Il y rapporte les coordonnées de la Lune, à un axe mu sur l'écliptique autour du centre de la Terre, d'un mouvement égal au moyen mouvement de la Lune; et il donne les équations différentielles des trois coordonnées orthogonales rapportées à cet axe mobile et au plan de l'écliptique. Il les intègre par des approximations convergentes, et il réduit en tables, leurs intégrales qui déterminent la position de la Lune à un instant quelconque. Mais ces tables étant moins commodes et moins précises que celles de Mason, les astronomes n'en ont point fait usage. Euler exposa sa nouvelle méthode dans deux pièces qu'il envoya à l'Académie des Sciences pour concourir aux prix qu'elle proposa sur la théorie de la Lune, en 1770 et en 1772 : ensuite il la développa dans un traité spécial fort étendu.

Lagrange envoya à l'Académie, pour le concours au prix de 1772, une pièce dans laquelle il considère le mouvement de la Lune, sous un point de vue purement analytique. Il imagine trois corps qui s'attirent mutuellement, en raison de leurs masses, et réciproquement au carré de leurs distances. Ces corps forment un triangle variable, mobile autour de leur centre commun de gravité. Il donne les équations différentielles de chaque côté de ce triangle, et il en déduit la solution rigoureuse du problème des trois corps dans quelques cas particuliers. J'ai

développé et généralisé ces résultats, dans le chapitre VII du Livre X par une méthode fort simple et indépendante de toute intégration.

Halley comparant entre elles, les observations anciennes d'éclipses, celles d'Albaténius, et les observations modernes, soupconna le premier, l'accélération du moyen mouvement de la Lune. Dunthorne, et Mayer ensuite, en confirmerent l'existence, par une comparaison plus étendue des observations. En supposant cette accélération proportionnelle au carré du temps; ils en fixèrent à 10" sexagésimales, environ, la quantité pour le premier siècle, à partir de 1700. L'Académie des Sciences toujours animée du désir de perfectionner la théorie de la Lune, proposa pour le sujet du prix de Mathématiques de 1774, la cause de cette équation séculaire. Elle couronna une pièce de Lagrange dans laquelle l'auteur détermine l'influence de la figure de la terre sur le mouvement de ce satellite : il prouve que son équation séculaire ne peut en résulter. Considérant ensuite que les géomètres avaient inutilement tenté de la déduire des attractions du Soleil et de la Terre supposés sphériques; il se crut d'autant plus fondé à la révoquer en doute, qu'il ne la jugea pas suffisamment établie par les observations. Mais son existence ne peut être contestée, surtout depuis la connaissance que M. Caussin nous a donnée des observations arabes, par sa traduction d'une partie de l'Astronomie d'Ibn-Jounis, manuscrit de la bibliothèque de Levde, que le Gouvernement Batave voulut bien confier à l'Institut de France.

L'Académie des Sciences ayant proposé pour le sujet du prix qu'elle devait décerner en 1762, la question de savoir si les planètes se meuvent dans un milieu dont la résistance produise quelque effet sensible sur leurs mouvemens; elle couronna une pièce de Bossut dans laquelle l'auteur établit que cette résistance doit être beaucoup plus sensible sur le moyen mouvement de la Lune, que sur celui des planètes; ce qui peut expliquer l'équation séculaire de la Lune. En réfléchissant sur la loi de l'attraction et sur la manière dont les géomètres l'avaient employée; j'observai qu'ils supposaient sa transmission d'un corps à l'autre, instantanée. Je recherchai alors les effets qui pourraient naître d'une transmission successive : je trouvai qu'elle devait produire une équation séculaire dans le mouvement de la Lune, et que pour satisfaire aux observations, la propagation de la force attractive de la Terre devait être huit millions de fois plus prompte que celle de la lumière.

Mais de nouvelles recherches sur cet important phénomène pure conduisirent enfin à sa véritable cause ob tieve elle up zing ub tojue el

En m'occupant de la théorie des satellites de Jupiter, je reconnus que la variation séculaire de l'excentricité de l'orbite de Jupiter devait produire des équations séculaires dans leurs monvemens moyens. Je m'empressai de transporter ce résultat à la Lune, et je trouvai que la variation séculaire de l'excentricité de l'orbe terrestre produit dans le moyen mouvement de la Lune, l'équation séculaire déterminée par les astronomes. Je trouvai de plus que la même cause produit dans les mouvemens du nœud et du périgée de l'orbite de la Lune, des équations séculaires. Je communiquai ces recherches à l'Académie des Sciences, le 19 novembre 1787 : elles parurent en 1788 dans le volume de cette Académie pour l'année 1786. Je les ai perfectionnées dans le Livre VII; et j'ai trouvé que les termes qui dépendent du carré de la force perturbatrice et qui doublent le mouvement du périgée lunaire déterminé par une première approximation, augmentent presque dans le même rapport, l'équation séculaire de ce mouvement; en sorte que l'équation séculaire de l'anomalie moyenne est au moins quadruple de celle du moyen mouvement. Une équation aussi grande et dont l'effet sur la longitude de la Lune apogée ou périgée, est la moitié de l'effet de l'équation séculaire du moyen mouvement, doit être fort sensible dans les observations anciennes comparées à celles des Arabes et aux observations modernes. C'est ce que je reconnus facilement; je trouvai même que les équations séculaires soit de la Lune, soit de son périgée, sont sensibles dans les moyens mouvemens de la Lune et du périgée, conclus par Hypparque et Ptolémée, des éclipses anciennes comparées avec elles-mêmes; en sorte que si l'on ne connaissait pas d'ailleurs l'époque où ces astronomes ont vécu, on pourrait la retrouver à un siècle ou deux près, par ces moyens mouvemens. J'ai reconnu ainsi, que les tables de la Lune rapportées de l'Inde par Legentil, loin de remonter, comme Bailli le pensait, à trois mille ans avant notre ère, sont moins anciennes que les tables de Ptolémée, que les tables de la publication de la publica

M. Bouvard a comparé avec ma théorie, toutes les observations anciennes et arabes, et un grand nombre d'observations modernes. Ce travail utile couronné en 1800 par l'Institut de France, ne laisse aucun doute sur l'existence des trois équations séculaires de la Lune et sur leur grandeur respective.

L'Académie royale des Sciences de Stockholm proposa en 1787, pour le sujet du prix qu'elle devait décerner en 1791, la cause des équations séculaires de la Lune, de Jupiter et de Saturne. Aucune pièce ne lui étant parvenue pour le concours; elle adjugea le prix à mes recherches qui depuis trois ans étaient publiées, et qui lui parurent contenir la solution complète de la question proposée. Ce prix décerné par une société savante aussi célèbre, me flatta d'autant plus, qu'il était inattendu.

La conformité de la théorie lunaire avec les observations, établit plusieurs points importans du système du monde. On voit d'abord que la résistance des milieux éthérés et la transmission successive de la gravité, n'ont point d'influence sensible sur les équations séculaires de la Lune; puisque l'attraction seule des corps célèstes suffit pour représenter les observations. D'ailleurs, l'équation séculaire du périgée, bien constatée par les observations, suffit pour exclure l'une et l'autre de ces causes; puisqu'elles ne produisent aucun mouvement dans le périgée. C'est ainsi que les phénomènes, en se développant, nous dévoilent leurs véritables causes. Nous sommes donc certains que les milieux éthérés, depuis les observations les plus anciennes, n'ont point sensiblement altéré les mouvemens des planètes; car leur résistance serait beaucoup plus sensible sur le mouvement de la Lune, où nous venons de voir qu'elle est insensible.

Nous avons dit que pour expliquer l'équation séculaire de la Lune au moyen de la transmission successive de la gravité, il fallait supposer la propagation de la force attractive, huit millions de fois plus prompte que celle de la lumière. Ainsi l'attraction des corps célestes représentant, au moins à très peu près, l'équation séculaire observée; nous pouvons en conclure que la vitesse de la force attractive surpasse cinquante millions de fois la vitesse de la lumière; on peut donc la supposer infinie.

La constance de la durée du jour, élément essentiel de toutes les théories astronomiques résulte encore des équations séculaires de la Lune. Si cette durée surpassait maintenant, d'un centième de seconde ceutésimale, celle du temps d'Hypparque; la durée du siècle actuel serait plus grande qu'alors, de 365″,25. Dans cet intervalle, la Lune décrit un are de 534″,6 centésimales. Le mouvement séculaire actuel de la Lune, en paraîtrait donc augmenté de cette quantité; ce qui, en supposant que cet accroissement ait été depuis Hypparque, propor-

royer Poisson Bullet. Philom. J. 6 Part. 2° p. 100 tionnel au temps, augmenterait de 13",51 centésimales, son équation séculaire pour le premier siècle à partir du commencement de 1801, et dont la valeur résultante des attractions célestes est d'environ 32". Les observations ne permettent pas de supposer un accroissement aussi considérable. Il est donc certain que depuis Hypparque, la durée du jour n'a pas varié d'un centième de seconde. Si par des causes quelconques inconnues, cette durée éprouvait quelque altération sensible; on le reconnaîtrait par le mouvement de la Lune dont les observations, d'ailleurs si utiles, acquièrent par cette considération, une nouvelle importance.

Le moyen mouvement du périgée lunaire conclu de la théorie par une longue suite d'approximations, s'accorde tellement avec le mouvement observé; qu'à une distance même très petite par rapport aux distances des planètes au Soleil, la loi de l'attraction réciproque au carré des distances, si elle n'est pas rigoureuse, doit être au moins extrêmement approchée.

Ma théorie de la Lune, exposée dans le Livre VII, se rapproche plus des observations, que celles qui l'avaient précédée. Elle renferme quelques inégalités nouvelles : telle est l'inégalité en latitude, dont l'argument est la longitude de la Lune. Cette inégalité et celle en longitude dont l'argument est la longitude du nœud, et que Mayer avait soupçonnée par les observations, dépendent de l'aplatissement de la Terre. Les comparaisons de leurs expressions analytiques avec un grand nombre d'observations, s'accordent à donner l'aplatissement  $\frac{1}{305}$ , le même à fort peu près, que les aplatissemens qui résultent des mesures des degrés et du pendule : mais il a sur eux, l'avantage d'être indépendant des attractions locales qui les modifient. En multipliant les observations lunaires propres à déterminer les inégalités dont il s'agit, on obtiendra l'aplatissement de la Terre avec une exactitude extrême.

Mayer avait déterminé la parallaxe solaire, en comparant aux observations, l'expression analytique de l'inégalité lunaire parallactique qui a pour facteur, cette parallaxe. J'ai mis un soin particulier à déterminer cette expression: en la comparant aux observations, elle donne la valeur de la parallaxe solaire qui résulte des passages de Vénus sur le Soleil, observés en 1761 et 1769. Une conséquence importante de cet accord, est que l'action du Soleil sur la Lune est à très peu près la même que son action sur la Terre, et que la différence, s'il y en a une, n'est pas la trois millionième partie de cette action.

Newton chercha par l'expérience, à reconnaître si la pesanteur terrestre imprime en temps égal, la même vitesse à tous les corps placés au même lieu, quelle que soit leur nature. Pour cela, il mit successivement des corps de même poids et de diverse nature, dans une même boîte fermée qui terminait un pendule, et il les y placa de manière que le centre d'oscillation fût toujours le même. En faisant osciller le pendule, il observa la durée de ses oscillations, et il trouva cette durée la même pour tous ces corps; ce qui lui fit voir que l'action de la pesanteur donne à tous les corps, une vitesse égale dans le même temps, ou du moins que la différence, s'il y en a une, est au-dessous d'un millième. Ces expériences de Newton ont été répétées par divers physiciens; et les nombreuses expériences faites pour déterminer la longueur du pendule à secondes, ont établi avec une grande précision, que cette durée est indépendante de la nature du corps oscillant. En appellant donc masses égales, des masses qui se choquant avec des vitesses égales et contraires se feraient équilibre ; deux corps de même poids, ou qui placés aux extrémités de deux bras égaux d'un levier droit se font équilibre, ont des masses égales; puisque la pesanteur tend à leur imprimer la même vitesse initiale.

En comparant le sinus verse de l'arc décrit par la Lune dans une seconde, avec l'espace que la pesanteur fait décrire aux corps terrestres dans la première seconde de leur chute; Newton reconnut que la pesanteur à la surface de la Terre, diminuée en raison du carré de la distance, est la force qui retient la Lune dans son orbite. La parallaxe lunaire que j'ai conclue de ce principe, s'accorde si bien avec la parallaxe observée; que l'on peut regarder comme nulle, on du moins, comme insensible, la modification de l'action de la Terre sur la Lune, par la nature de la substance lunaire. On peut conclure également de cet accord, que l'action de la Terre sur chaque molécule de la Lune, n'est point altérée par l'interposition des couches lunaires; car il est facile de prouver qu'une légère altération de ce genre, modificrait sensiblement le principe dont je viens de parler.

Newton étendit à l'attraction de tous les astres, la propriété dont jouit l'attraction terrestre, d'imprimer à tous les corps placés à la même distance, la même vitesse en temps égal. Il démontra que relativement à l'attraction du Soleil sur les planètes, cette propriété résulte de la loi de Kepler suivant laquelle les carrés des temps des

révolutions des planètes sont comme les cubes de leurs moyennes distances au Soleil. Il est facile, en effet, de voir que si les actions du Soleil sur la Terre et sur Mars différaient d'un millième; le rayon vecteur des Tables de Mars, en serait altéré d'un trois millième; ce qui serait très sensible dans les observations de cette planète en quadrature.

On verra dans la suite, qu'une différence d'un millionième, dans les actions du Soleil sur la Terre et sur la Lune, changerait de plusieurs secondes, la parallaxe du Soleil, conclue de la comparaison de l'inégalité parallactique lunaire observée, avec sa valeur donnée par la théorie, et qui, comme je l'ai dit, s'accorde parfaitement avec les observations. Il est donc bien prouvé que l'attraction du Soleil imprimerait en temps égal, la même vitesse à la Terre et à la Lune, placées à la même distance de cet astre. Cette attraction n'est donc point modifiée par la nature des substances qui composent la Terre et la Lune. Si en pénétrant dans l'intérieur de ces corps, elle s'affaiblissait et s'éteignait comme la lumière en traversant l'atmosphère; cette extinction serait différente pour la Terre et pour la Lune, en vertu de la différence de leurs dimensions. Je trouve par un calcul fort simple, qu'une très petite extinction de l'attraction solaire produirait une différence sensible et inadmissible dans la valeur de l'inégalité parallactique. Ainsi l'interposition des corps n'altère point l'attraction d'une molécule sur une autre; ce qui confirme ce que nous venons de dire sur cet objet.

Enfin, M. Bouvard ayant formé des tables très exactes de Jupiter et de Saturne, fondées sur la théorie que j'ai donnée de ces planètes, et les ayant comparées à un très grand nombre d'observations, a formé des équations de condition dans lesquelles il a pris pour indéterminées, les corrections des élémens elliptiques et des masses de Jupiter et de Saturne. Il en a conclu la masse de Jupiter, qu'il a retrouvée la même que Newton avait déterminée par les élongations des satellites de Jupiter, mesurées avec beaucoup de précision par Pound. Les grandes perturbations des mouvemens de Saturne et de Jupiter, prouvent donc que Jupiter agit sur Saturne, comme sur ses propres satellites. Ainsi la propriété d'attirer également tous les corps placés à la même distance appartient à chaque partie de la matière. Les doutes qu'on a élevés sur cette propriété fondamentale de la loi d'attraction, ne paraissent donc point fondés. Cette loi que les géomètres ont essayé de modi-

Mican cia Tome F

fier, soit par rapport à son décroissement quand la distance augmente, soit relativement à la propagation instantanée de la force attractive, soit enfin par rapport à la nature des corps, est telle que Newton l'a proposée, ou du moins, les phénomènes n'y font reconnaître aucune modification sensible.

La théorie de la Lune nous donne encore par ses deux inégalités dépendantes de l'aplatissement de la Terre, le moyen le plus précis d'avoir cet aplatissement. Ces inégalités étant le résultat de la tendance du centre de la Lune vers chaque molécule du sphéroïde terrestre, prouvent que les tendances des centres des corps célestes, les uns vers les autres, sont les résultantes des attractions réciproques de toutes leurs molécules.

Désirant de voir toute l'Astronomie fondée sur la seule loi de l'attraction, n'emprunter des observations, que les données indispensables; j'obtins de l'Académie des Sciences, qu'elle proposerait pour le sujet du prix de Mathématiques qu'elle devait décerner en 1820, la formation par la seule théorie, de tables lunaires aussi exactes que celles qui ont été construites par le concours de la théorie et des observations. Je désirais encore que mes résultats sur les inégalités séculaires de la Lune, fussent vérifiés et même perfectionnés par les géomètres. Ces vœux ont été remplis par les deux pièces que l'Académie a couronnées. L'une de M. Damoiseau, était accompagnée de tables lunaires qui comparées à un grand nombre d'observations, les ont représentées aussi bien que les meilleures tables employées par les astronomes. L'autre pièce dont MM. Carlini et Plana sont les auteurs, est surtout remarquable par l'étendue et par la justesse de l'approximation avec laquelle ils ont déterminé les équations séculaires, et spécialement celle du périgée qu'ils ont trouvée plus grande encore que suivant ma formule.

M. Burg, en comparant les moyens mouvemens de la Lune conclus des observations de Flamsteed, de Bradley et de Maskeline, remarqua des différences qui lui parurent indiquer une inégalité à longue période, Il me fit part de cette remarque d'après laquelle je reconnus que l'action solaire produit une inégalité proportionnelle au sinus de la longitude du périgée lunaire, plus deux fois celle du nœud, moins trois fois la longitude du périgée solaire, et dont la période est d'environ 180 ans. Son coefficient acquiert par l'intégration, un très petit diviseur; mais il a pour facteur, le produit de l'excentricité de

l'orbe lunaire, par le carré du sinus de son inclinaison à l'écliptique. par le cube de l'excentricité de l'orbe solaire et par la parallaxe du Soleil; il paraît donc devoir être très petit. Le grand nombre de termes dont il dépend, rend sa détermination par la théorie, presque impossible. M. Burg, en adoptant cette inégalité dans ses tables, détermina par les observations, son coefficient qu'il trouva d'environ 15" sexagésimales. J'ai reconnu ensuite que l'ellipticité du sphéroïde terrestre, produit une inégalité dont la période est à peu près la même que la précédente, et qui est proportionnelle au cosinus de la longitude du périgée lunaire plus deux fois celle du nœud, moins la longitude du périgée solaire. Mais le coefficient de cette inégalité paraît être aussi petit que celui de l'inégalité dont je viens de parler. Enfin. j'ai trouvé que s'il existe une différence entre les deux hémisphères terrestres, elle doit produire une inégalité lunaire proportionnelle au cosinus de la longitude du périgée de la Lune, plus deux fois celle du nœud. J'avais indiqué cette inégalité à M. Burkhardt qui l'a employée dans ses tables, après avoir déterminé son coefficient par les observations. Mais en soumettant cette inégalité à l'analyse, j'ai vu qu'elle est insensible. Si les observations futures confirment cette anomalie du mouvement lunaire, il sera temps alors d'en rechercher la cause.

m étaut le rapport du moyen moujement sidéral du Söleib, à celmi de la Lune, on du mois sidéral à duncés sidérales, vi est la loppitude, du Soleil, et v celle de la Lane dans direc qui rejient de Lane dans.

49-40

le gibe ide fres cep treste de l'entre selevicioner de percilexendu itesse movenne dern flere gafe a Penife de vitesse phispreera edan

#### FLIZA: In PAPAGUE enterstante CHAPITRE II. orbite. Elfs must platte the sove seed of the derive that the chemondu all

temps, he somme de tous les productes en fortemps decelconque, sera l'accroissement de vite sse, résultant de la force perpag-

## diculaire at rayon. Ed le fituliplant parci de on aura and quentities of man Sur la théorie lunaire de Newton. The decrite par le fayon vecten de la track pendent Pinstant dt.

2. Parmi les inégalités du mouvement de la Lune en longitude, Newton n'a développé que la variation. La méthode qu'il a suivie, me paraît être une des choses les plus remarquables de l'ouvrage des Principes. Je vais, en y appliquant l'analyse, montrer son analogie avec les méthodes actuelles, et faire voir qu'elle conduit aux équations différentielles du mouvement de la Lune, dont elle donne dans le cas de la variation les intégrales, d'une manière indirecte, mais très ingénieuse.

Newton considère d'abord l'aire décrite par le rayon vecteur de la Lune, et pour simplifier le calcul, il fait abstraction de l'excentricité de l'orbe lunaire, et de son inclinaison à l'écliptique. Il décompose l'action du Soleil sur la Lune, en deux forces, l'une parallèle au rayon vecteur de la Lune, l'autre parallele au rayon vecteur de la Terre. Newton observe que la première de ces forces ne produit aucun changement dans l'aire que le rayon vecteur de la Lune trace autour de la Terre. En retranchant ensuite de la seconde force, l'action du Soleil sur la Terre que l'on regarde ici comme immobile; il décompose la différence, en deux forces, l'une dirigée suivant le rayon de l'orbe lunaire, l'autre perpendiculaire à ce rayon. Cette dernière force est la seule qui fasse varier l'aire décrite par le rayon vecteur de la Lune. Newton trouve pour son expression ainsi la variation de cette aire es

# $3m^2 \cdot \sin(\upsilon' - \upsilon) \cdot \cos(\upsilon' - \upsilon)$

m étant le rapport du moyen mouvement sidéral du Soleil, à celui de la Lune, on du mois sidéral à l'année sidérale; v'est la longitude du Soleil, et lu celle de la Lune de La force qui retient la Lune dans

son orbite, est prise pour unité de force, ainsi que le rayon moyen de l'orbite lunaire est pris pour unité de distance; ce qui donne la vitesse moyenne de la lune égale à l'unité de vitesse; puisqu'en vertu des théorèmes d'Huygens sur la force centrifuge, la force centrale de la Lune est égale au carré de sa vitesse divisé par le rayon de son orbite. En multipliant l'expression précédente par l'élément dt du temps, la somme de tous les produits, correspondante à un temps quelconque, sera l'accroissement de vitesse, résultant de la force perpendiculaire au rayon. En le multipliant par 1/2 dv, on aura aux quantités près de l'ordre du carré des forces perturbatrices, l'accroissement de l'aire décrite par le rayon vecteur de la Lune, pendant l'instant dt. Newton détermine par un procédé particulier, la somme produit de dt, par la force i un el artism el moi tainne el artism el

Cette somme est à fort peu près l'intégrale de la différentielle

at she and el anab 3madu . sin (mu - v) . cos (mu - v) , word ab esteri

variation desvintégrales, d'une manière indirecte, mais très ingéniense. en substituant mu pour u', ce que l'on peut faire, quand on néglige l'excentricité de l'orbe terrestre; et en mettant du pour dt, la vitesse moyenne  $\frac{dv}{dt}$  étant prise pour unité. Cette intégrale prise depuis la quadrature où v-mv est un angle droit, est

observe que la prentêre (vin - v) 200 cem E produit aucun changethe elegant time Land a language of the land and the description of th

Cette expression multipliée par ‡ du, donne l'accroissement de l'aire dans des deux points, seront en ile regente de proposition de la participa de

lunaire, l'autre p ( $\sqrt{mx} - \sqrt{x}$ ) soo.  $\sqrt{x^2m}$  on  $\sqrt{x^2m}$  derbière force est la seule qui fasse varier  $\sqrt{(m-x)}$ 8 tie par  $\sqrt{(m-x)}$ 8 etter de la Lune.

ainsi la variation de cette aire est appending nos que que que de la primer

. . 00

points; les forces centrales seront par les théorèmes d'Huygens sur la 3m2dv. cos (2v — 2mv) el sueb egulirineo estol m étant le rapport du meyen mouvement sidéral du Soleil, à celui

Cette variation est nulle dans les octans où par consequent, l'aire instantanée a sa valeur moyenne : en prenant pour unité cette valeur,

la valeur de l'aire instantanée sera dans les autres points de l'orbite,

al annobising so constant 
$$3m^2$$
 being any sing the standard of about the standard of the sta

La valeur de l'aire instantanée est donc à sa valeur moyenne comme

et à cause de  $m^2$  égal à  $\frac{1}{178,7}$ , comme

ce qui est le résultat de Newton. Daniel son moyar el son elle

Le carré de la vitesse de la Lune autour de la Terre, est  $\frac{r^2dv^2+dr^2}{dt^2}$ , en représentant par r son rayon vecteur. Mais si l'on fait avec Newton, abstraction de l'excentricité de l'orbite; dra devient de l'ordre du carré de la force perturbatrice, et peut ainsi être négligé; en sorte que l'on peut supposer le carré de cette vitesse, égal à  $\frac{r^2dv^2}{dt^2}$ . Mais l'aire décrite par le rayon vecteur pendant l'instant dt, est  $\frac{1}{2}r^{2}dv$ . Le carré de cette aire divisé par  $dt^2$  est  $\frac{r^4dv^2}{4dt^2}$ ; il est donc le quart du carré de la vitesse multiplié par r2. Dans les syzygies et dans les quadratures, les carrés des aires instantanées sont, par ce qui précède, dans le rapport

$$1 + \frac{3m^2}{2(1-m)}$$
 à  $1 - \frac{3m^2}{2(1-m)}$ ;

en désignant donc par 1-x, le rayon vecteur r dans les syzygies, et par 1 + x, ce rayon vecteur dans les quadratures; les carrés des vitesses dans ces deux points, seront en négligeant le carré de x, dans le rapport de

$$1 + 2x + \frac{3m^2}{2(1-m)}$$
  $\frac{3m^2}{2(1-m)}$ 

Soient R et R' les rayons vecteurs de l'orbite lunaire dans ces deux points; les forces centrales seront par les théorèmes d'Huygens sur la force centrifuge, dans le rapport de

Si l'on nomme k la somme des masses de la Terre et de la Lune, il est facile de voir que la force centrale dans les syzygies, est

$$k(1+2x)-2m^{a};$$

et qu'elle est dans les quadratures

$$k(1-2x)+m^2;$$

ces deux forces sont donc dans le rapport de

$$1 + 2x - \frac{2m^2}{k} \quad \text{a} \quad 1 - 2x + \frac{m^2}{k}.$$

k serait l'unité, sans la force perturbatrice, puisqu'il serait alors égal au carré de la vitesse, divisé par le rayon; k ne diffère donc de l'unité, que de quantités de l'ordre m²; ainsi sans rechercher cette différence, nous pouvons en négligeant le carré de la force perturbatrice, supposer les deux forces précédentes, dans le rapport de

En égalant le rapport de ces forces, à celui que nous avons donné cidessus, on aura

carries des aires institution 
$$(\frac{n^2}{m-1}+1)^{s}$$
  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  des des aires institutes  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  des des aires institutes  $\frac{1}{2}$ 

Pour déterminer x, Newton considère l'orbe lunaire, comme une ellipse dont la Terre occupe le centre, et qui se meut d'un mouvement angulaire égal au mouvement apparent du Soleil, en sorte que son périgée soit constamment au-dessous de cet astre. Dans une pareille ellipse, si l'on prend avec Newton, pour unité de distance, le rayon vecteur dans les octans; ce rayon dans un point quelconque de l'orbite sera

$$1 - x \cdot \cos 2(v - mv)$$
.

Newton en conclut que la courbure in dans les syzygies, est à la cour-

bure  $\frac{\tau}{R'}$  dans les quadratures, dans le rapport de

$$1 - 3x + (1 + x) \cdot \underbrace{[1 - (1 - m)^2]}_{(1 - m)^2} \stackrel{\text{def}}{=} \underbrace{[1 - (1 - m)^2]}_{(1 - m)^2};$$

The small of the season self-among at A amount not is 
$$\frac{R'}{R} = 1 - 2x \left[4(1-m)^2 - 1\right] \ln p \text{ not an another.}$$

En égalant cette valeur de  $\frac{R'}{R}$ , à la précédente, on a

$$x = \frac{\frac{3m^2}{2}\left(1 + \frac{1}{1 - m}\right)}{\frac{4}{1}(1 - m)^2 - 1}.$$

Cette expression de x, réduite en nombres, donne 69 pour le rapport du petit axe au grand axe de l'ellipse supposée par Newton.

La valeur de x peut être conclue de la seule considération des syzygies. En effet, le carré de la vitesse divisé par le rayon de courbure, est dans les syzygies, par ce qui précède

$$\frac{1+2x+\frac{3m^2}{2(1-m)}}{R}.$$

En l'égalant à la force centrale dans ces points, et qui comme on l'a vu, est

$$k(1+2x)-2m^2;$$

on aura

$$\frac{1}{R} = k \left( 1 - \frac{3m^2}{2(1-m)} \right) - 2m^4.$$

On trouve, suivant le procédé de Newton, pour déterminer la courbure de l'orbite dans les syzygies,

$$\frac{1}{R} = 1 - x \left[ 4(1-m)^2 - 1 \right].$$

Pour déterminer k, on doit observer que Newton a pris pour unité, le rayon vecteur de l'orbite, dans les octans. Or on trouve facilement qu'alors, dans ces points, le rayon de courbure et le carré de la vitesse sont égaux à l'unité, et que la force centrale dirigée vers le centre de courbure, est  $k - \frac{1}{2} m^2$ ; on a donc par les théorèmes d'Huygens

ce qui donne 
$$x$$
  $(x-1)+k = \frac{1}{1}+\frac{1}{2}\frac{(xx+1)-x}{2}$   $(x+1)+x = x$ 

La première expression de  $\frac{1}{R}$  devient ainsi

where 
$$\frac{1}{R} = 1 - \frac{3}{4} m^4 \left(1 + \frac{1}{1 - m}\right)$$
.

En l'égalant à la seconde; on a, comme ci-dessus,

$$x = \frac{\frac{3}{a}m^{a}\left(1 + \frac{1}{1 - m}\right)}{4(1 - m)^{2} - 1}.$$

Dans ce procédé, il faut déterminer k; ce que l'on évite en considérant à la fois, les syzygies et les quadratures.

Pour conclure de ces résultats, l'inégalité de la variation; Newton observe que dans une ellipse immobile où les aires tracées par le rayon vecteur partant du centre seraient proportionnelles aux temps, la tangente du mouvement vrai compté de l'extrémité du grand axe, serait à la tangente du mouvement moyen, comme le petit axe est au grand axe, ou comme 1-x est à 1+x. Ensuite, pour avoir égard à l'accroissement de l'aire depuis la quadrature jusqu'à la syzygie, Newton multiplie la tangente du mouvement vrai, par le rapport de la racine carrée de l'aire instantanée dans la quadrature à la racine carrée de l'aire instantanée dans la syzygie, rapport qui, par ce qui précède, est  $_{\rm I} = \frac{3m^2}{4({\rm i}-m)}$ . Ainsi la tangente du mouvement vrai, est à très peu près égale au produit de la tangente du mouvement moyen, par  $1-2x-\frac{3m^2}{4(1-m)}$ . Dans les octans ou le mouvement vrai est en degrés sexagésimaux égal à 45°, Newton trouve en substituant pour xet pour m, les valeurs qu'il a déterminées, le mouvement vrai de la Lune égal à 44° 27' 28": eù le soustrayant de 45°, la différence 32' 32" est la valeur du coefficient de l'inégalité de la variation. Mais Newton observe qu'en vertu du mouvement apparent du Soleil, le mouvement lunaire de la quadrature à la syzygie, au lieu d'être 90°, est agrandi dans le rapport de la durée du mois synodique, à la durée du mois sidéral; ce qui revient à diviser 90° par 1 - m. Il en conclut que tous les angles autour de la Terre, et par conséquent l'inégalité de la variation, doivent être augmentés dans le même rapport; ce qui porte cette inégalité à 35'10". MEGAN CEL Tome F

Pour avoir l'expression analytique de l'inégalité de la variation, qui résulte du procédé de Newton, nommons du cette inégalité. Nous aurons

tang 
$$(v + \delta v) = \left(1 - 2x - \frac{3m^2}{4(1-m)}\right) \tan v$$
,

υ étant le moyen mouvement de la Lune compté de la quadrature. Cela donne en négligeant le carré de δυ

$$\frac{\delta v}{\cos^2 v} = -\left(2x + \frac{3m^2}{4(1-m)}\right) \cdot \frac{\sin v}{\cos v}$$

ou

$$\delta v = -\frac{1}{2} \left( 2x + \frac{3m^2}{4(1-m)} \right) \cdot \sin 2v.$$

Il faut, suivant Newton, substituer dans cette expression, v - mv au lieu de v et la diviser par 1 - m; ce qui donne

$$\delta v = -\frac{\left(2x + \frac{3m^2}{4(1-m)}\right) \cdot \sin(2v - 2mv)}{2(1-m)}$$

Si l'on fait partir l'angle v - mv de la syzygie; il faut l'augmenter de  $90^{\circ}$ ; ce qui revient à changer le signe de sin (2v - 2mv).

On peut obtenir cette expression plus simplement, de la manière suivante. On a par ce qui précède

$$r^2$$
.  $d(v + \delta v) = dv \left[ 1 + \frac{3m^2 \cdot \cos(2v - 2mv)}{4(1-m)} \right]$ .

Substituant pour r, sa valeur  $1 - x \cdot \cos 2(v - mv)$ , on aura

$$d\delta v = \left(2x + \frac{3m^2}{4(1-m)}\right) \cdot \cos\left(2v - 2mv\right)$$

d'où l'on tire en intégrant

$$\delta v = \frac{\left(2x + \frac{3m^2}{4(1-m)}\right)}{2(1-m)} \sin\left(2v - rmv\right);$$

ici l'angle v — mu est compté de la syzygie.

Généralisons maintenant, la méthode de Newton. Pour cela repre-Mécan. cel. Tome V. 50 nons l'expression de Q du n° 1, du Livre VII. Cette expression donne  $\frac{1}{r} \cdot \left(\frac{dQ}{ds}\right)$ , pour la force qui anime la Lune, décomposée perpendiculairement au rayon r; et  $-\left(\frac{dQ}{dr}\right)$  pour cette force décomposée suivant ce rayon et dirigée vers la Terre. La force  $\frac{1}{r} \cdot \left(\frac{dQ}{ds}\right)$ , multipliée par l'instant dt donne l'accroissement de vitesse pendant l'instant dt, perpendiculairement au rayon : cet accroissement multiplié par dt et par  $\frac{1}{2}r$ , donne  $\frac{1}{2}\left(\frac{dQ}{ds}\right)dt$  pour l'accroissement de l'aire instantanée  $\frac{1}{2}r^2ds$ , dt étant supposé constant; on a donc

$$\frac{d \cdot r^2 ds}{dt} = \left(\frac{dQ}{ds}\right) \cdot dt.$$

En multipliant les deux membres de cette équation par  $\frac{r^2dv}{dt}$ , et intégrant, on aura

$$(r^2dv)^2 = h^2dt^2\left[1 + \frac{2}{h^2} \cdot \int \left(\frac{dQ}{dv}\right) \cdot r^2dv\right].$$

h étant une constante arbitraire; d'où l'on tire, en faisant  $\frac{1}{r} = u$ ,

$$dt = \frac{dv}{hu^{a} \cdot \sqrt{1 + \frac{2}{h^{a}} \cdot \int \left(\frac{dQ}{dv}\right) \cdot \frac{dv}{u^{a}}}};$$

ce qui est la première des équations (L) du nº 1 du Livre VII.

Si l'on nomme ds l'élément de la courbe décrite par la Lune,  $\frac{ds^2}{dt^2}$  sera le carré de sa vitesse : en substituant pour dt sa valeur précédente, on aura pour ce carré

held ob enem no 
$$h^2u^4 \cdot \frac{ds^2}{dv^2} \cdot \left[1 + \frac{2}{h^2} \cdot \int \left(\frac{dQ}{dv}\right) \cdot \frac{dv}{u^2}\right]$$
.

Soit R le rayon osculateur de l'orbite; les formules connues du rayon de courbure donnent en supposant du constant,

Pour déterminer la varigion (ubb) ads qui en résulte. Newton fait passer un plan par l'élèment (
$$\frac{v_0}{v_0}$$
) ads qui en résulte passer un plan par l'élèment ( $\frac{v_0}{v_0}$ ) ads qui en résulte par le par

ainsi le carré de la vitesse divisé par le rayon de courbure est

$$u \frac{d^{v}}{ds} \cdot h^{2} \cdot \left[ \left( \frac{ddu}{dv^{2}} \right) + u \right] \cdot \left[ \mathbf{1} + \frac{2}{h^{2}} \cdot \int \left( \frac{dQ}{dv} \right) \cdot \frac{dv}{u^{2}} \right].$$

Il faut par les théorèmes d'Huygens, égaler cette expression, à la force lunaire décomposée suivant le rayon de courbure et dirigée vers le centre de courbure. On a vu que la force lunaire se décompose en deux, l'une dirigée vers la Terre et égale à  $-\left(\frac{dQ}{dr}\right)$ , l'autre perpendiculaire à r et égale à  $\frac{1}{r}\left(\frac{dQ}{dv}\right)$ . Si l'on décompose la force  $-\left(\frac{dQ}{dr}\right)$  en deux, l'une parallèle à l'élément de la courbe, et l'autre dirigée vers le centre de courbure ; on aura pour celle-ci  $-\left(\frac{dQ}{dr}\right) \cdot \frac{rdv}{ds}$ , ou  $u\left(\frac{dQ}{du}\right) \cdot \frac{dv}{ds}$ . Pareillement la force  $\frac{1}{r}\left(\frac{dQ}{dv}\right)$  décomposée suivant le rayon de courbure sera  $-\frac{du}{uds} \cdot \left(\frac{dQ}{dv}\right)$ . En réunissant ces deux forces dirigées vers le centre de courbure, on aura pour la force lunaire dirigée vers ce point

$$u \cdot \frac{dv}{ds} \left( \frac{dQ}{du} \right) - \frac{du}{uds} \left( \frac{dQ}{dv} \right);$$

en l'égalant au carré de la vitesse divisé par le rayon de courbure, on aura

$$0 = \left(\frac{ddu}{dv^2} + u\right) \left[1 + \frac{2}{h^2} \cdot \int \left(\frac{dQ}{dv}\right) \cdot \frac{dv}{u^2}\right] - \frac{1}{h^2} \left(\frac{dQ}{du}\right) + \frac{du}{h^2 u^2 dv} \cdot \left(\frac{dQ}{dv}\right);$$

équation qui coïncide avec la seconde des équations (L) du n° 1 du Livre VII, lorsqu'on néglige l'inclinaison de l'orbite lunaire.

3. Newton considère ensuite le mouvement des nœuds de l'orbe lunaire, et la variation de son inclinaison à l'écliptique. Après avoir décomposé l'action du Soleil sur la Lune, en deux, l'une dirigée suivant le rayon de l'orbe lunaire, l'autre parallèle au rayon mené du Soleil à la Terre; il retranche de celle-ci, l'action du Soleil sur la Terre, et il observe que leur différence est la seule force qui puisse altérer la position du plan de l'orbite lunaire, comme n'étant pas dans ce plan. Pour déterminer la variation des nœuds qui en résulte, Newton fait passer un plan par l'élément de l'arc que la Lune décrit dans un instant, et par le rayon lunaire de la dernière extrémité de cet élément.

Ce plan sera celui de l'orbite pendant cet instant : dans l'instant suivant, la différence des forces dont nous venons de parler, fera dévier la Lune, de ce plan. Si par l'extrémité du rayon lunaire, on mène une petite droite pour représenter cette différence ; en la composant avec la vitesse de la Lune dans le premier instant, on aura la direction de cette vitesse dans le second instant; et faisant passer un plan par le rayon lunaire et par cette direction, on aura le nouveau plan de l'orbite. Newton détermine ensuite la différence de position des nœuds de ces deux plans, et il trouve que le mouvement horaire du nœud ascendant est égal à par replication en que calquire en nouveau plan par le composition des nœud ascendant est égal à par replication en que calquire en nouveau plan nœud ascendant est égal à par replication en que calquire en nouveau plan nœud ascendant est égal à par replication en que calquire en nouveau plan nœud ascendant est égal à par replication en que calquire en nouveau plan nœud ascendant est égal à par replication en que calquire en nouveau plan nœud ascendant est égal à par replication en que le mouveau plan nœud ascendant est égal à par replication en que le mouveau plan nœud ascendant est égal à par replication en que le mouve en la composition des nœud ascendant est égal à par le composition des nœud est en la composition des nœud est en la composition de la compo

$$-3m^2v_1 \cdot \sin(v - N) \cdot \sin(mv - N) \cdot \cos(v - mv)$$

N étant la longitude du nœud, et v, étant le mouvement horaire de la Lune. En désignant donc par N, le mouvement horaire du nœud, on a

$$N_1 = -3m^2v_1 \cdot \sin(v - N) \cdot \sin(mv - N) \cdot \cos(v - mv)$$
.

Dans l'état actuel de l'analyse, on réduit le produit de ces sinus et cosinus, en cosinus simples; ce qui donne

$$N_1 = -\frac{3}{4}m^2 \cdot v_1 \cdot [1 + \cos(2v - 2mv) - \cos(2v - 2N) - \cos(2mv - 2N)].$$

En changeant ensuite N, et  $v_1$  en dN et  $dv_2$ , et désignant  $\frac{3}{4}m^2v_2$  par  $iv_2$ ; on aura à très peu près, en intégrant fra solution en  $iv_2$  par  $iv_2$ ; on aura à très peu près, en intégrant fra solution en  $iv_2$  par  $iv_2$  par

$$N = -\frac{3}{4} m^2 v - \frac{3 \cdot m^2}{8(1-m)} \cdot \sin(2v - 2mv) + \frac{3m^2}{8(1-i)} \cdot \sin(2v - 2N) + \frac{3m^2}{8(m-i)} \cdot \sin(2mv - 2N).$$

Ce procédé n'était point au-dessus de l'analyse connue de Newton; et s'il en eût fait usage, il aurait eu fort simplement l'inégalité annuelle du mouvement du nœud, que son petit diviseur rend très sensible, et qui par ce qui précède est

$$\frac{3m^2}{8(m-i)}$$
 .  $\sin{(2mv-2N)}$  .  $\sin{(mv-2N)}$ 

En substituent pour N, sa valeur précédente, dans l'expression de dN;

validation de ce plan. Si p; 
$$\frac{1}{(i-m)8}$$
 ou venons de parler, fera dévier la Lune, de ce plan. Si p;  $\frac{1}{(i-m)8}$  ou  $\frac{3}{4}$  rayon lunaire, on mêne

en sorte que le moyen mouvement du nœud seral al ab acceptiv al save

expression exacte aux quantités près de l'ordre m4.

Newton, au lieu de décomposer l'expression du mouvement horaire en cosinus simples, pour ne considérer que l'inégalité indépendante du mouvement de la Lune, emploie un procédé qui revient au même. Il observe que dans le cours de chaque mois, le mouvement du nœud s'accélère et retarde; et que de là résulte un mouvement horaire mé-

ce qui donne

$$N_1 \!=\! -\tfrac{3}{4} \, m^2 \upsilon_1 \big[ 1 - \cos \left( 2m\upsilon - 2N \right) \big], \label{eq:N1}$$

N, étant ici le mouvement horaire médiocre. Cette expression de N, revient à négliger dans la précédente, les termes dont la période est d'environ un mois. Newton néglige en effet, les inégalités de ce genre; parce qu'elles disparaissent de l'expression de la latitude, en se combinant avec les inégalités semblables de l'inclinaison de l'orbite lunaire. En changeant  $N_1$  et  $v_1$  en dN et  $dv_2$ , on a

$$dN = -\frac{3}{2} m^2 dv \cdot \sin^2 (mv - N)$$
.

Supposons

(Kit was) ais 
$$mv = N = \varphi$$
, name vuon el onnob inpese

on aura

et a il en eut fait usage, il aurait en fort simplement l'in and farus no

$$d\mathbf{N} = -\frac{\frac{3}{2} m d\phi \cdot \sin^2 \phi}{1 + \frac{3}{2} m \cdot \sin^2 \phi} = -\frac{3}{2} m d\phi \cdot \sin^2 \phi + \frac{\frac{3}{2} m \cdot d\phi \cdot \sin^4 \phi}{\frac{2}{3m} + \sin^2 \phi}$$

En intégrant cette valeur de dN, depuis o nul, jusqu'à o égal à la circonference 27; on aura le mouvement moyen du nœud dans l'intervalle de deux retours consécutifs du Soleil au même nœud. L'intégrale de  $-\frac{3}{4}$   $md\phi$ .  $\sin^2 \phi$  est  $-\frac{3}{4}$  m. 277. Newton a déterminé l'inde l'expression précédente d'N, qui nen l'intégrant et negligeslerait

$$\frac{3}{2} \frac{m \cdot d\varphi \cdot \sin^2 \varphi}{3m} + \sin^2 \varphi$$

or are  $\frac{2}{3m} + \sin^2 \varphi$ 

or are  $\frac{2}{3m} + \sin^2 \varphi$ 

par la méthode des suites, qui donne pour cette intégrale

be brought up eller meller and 
$$(1-\frac{5m}{4})$$
. 27.

On a ainsi pour le mouvement moyen du nœud dans l'intervalle de deux retours consécutifs du Soleil au même nœud,

En exprimant cette quantité par — 2Fπ; il faut suivant Newton, pour avoir le mouvement sydéral du nœud, la multiplier par 1 , ce qui donne pour le moyen mouvement du nœud, ab mozismil

$$-\frac{3}{4}m^2v\left(1-\frac{3m}{8}+\frac{9m^2}{32}\right).$$

Newton ajoute à cette expression les termes de l'ordre m4, qui résultent de ce qu'en vertu de l'argument de la variation, le rayon vecteur de la Lune n'est pas constant, et son mouvement n'est pas uniforme. Il trouve qu'il en résulte dans le mouvemement du nœud, la quantite  $\frac{3}{4}m^av(2x+\frac{3}{4}m^a)$ ; or use the second of  $\frac{3}{4}m^av(2x+\frac{3}{4}m^a)$ ; or notation of the second of  $\frac{3}{4}m^av(2x+\frac{3}{4}m^a)$ ;

x désignant ce que nous lui avons fait désigner dans le n° précédent; ce qui donne le mouvement du nœud suivant Newton, égal à l'annue

mouvement horaire de l'inclinaison relatif a cette partie, 
$$\frac{15 \cdot m^2}{32} = \frac{15 \cdot m^2}{4} = \frac{15 \cdot m^2}{$$

L'expression de ce mouvement donnée dans le n° 13 du Livre VII, et qui a été vérifiée par divers géomètres, est aux quantités près de l'ordre m<sup>5</sup>, reque les deux autres inégalités dont la perior marche près peu près confession de mouvement du nœud via produisent autonomient du nœud via produisent du nœud via produisent

la différence de ces deux expressions est très petite dus la sast elas

Pour avoir l'inégalité du mouvement du nœud, Newton fait usage de l'expression précédente dN, qui en l'intégrant et négligeant les quantités de l'ordre m³, donne

wantites de l'ordre 
$$m^2$$
, donne  $m^2$ , de suite  $m^2$ , donne  $m^2$ , sin  $m^2$ ,  $m$ 

L'inégalité dépendante de sin 40 est insensible : celle qui dépend de sin 20 ou de sin (2mv — 2N), a été reconnue par Ticho. En réduisant en nombres, son coefficient; on a celui que Ticho a déduit de ses observations.

Newton détermine ensuite la variation horaire de l'inclinaison de l'orbite lunaire à l'écliptique, et il la trouve égale à

$$-3m^2\gamma \cdot v_1 \cdot \cos(v - N) \cdot \sin(mv - N) \cdot \cos(v - mv)$$
.

 $\gamma$  étant l'inclinaison de l'orbite. En changeant le mouvement horaire v, de la Lune en dv, en réduisant en sinus simples le produit des cosinus et du sinus, et en intégrant; on a pour la variation de l'inclinaison, cette expression fort approchée

$$\frac{3m^2\gamma \cdot \cos(2v-2mv)}{8(i-m)} + \frac{3m^2\gamma \cdot \cos(2v-2N)}{8(i-i)}$$

$$\frac{3m^2\gamma \cdot \cos(2v-2N)}{8(m-i)} + \frac{3m^2\gamma \cdot \cos(2mv-2N)}{8(m-i)};$$

γ étant l'inclinaison moyenne de l'orbite. Newton ne considère, comme il l'a fait pour le mouvement du nœud, que la partie de cette expression qui n'est relative qu'à la distance du Soleil au nœud : il trouve le mouvement horaire de l'inclinaison, relatif à cette partie, égal à

$$\frac{3m^2}{2}v_1\gamma \cdot \sin(mv - N) \cdot \cos(mv - N);$$

Il verme de ce monvement donnée dans le n° 13 du lavre VII d'où il conclut la principale inégalité de l'inclinaison et é vérification de la conclut la principale inégalité de l'inclinaison et é vérification de la conclut la principale inégalité de l'inclinaison et é vérification de la conclut la principale inégalité de l'inclinaison et é vérification de la conclut la principale inégalité de l'inclinaison et de la conclut la principale inégalité de l'inclinaison et de l'inclinaison et de la conclut la principale inégalité de l'inclinaison et de l'inclinaison et

Il observe que les deux autres inégalités dont la période est d'un mois à peu près, en se combinant avec les deux inégalités correspondantes du mouvement du nœud, ne produisent aucune inégalité sensible dans la latitude. En effet, si l'on nomme N et Sy les variations

du nœud et de l'inclinaison; la variation de la latitude sera

$$\delta \gamma \cdot \sin (\upsilon - N) - \gamma \delta N \cdot \cos (\upsilon - N)$$
.

En substituant pour  $\delta_{\gamma}$  et  $\delta_{N}$ , leurs termes périodiques trouvés cidessus, cette fonction devient

$$\frac{-3m^2}{8(m-i)} \cdot \sin(v-N) + \frac{3m^2}{8(m-i)} + \frac{1}{1-m} \cdot \sin(v-2mv+N).$$

Le premier de ces termes se confond avec la première équation de latitude : le second forme la seconde équation de la latitude, dont le coefficient est augmenté d'une quantité de l'ordre m³, par la considération des inégalités de l'inclinaison et du mouvement du nœud, dont a période est d'un mois à peu près.

estant l'inclinaison de l'orbite. En changeaut de mouvément horaire u, de la Lune en du, en réduisant en sinus simples de produit des cosinus et du sinus, et ca intégnant; on a pour la variation de l'inclinaison, cette expression fort approchée.

 $\frac{1}{8} \frac{(n-1)6}{8(m-i)} \frac{3(n-1)6}{8(m-i)} \frac{3(n-1)6}{8(m-i)}$ 

y etant l'inclinaisea moyenne de l'orbite. Newton ne considére, comme d'ila fait pour le mouvement du néaud, que la pirtié de cette expléssion qui u est relative qu'à la distance du Soleil au oucendez il trouve de mouvement horaire de Finclinaison, relatif à cette partié, étal à

 $\frac{3m^{\circ}}{2}v_{1}y$ , sin (mv-N),  $\cos{(mv-N)}$ ;

dou d'equalit la principale inégalité de directmens par Cart.

Il observe que les deux autres inégalités dont la periode est d'un mois à peu près, eu se combinant avec les deux inégalités correspondantes du mouvement de nœud, ne produisent aucune inégalité sencible dans la latitude un effot, si l'on nomme d'N et d'y des variations siblé dans la latitude un effot, si l'on nomme d'N et d'y des variations

reant les quantités de cet ordres & disparait de l'expression de r'du. Ces termes ne troublent donc point sensiblement, la proportionnalité des

#### artes dux temps. En prenant airsi bour traite alquistance ala movembe distance de la compose de la compose de la compose de la moven mouvement de la Lune, nous pourrons supposer redu chal à dt. Par le

nor du Seppleme Lan Praite de Micanique celeste. AR pentiene sup-Des inégalités lunaires à longues périodes, dépendantes de la figure non sphérique de la Terre. quetion (T) 800 to ferme in seconde equition de la latitude, de

de Singelier Chapter of cr ( the ) area a periode est d'un mois à peu près

De l'inégalité lunaire à longue période, dépendante de la différence des deux hémisphères terrestres. stances a son centre; on aura par le no 14 du Layre III, une expres-

sion pour V de cette forme 4. CETTE inégalité a pour argument, la longitude du périgée lunaire, plus deux fois la longitude du nœnd : sa période est d'environ 180 ans. Pour la déterminer, je vais reprendre la formule (T) du n° 46 du second Livre, en lui donnant cette forme Uo étant une fonction rationnelle et en

$$d. \delta v = \frac{2 \cdot d^2(r \delta r) - d(dr \delta r) + dt^4 \left[ 3 \int \delta \cdot d\mathbf{R} + 2 \delta \cdot r \left( \frac{d\mathbf{R}}{dr} \right) - \left( \frac{d\mathbf{R}}{dr} \right) \cdot \delta r \right]}{r^2 dv}; (T)$$

l'angle v étant rapporté à l'orbite lunaire. Je supposerai ici que la caractéristique d'se rapporte à la différence des deux hémisphères terrestres a son meridien à un meridien determine. En nierrestres acquisire de son meridien à un meridien determine.

On peut supposer dans cette formule, rodu proportionnel à l'élément dt du temps. Cette proportionnalité a lieu dans la théorie de la Lune, en ayant même égard aux termes de l'ordre m dans les expressions de r et de dv, m exprimant comme ci-dessus, le rapport du moyen mouvement du Soleil à celui de la Lune. Ces termes que l'intégration a réduits à l'ordre m, ont des argumens qui ne diffèrent de v, que de quantités de l'ordre m: tel est spécialement celui qui représente l'évection. Ils peuvent être considérés comme autant d'équations du centre; en sorte que si l'on désigne par mk cos q, le terme de l'expression de r; le terme correspondant de l'expression de du sera

aux quantités près de l'ordre m2, égal à - 2mk. cos q; ainsi, en négligeant les quantités de cet ordre, k disparaît de l'expression de radu. Ces termes ne troublent donc point sensiblement, la proportionnalité des aires aux temps. En prenant ainsi pour unité de distance, la moyenne distance de la Lune à la Terre, et pour mesure du temps t, le moyen mouvement de la Lune; nous pourrons supposer r²dv égal à dt. Par le n° 1 du Supplément au Traité de Mécanique céleste, &R peut être supposé nul relativement aux inégalités à longue période; et par rapport à ces inégalités, on peut évidemment négliger le terme 2d2 (rdr). L'équation (T) devient ainsi

$$d. \mathcal{S}_{0} = -\frac{d(dr\delta r)}{dt} + dt \left[ 2 \mathcal{S} \cdot r \left( \frac{dR}{dr} \right) - \left( \frac{dR}{dr} \right) \cdot \mathcal{S}_{r} \right]. \quad (a)$$

Il faut maintenant déterminer la valeur de R. Si l'on nomme V la somme de toutes les molécules de la Terre, divisées par leurs distances à son centre; on aura par le n° 14 du Livre III, une expression pour V de cette forme

Tétant la masse du sphéroïde terrestre, D, son rayon moyen; et U(1) étant une fonction rationnelle et entière de \( \mu \) et de \( \varphi \), telle que

l'on ait  $0 = \left\{ \frac{d\left[ (1 - \mu^2) \cdot \left( \frac{dU^0}{d\mu} \right) \right]}{d\mu} \right\} + \left( \frac{dd\nabla^0}{d\varpi^2} \right) + i \cdot i + 1 \cdot U^0;$ at any isi is escapate of several states a stronger that a signal of the stronger than the stronger th

μ étant le sinus de la déclinaison de la Lune, et σ étant la distance angulaire de son méridien à un méridien déterminé. En négligeant, comme on peut le faire ici, les sinus et cosinus d'angles dépendans de 

MECAN. CEL. Tome V

Le terme divisé par r4 dans l'expression de V dépend de la différence des deux hémisphères terrestres. Il prend par le nº 46 du Livre II, un signe contraire dans l'expression de R où il devient de v, que de quantités de l'ordre m: tel est spécialement ceiM1 qui

représente l'évection 
$$l(u, \frac{\varepsilon}{2} - \varepsilon u)$$
 et  $l(u, \frac{\varepsilon}{2} - \varepsilon u)$  et  $l(u, \frac{\varepsilon}{2} - \varepsilon u)$ 

En désignant par s la tangente de la latitude de la Lune; par fu sa

longitude vraie rapportée à l'écliptique et comptée de l'équinoxe mobile du printemps, et par  $\lambda$  l'obliquité de l'écliptique; on a

$$\mu = \frac{\sin \lambda \cdot \sin f v + s \cdot \cos \lambda}{(1 + s^2)^{\frac{1}{2}}};$$

ce qui produit dans la fonction  $\mu^3 - \frac{3}{5}\mu$ , le terme

$$-\sin^3 \cdot \lambda \cdot \sin 3f v$$

$$4(1+s^2)^{\frac{3}{2}}$$

C'est le seul terme de cette fonction, auquel nous devions avoir égard ici. En faisant donc

$$k = \frac{\mathbf{H}^{(3)}.\,\mathbf{D}^3.\sin^3\lambda}{4};$$

on aura dans l'expression de R, le terme

$$\frac{k \cdot \sin 3f_0}{(1+s^2)^{\frac{3}{2}} \cdot r^4}$$

On peut observer ici que f'est extrêmement près de l'unité, et qu'il n'en diffère qu'à raison de la précession des équinoxes dont le mouvement est très lent par rapport à v.

Pour avoir l'expression de R, il faut y ajouter ce qui dépend de l'action du Soleil, et l'on verra facilement en rapprochant l'expression de R du n° 46 du Livre II, de l'expression Q des n° 1 et 3 du Livre VII, que cette partie de R est la fonction

les angles v et mv étant ici, rapportés à l'écliptique. En la désignant par  $r^2Q'$ , la partie de R que nous devons considérer dans la question présente sera

$$r^{2}Q' + \frac{k \cdot \sin 3f_{0}}{(1+s^{2})^{\frac{3}{2}} \cdot r^{\frac{1}{2}}}$$

On aura ainsi

$$2r\left(\frac{dR}{dr}\right) = 4r^{a}Q' \frac{8 \cdot k \cdot \sin 3fb}{\left(1 + s^{a}\right)^{3}} = 3$$

La caractéristique ne portant ici, que sur les termes multipliés par k, 51..

si l'on néglige le carré de k; on aura que la soltoquer sient solutional

2. 
$$\delta \cdot r \left(\frac{d\mathbf{R}}{dr}\right) = 4 \cdot \delta \cdot r^2 \mathbf{Q}' \frac{8k \cdot \sin 3f_0}{(1+s^2)^{\frac{3}{4}} \cdot r^4}$$

Mais en n'ayant égard qu'aux inégalités à longues périodes on peut, comme on l'a dit, supposer JR nul; ce qui donne

$$\delta . r^{2}Q' = -\frac{k . \sin 3fv}{(1+s^{2})^{\frac{3}{2}}.r^{4}};$$

on a done

$$2\delta \cdot r\left(\frac{dR}{dr}\right) = -\frac{12k \cdot \sin 3fv}{(1+s^2)^{\frac{3}{2}} \cdot r^4};$$

la formule précédente (a) devient ainsi

$$d. \delta v = -\frac{d(dr \delta r)}{dt} - dt \left[ \frac{12 \cdot k. \sin 3fv}{(1+s^2)^{\frac{3}{2}} \cdot r^4} + 2Q' \cdot r \delta r \right].$$

Il faut maintenant déterminer ror. Pour cela je reprends les équations (L) du n° 1° du Livre VII. En adoptant les dénominations du même Livre, la différence des deux hémisphères terrestres ajoute à la valeur de Q du numéro cité, le terme

r étant égal à  $\frac{\sqrt{1+s^2}}{u}$ . Ne considérons ici que cette partie de Q; on aura

aura.

The angles 
$$v$$
 et  $mv$  elges  $v^2v^2$   $v^3v^2$   $v$ 

On a par le nº 4 du Livre VII

$$u = \frac{1}{h^{2}(1+\gamma^{2})} \left[ \sqrt{1+s^{2}} + e \cdot \cos(cv - \omega) \right];$$

$$s = \gamma \cdot \sin(gv - \theta);$$

négligeant donc les termes qui doivent rester insensibles après les

intégrations, on aura el vab , u els obtes de ches de ches de l'est en en est de

$$2\int \left(\frac{dQ}{dv}\right) \cdot \frac{dv}{h^{2}u^{2}} = -\frac{2k}{h^{6}} \begin{cases} \sin \cdot 3fv \\ +\frac{15\gamma^{2}}{8} \cdot \frac{\sin (3fv - 2gv + 2\theta)}{3f - 2g} \\ +\frac{9}{4} \cdot \frac{e\gamma^{2} \cdot \sin (3fv - 2gv - cv + 2\theta + \varpi)}{3f - 2g - c} \end{cases}.$$

En substituant pour u sa valeur approchée

$$\frac{1}{h^2(1+\gamma^2)}\left[1+\frac{1}{4}\gamma^2-\frac{1}{4}\gamma^2\cdot\cos\left(2gv-2\theta\right)\right],$$

le terme

$$\left[\left(\frac{ddu}{dv^2}\right) + u\right] \cdot 2 \int \left(\frac{dQ}{dv}\right) \cdot \frac{dv}{k^2 u^2}$$

de la seconde des équations (L) du nº 1, donnera ceux-ci

$$-\frac{k}{h^8} \left\{ \begin{array}{l} \frac{9}{2} \gamma^2 \cdot \sin \left( 3fv - 2gv + 2\theta \right) \\ + \frac{9}{2} e \gamma^2 \cdot \sin \left( 3fv - 2gv - cv + 2\theta + \varpi \right) \end{array} \right\};$$

con trouve de plus un la continue que différent de continue sur la continue de plus un la c

el anab 
$$\lim_{h^2u^2} \frac{du}{dv} \left( \frac{dQ}{dv} \right) = \frac{3k\gamma^2}{4h^8} \cdot \sin(3fv - 2gv + 2\theta);$$

$$-\frac{1}{h^2} \left( \frac{dQ}{du} \right) - \frac{s}{h^2u} \cdot \left( \frac{dQ}{ds} \right) = \frac{15k\gamma^2}{4h^8} \cdot \sin(3fv - 2gv + 2\theta).$$

Tous ces termes réunis produisent dans le second membre de la seconde des équations (L) citées, le terme

$$-\frac{9}{2h^8}\cdot\frac{ke\gamma^2\cdot\sin\left(3fv-2gv-cv+2\theta-\varpi\right)}{3f-2g-c}$$

Il faut ajouter à ce membre, le terme qui résulte de la variation de u, relative à l'angle 3fv-2gv, dans le développement de la force perturbatrice. Représentons cette variation, par

$$\frac{1}{l^{2}(1+\gamma^{2})} \cdot lk \cdot \sin(3fv - 2gv + 2\theta);$$

en sorte que la valeur précédente de u, devienne no anoitargetait

$$u = \frac{1}{h^2(1+\gamma^2)} \cdot \left[ \sqrt{1+s^2} + e \cdot \cos(cv - \varpi) + lk \cdot \cos(3fv - 2gv + 2\theta - \frac{\pi}{2}) \right],$$

# étant la demi-circonférence dont le rayon est l'unité. L'angle 3 su-28 vétant très peu différent de cu; on peut considérer le terme

$$lk \cdot \cos\left(3fv - 2gv + 2\theta - \frac{\pi}{2}\right)$$

comme étant relatif à une seconde équation du centre; ainsi de même que le terme e.cos (cv — w) a produit dans le second membre de l'équation (L') du n° 9 du Livre VII, le terme

 $-(1-c^2) \cdot e \cos(cv-\omega)$ ;

le terme

$$U_k \cos \left(3fv - 2gv + 2\theta - \frac{\pi}{2}\right)$$

y produira le terme (82 + 32 - 38) nis . c

$$-(1-c^{l_2}) \cdot lk \cdot \cos(3fv - 2gv + 2\theta - \frac{\pi}{2})$$

c'étant extrêmement peu différent de c. Il lui serait même égal, si l'on faisait abstraction de la puissance  $[e \cdot \cos(cv - \omega)]^3$  qui provient du facteur  $\frac{1}{u^3}$  qui multiplie l'action perturbatrice du Soleil, dans le mouvement lunaire; car en négligeant le carré de k et ses puissances supérieures, et ne considérant que les termes multipliés par

Tons ces termes reunis pro (wisen wo) 1200. second membre de la second

et par

des équations (I) citées, le terme 
$$\frac{2k \cdot \cos\left(3fv - 2gv + 2\theta - \frac{\pi}{2}\right)}{kev^2 \cdot \sin\left(3fv - 2gv + 2\theta - \frac{\pi}{2}\right)},$$

on a

Il faut ajoutel de ce membre, le ternée qui result 
$$(x^2 + y^2)^3$$
  $(x^2 + y^2)^3$   $(x^2 + y^2)^3$   $(x^2 + y^2)^3$   $(x^2 + y^2)^3$   $(x^2 + y^2)^4$   $(x^2 + y^$ 

De là il est facile de conclure que l'on a à très peu près

$$1 - c'^{2} = (1 - c^{2}) (1 - \frac{5}{2} e^{2}).$$

Il faut donc ajouter au second membre de l'équation (L') du n° 9 du Livre VII, le terme

$$-(1-c^2)(1-\frac{5}{4}e^2) \cdot lk \cdot \sin(3fu-2gu+2\theta).$$

Le terme

$$3fv - gv - ev$$
 different très peu  $\frac{1}{2}e gv$  on peut considere  $\frac{\frac{\varepsilon}{2}(s+1)^2 \hbar}{ik}$  sin  $(3fv - gv - ev + 0 + \varpi - \frac{\pi}{2})$ ,

que donne par son développement le second membre de la seconde des équations (L) du n° 1 du Livre VII, produit dans le second membre de l'équation (L') du même Livre, le terme  $\frac{3s\delta s}{h^2}$ ; Is étant la variation de s, dépendante de k. La partie sensible de cette variation dépend de l'angle

$$3fv - gv - cv + \theta + \varpi;$$

parce que

$$3fv - gv - cv$$

différant très peu de gv, les termes relatifs à cet angle, acquièrent un très petit diviseur. Il faut par la même raison avoir égard aux termes de Js, dépendans de l'angle  $3fv - gv + \theta$ . Ces termes produisent dans  $\frac{3sJs}{h^2}$ , des termes dépendans de l'angle  $3fv - 2gv + 2\theta$ , et qui acquièrent par l'intégration de l'équation (L') du n° 9 du Livre VII, un très grand diviseur.

Cela posé; en n'ayant égard qu'à la partie de Q dépendante de k, on a

$$\frac{1}{h^2u^2} \cdot \frac{ds}{dv} \left(\frac{dQ}{dv}\right) - \frac{s}{h^2u} \left(\frac{dQ}{du}\right) - \frac{(1+s^2)}{h^2u^2} \left(\frac{dQ}{ds}\right)$$

$$= -\frac{3k}{h^6} \gamma e \cos\left(3fv - gv - cv + \theta + \varpi\right)$$

$$= \frac{3k}{h^6} \gamma \cdot \cos\left(3fv - gv + \theta\right).$$

Il faut donc ajouter ces deux derniers termes au second membre de la troisième des équations (L) du n° 1 du Livre VII. Il faut ajouter encore à ce membre, le terme qui résulte de la variation de s relative à

l'angle 3fv - gv - cv, dans le développement de la force perturbatrice. Représentons cette variation par

$$ik \cos(3fv - gv - cv + \theta + \varpi).$$

3fv - gv - cv différant très peu de gv; on peut considérer

$$ik \cdot \sin\left(3fv - gv - cv + \theta + \varpi - \frac{\pi}{2}\right)$$
,

comme appartenant à une seconde inclinaison de l'orbite. Ainsi de même que le terme  $\gamma$ . sin  $(gu-\theta)$  a produit dans l'équation (L'') du n° 13 du Livre VII, le terme

$$(g^2-1) \gamma \cdot \sin(gv-\theta)$$
; san't sh hasqib noit

le terme

$$ik \cdot \sin\left(3fv - gv - cv + \theta + \varpi - \frac{\pi}{2}\right),$$

y produira le terme

$$(g'^2-1) \cdot ik \cdot \sin\left(3fv-gv-cv+\theta+\varpi-\frac{\pi}{2}\right),$$

g'étant extrêmement peu différent de g. On aura leur différence, en observant qu'elle vient du terme multiplié par s³, dans le développement du second membre de la troisième des équations (L) du n° 1 du Livre VII, et spécialement de sa partie

$$-\frac{s}{h^a u} \left(\frac{dQ}{du}\right) - \frac{(1+s^a)}{h^a u^a} \cdot \left(\frac{dQ}{ds}\right),$$

et il resulte de l'expression de Q du n° 3 du Livre VII, que cette partie donne dans ce second membre, le terme — 3m². h<sup>6</sup>. s³; ce qui produit dans le second membre de l'équation (L") citée, le terme

$$-\frac{9}{4}h^6m^2 \cdot \gamma^2 \cdot \gamma \cdot \sin(gv - \theta);$$

on a donc, en observant que h est à très peu près l'unité, and la la

treme des équations (L) du me 1 du layre VII. Il feut spouler en core à ce membre, le ten 
$$\chi'^{*}_{4} = \frac{e}{4} = \frac{e}{2}$$
 variation de s relative à

il faut donc ajouter à ce second membre, le terme

$$(g^{a}-1+\frac{9}{4}m^{a}\gamma^{a})^{a}$$
.  $ik\cos(3fv-gv-cv+\theta+\varpi)$ .

La troisième des équations (L) citées donne ainsi, en ne considérant que les termes précédens dépendans de k,

$$0 = \frac{dds}{dv^{2}} + s + (g^{2} - 1 + \frac{9}{4}m^{2}\gamma^{2}) \cdot ik \cdot \cos(3fv - gv - cv + \theta + \varpi)$$

$$-\frac{3k}{h^{6}} \cdot \gamma e \cdot \cos(3fv - gv - cv + \theta + \varpi)$$

$$-\frac{3}{h^{6}} \cdot \gamma \cdot \cos(3fv - gv + \theta).$$

Ayant représenté par  $ik \cdot \cos(3fv - gv - cv + \theta + \varpi)$ , le terme de s, dépendant de l'angle 3fv - gv - cv; l'équation précédente donnera

$$0 = ik \left[g^2 + \frac{9}{4} \cdot m^2 \gamma^2 - (3f - g - c)^2\right] + \frac{3k}{h^6} \gamma e$$

Ainsi la variation de s relative à l'angle 3fv - gv - cv, est à fort peu près

$$-\frac{3k}{h^6} \cdot \frac{\gamma e \cos \cdot (3fv - gv - cv + \theta + \varpi)}{2(3f - 2g - c) - \frac{9}{4}m^2\gamma^2}$$

 $\gamma$  et m sont des fractions du même ordre de petitesse, en sorte que  $-\frac{9}{4}m^2\gamma^2$  est de l'ordre  $m^4$ ; il semble donc qu'on peut le négliger par rapport à 2(3f-2g-c); mais la circonstance particulière qui rend 1-c presque double de g-1, rend 2(3f-2g-c) fort petit, et tel que pour l'exactitude du calcul, il est nécessaire de conserver à son égard, le terme  $-\frac{9}{4}m^2\gamma^2$ .

La partie de s relative à l'angle 3 fu — gu, est à fort peu près

$$-\frac{k\gamma}{h^6} \cdot \cos(3fv - gv + \theta);$$

le terme  $\frac{3sds}{h^2}$  donne ainsi les suivans  $\sqrt{\frac{1}{h^2}}$  donne ainsi les suivans  $\sqrt{\frac{1}{h^2}}$ 

MÉCAN. CÉL. Tome V.

# MÉCANIQUE CÉLESTE,

$$9key^{2} \cdot \sin(3fv - 2gv - cv + 2\theta + \varpi)$$

$$(\varpi + 1 + \omega + 4h^{8} \cdot (3f - 2g - c - \frac{9}{8} \cdot m^{2}v^{2}) = 2 + 1 - 1$$

$$+ \frac{3k\gamma^{2}}{2h^{8}} \cdot \sin(3fu - 2gv + 2\theta).$$

La seconde des équations (L) citées, deviendra ainsi, en ne considérant que les termes qui ont pour diviseurs 3f-2g-c, ou qui peuvent l'acquérir,

$$0 = \frac{ddu}{dv^{2}} + u - \frac{9ke\gamma^{2}}{2h^{8}} \left( \frac{1}{3f - 2g - c} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3f - 2g - c} - \frac{9}{8}m^{2}\gamma^{2} \right) \cdot \sin(3fv - 2gv - cv + 2\theta + \pi),$$

$$+ \frac{3k \cdot \gamma^{2}}{2h^{8}} \cdot \sin(3fv - 2gv + 2\theta)$$

$$- \left(1 - c^{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{5}{2}e^{3}\right) \cdot lk \cdot \sin(3fv - 2gv + 2\theta).$$

Ayant représenté la partie de la variation  $\mathcal{L}u$  de u, relative à l'angle  $3fu - 2gu + 2\theta$ , par  $u = 2gu + 2\theta$ , par  $u = 2gu + 2\theta$ 

$$lk \cdot \sin(3fv - 2gv + 2\theta);$$

l'équation précédente donne

$$lk = \frac{3k \cdot \xi_{\lambda} \cdot \cos 3v \cdot \lambda \delta}{4h^{8} \cdot [3f - 2g - c - \frac{5}{4} \cdot \sec^{2}(1 - c^{2})]};$$

on aura donc

की किस वृद्धि वृद्धि । वृद्धि से विका

$$\int u = \frac{3k\gamma^2 \cdot \sin(3fv - 2gv + 2\theta)}{4h^8 \cdot [3f - 2g - c - \frac{5}{4}e^2(1 - c^2)]}$$

$$3f - 2g - c - \frac{9}{4}m^2\gamma^2$$

$$+ \frac{9k \cdot e\gamma^2}{4h^8} \cdot \frac{(3f + 2g - c) \cdot (3f - 2g - c - \frac{9}{8}m^2\gamma^2)}{(3f + 2g - c) \cdot (3f - 2g - c - \frac{9}{8}m^2\gamma^2)} \cdot \sin(3f\nu - 2g\nu - c\nu + 2\nu + 2\nu)$$

En prenant ensuite pour unité la moyenne distance de la Lune à la Terre, on pourra par le n° 6 du Livre VII, supposer  $h=\tau$ , et alors on a à fort peu près

$$u = \sqrt{1 + s^2 + e \cdot \cos(cv - \varpi)},$$

on a ensuite

53.

Le terme

$$\frac{12 \, kdt \cdot \sin 3fc}{(1+s^2)^{\frac{3}{2}} \cdot r^4}$$

donne celui-ci, en substituant pour dt,  $\frac{dv}{u^2}$ ,

On trouvera facilement

$$-2Q'dt \cdot r\delta r = \frac{m^2}{2} \left[1 + 3 \cdot \cos\left(2u - 2mv\right)\right] \left(\frac{s\delta s}{u^2} - \frac{\delta u}{u^2}\right) \cdot \frac{dv}{u^2}$$

En substituant pour  $\mathcal{S}u$  et  $\mathcal{S}s$ , leurs valeurs précédentes, et ne conservant que les termes qui ont des diviseurs de l'ordre 3f - 2g - c, on aura

$$= 3k \cdot \frac{m^2}{2} \left( \frac{s \delta s}{u^2} - \frac{\delta u}{u^2} \right) \cdot \frac{dv}{u^2}$$

$$= 3k \cdot \frac{m^2}{2} e \gamma^2 \cdot \sin(3fv - 2gv - cv + 2\theta + \varpi) \cdot \left( \frac{3f - 2g - c - \frac{9}{8} m^2 \gamma^2}{3f - 2g - c - \frac{5}{4} e^2 (1 - c^2)} \right)$$

Les termes de l'ordre  $m^s$  doublent à fort peu près, comme l'on sait, la valeur de c relative aux quantités de l'ordre  $m^s$ , ce qui rend très petit le diviseur 3f-2g-c; il est donc utile dans la présente recherche, d'avoir égard aux termes de l'ordre  $m^s$ . Pour cela, il faut considérer la fonction

$$\frac{3m^2}{2} \cdot \cos\left(2v - 2mv\right) \cdot \left(\frac{s\delta s}{u^2} - \frac{\delta u}{u^3}\right) \cdot \frac{dv}{u^2},$$

qui fait partie de l'expression de a 20'dt. rorio office estata la finale

Terre, on pourra par le n° 6 de Livrei VII, supposer la red acque no l'ist

$$u = 1 + e \cdot \cos(cv - \varpi) + A_1^{(1)} \cdot e \cdot \cos(2v - 2mv - cv + \varpi);$$

$$+ B_1^{(0)} \gamma \cdot \cos(2v - 2mv - gv + \theta).$$

A, (1) et B, (6) ayant les significations que je leur ai données dans le Livre VII; la fonction précédente donnera dans l'expression de

et en y substituant pour u,

d. Su, le terme

$$\frac{\frac{15}{2} A_1^{(1)}}{3f - 2g - c - \frac{5}{4} e^2 (1 - c^2)}$$

$$\frac{3}{16} \cdot m^2 e \gamma^2 dv \cdot k \sin(3f v - 2g v - c v + 2\theta + \pi) \cdot (1 - c^2)$$

$$\frac{3}{16} \cdot m^2 e \gamma^2 dv \cdot k \sin(3f v - 2g v - c v + 2\theta + \pi) \cdot (1 - c^2)$$

$$\frac{3}{16} \cdot m^2 e \gamma^2 dv \cdot k \sin(3f v - 2g v - c v + 2\theta + \pi) \cdot (1 - c^2)$$

$$\frac{3}{16} \cdot m^2 e \gamma^2 dv \cdot k \sin(3f v - 2g v - c v + 2\theta + \pi) \cdot (1 - c^2)$$

$$\frac{3}{16} \cdot m^2 e \gamma^2 dv \cdot k \sin(3f v - 2g v - c v + 2\theta + \pi) \cdot (1 - c^2)$$

$$\frac{3}{16} \cdot m^2 e \gamma^2 dv \cdot k \sin(3f v - 2g v - c v + 2\theta + \pi) \cdot (1 - c^2)$$

$$\frac{3}{16} \cdot m^2 e \gamma^2 dv \cdot k \sin(3f v - 2g v - c v + 2\theta + \pi) \cdot (1 - c^2)$$

$$\frac{3}{16} \cdot m^2 e \gamma^2 dv \cdot k \sin(3f v - 2g v - c v + 2\theta + \pi) \cdot (1 - c^2)$$

$$\frac{3}{16} \cdot m^2 e \gamma^2 dv \cdot k \sin(3f v - 2g v - c v + 2\theta + \pi) \cdot (1 - c^2)$$

$$\frac{3}{16} \cdot m^2 e \gamma^2 dv \cdot k \sin(3f v - 2g v - c v + 2\theta + \pi) \cdot (1 - c^2)$$

Considérons le terme  $\frac{d(dr. \delta r)}{dt}$ , de l'expression de  $d\delta u$ : on a

$$dr = e \cdot dv \cdot \sin(cv - \varpi); \quad \delta r = -\sqrt{1 + s^2} \cdot \frac{\delta u}{u^2} + \frac{s \cdot \delta s}{u \cdot \sqrt{1 + s^2}};$$

le terme  $\frac{d\cdot(dr\cdot\delta r)}{dt}$ , donne ainsi le suivant

$$\frac{3k \cdot e \cdot \gamma^{2}}{8} \cdot \frac{d \cdot \cos(3fv - 2gv - cv + 2\theta + \omega)}{3f - 2g - e - \frac{5}{4}e^{2} \cdot (1 - c^{2})}$$

L'expression de  $d \cdot \delta v$  se rapporte au plan de l'orbite lunaire : pour la rapporter au plan même de l'écliptique, il faut, par le Chap. Il du Livre VII, lui ajouter ce que produit la fonction restre étant exprime par

restre étant exprime par a (
$$\frac{1}{2}$$
) egy étant développe dans une suite de la forme ;  $vb \cdot (\frac{sb}{2db} - sb) \cdot \frac{1}{s} = cb$  et à l'équation

lorsqu'on y substitue pour s,

$$\gamma \cdot \sin gv - \frac{3k}{h^6} \cdot \frac{\gamma e \cdot \cos (3fv - gv - cv + \theta + \varpi)}{2(3f - 2g - c) - \frac{9}{4} \cdot m^2 \gamma^2};$$
ce qui produit le terme

ce qui produit le terme

$$\frac{3key^2}{2} \cdot \frac{[1-g^2-g\cdot(3f-2g-c)]\cdot\sin(3fv-2gv-cv+2\theta+\pi)}{2}$$
the stant la densité  $\frac{9}{4}$   $\frac$ 

vitesse, la vitesse moyenne de la Lune; la masse de la Terde l'expression donnée ci-dessus, de d. de, donne en le transformant dans celui-ci

et en y substituant pour u,

e terme 
$$\sqrt{1+s^2} + e \cdot \cos(cv - \varpi)$$
,  
 $\sqrt{1+s^2} + e \cdot \cos(cv - \varpi)$ ,

En réunissant tous les termes de l'expression de d. Su rapportée à

Pour réduire cette formule en nombres, on peut observer que par le n° 14 du troisième Livre, le rayon d'une couche du sphéroïde terrestre étant exprimé par  $a.(1+\alpha y)$ , et y étant développé dans une suite de la forme  $y^{(0)} + y^{(1)} + y^{(2)} + y^{(3)} + \text{etc.}, y^{(i)}$  étant assujetti à l'équation

$$0 = \left\{ \frac{d \cdot \left[ (1 - \mu^2) \cdot \left( \frac{dy^{(i)}}{d\mu} \right) \right]}{du} \right\} + \left( \frac{ddy^{(i)}}{d\pi^2} \right) + i \cdot \overline{i + 1} \cdot y^{(i)};$$

on aura par la formule (a) de ce même numéro,

ρ étant la densité de la couche; la différentielle et l'intégrale étant relatives à la variable a; et cette intégrale étant prise depuis a=0, jusqu'à a = D. En prenant pour unité de distance, comme nous le faisons, la distance moyenne de la Lune à la Terre, et pour unité de vitesse, la vitesse moyenne de la Lune; la masse de la Terre devient à fort peu près l'unité de masse; or cette masse est à fort peu près  $\frac{4\pi}{3}$  .  $\int \rho \cdot d \cdot a^3$ ; on aura donc

H(3). 
$$\mathbf{D}^3$$
. U(3)  $=\frac{\frac{3}{7}\alpha \cdot \int \rho \cdot d \cdot a^6 y^{(3)}}{\int \rho \cdot d \cdot a^3}$ .

On peut négliger ici les termes de y(3) qui dépendent de v, et supposer ainsi soutgille

 $y^{(3)} = p \cdot \left(\mu^3 - \frac{3\mu}{5}\right),$ 

p étant une fonction de a; alors on a filogoni ses enimetels le l

pe vars considerer ici qua a. f. d. a. n. d. a. n. d. a. n. desus, qui depend eu egard Le terme de l'i x s. b. q. de d'année ci-desus, qui depend

ce qui donne

 $k = \frac{3}{28} \alpha \cdot \frac{\int \rho \cdot d \cdot a^6 p}{\int \rho \cdot d \cdot a^3} \cdot \sin^3 \cdot \lambda.$ 

Si la Terre est supposée homogène, p et p sont constans, et l'on a

On peut supposer ici dans ce terniege  $3k = \frac{9}{28} \cdot \alpha p \cdot D^3 \cdot \sin^3 \lambda$ .

Nous sommes certains par les mesures des degrés terrestres et du pendule, que  $\alpha p$  n'est pas  $\frac{1}{300}$ ; 3k est donc au-dessous de  $\frac{1}{900}$ . D<sup>3</sup>.  $\sin^3 \lambda$ . Quelle que soit la constitution du sphéroïde terrestre, nous sommes certains que 3k est au-dessous de  $\frac{1}{100}$ . D<sup>3</sup>.  $\sin^3$ .  $\lambda$ . On a a fort peu bequelies that f is f in f in

on a ensuite par le Livre VII, Ce même terne pris avec un signe contratrerient particide Lexpression

c = 0.09154801; agus ermospaol oup shoe as A ab

m = 0.0748013; e = 0.05487293,  $\lambda = 0.0900807$ ; g = 11.00402175,

ce qui donne

oul; et alors on as ! unité

 $A_{1}^{(1)} = 0.201816$ ;  $B_{1}^{(0)} = 0.0282636$ .

De plus, l'obliquité de l'écliptique est à fort peu près 23° 28' en degrés sexagésimaux; en supposant donc

qu'à a = D. En prenan $\kappa$  snis squ' = 3 sance comme nous Enfanayant acgard qu'à l'inégalité de du, dont la période est celle du et en observant que par le nº 10 du Livre VII, on aud husen un mois-

D = 0,016655101;

on trouve que l'expression de Su, donnée par la formule (b) est insensible et au-dessous d'un millième de seconde

Des inégalités lunaires dépendantes de la partie elliptique du rayon terrestre.

Ou pelut négliger ici les termes de yest qui dépendent de w, et sur

5. J'ai déterminé ces inégalités dans le chapitre II du Livre VII: je vais considérer ici quelques quantités auxquelles je n'avais point eu égard. Le terme de l'expression de V donnée ci-dessus, qui dépend de la partie elliptique du rayon terrestre, est

On peut supposer ici dans ce termé

alors, en substituant pour  $\mu$ , sa valeur

and so the substituent pour 
$$\mu$$
, sa valeur  $\mu$  and  $\mu$  are  $\mu$  and  $\mu$  and  $\mu$  are  $\mu$  are  $\mu$  and  $\mu$  are  $\mu$  and  $\mu$  are  $\mu$  are  $\mu$  and  $\mu$  are  $\mu$  are  $\mu$  and  $\mu$  are  $\mu$  and  $\mu$  are  $\mu$  are  $\mu$  and  $\mu$  are  $\mu$  are  $\mu$  and  $\mu$  are  $\mu$ 

on aura dans V le terme

$$2\mathbf{H}^{(a)} \cdot \frac{\mathbf{D}^2}{r^3} \cdot \frac{\sin \lambda \cdot \cos \lambda \cdot s \cdot \sin f_{\theta}}{(1+s^2)^{\frac{1}{2}}}.$$

Ce même terme pris avec un signe contraire fait partie de l'expression de R; en sorte que l'on pourra supposer ici

$$R = r^{2}Q' - 2H^{(a)}, \frac{D^{2}}{r^{3}}, \frac{\sin \lambda \cdot \cos \lambda \cdot s \cdot \sin f \nu}{(1+s^{2})^{\frac{j}{2}}};$$
ce qui donne

ce qui donne

$$2\delta \cdot r\left(\frac{dR}{dr}\right) = 4\delta \cdot r^{2}Q + 12 \cdot H^{(2)} \cdot \frac{D^{2}}{r^{3}} \cdot \frac{\sin \lambda \cdot \cos \lambda \cdot s \cdot \sin f_{0}}{(1+s^{2})^{\frac{1}{2}}}$$

En n'ayant égard qu'à l'inégalité de Su, dont la période est celle du retour du nœud lunaire au même équinoxe, on pourra supposer JR, nul; et alors on a rices clant - R. elle ob molor6655101

The sensible et au-dessous 
$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) = \frac{\sin \lambda \cdot \cos \lambda \cdot s \cdot \sin f v}{\sin \lambda \cdot \cos \lambda \cdot s \cdot \sin f v}$$
; the proposition of the seconds

on a donc

$$2 \cdot \delta \cdot r \left(\frac{dR}{dr}\right) = 20 \cdot H^{(a)} \cdot \frac{D^2}{r^3} \cdot \frac{\sin \lambda \cdot \cos \lambda \cdot s \cdot \sin f_{\sigma}}{(1+s^2)^{\frac{1}{2}}};$$

et la formule (a) du n° précédent, deviendra

$$d. \delta v = -\frac{d(dr \delta r)}{dt} + \left\{ \frac{20 \cdot H^{(a)} \cdot \frac{D^{a}}{r^{3}} \cdot \sin \lambda \cdot \cos \lambda \cdot s \cdot \sin f v}{(1 + s^{2})^{\frac{1}{a}}} - 2Q'r \delta r \right\} \cdot dt.$$

Le terme

$$\frac{20 \cdot \mathbf{H}^{(2)} \cdot \frac{\mathbf{D}^{2}}{r^{3}} \cdot \sin \lambda \cdot \cos \lambda \cdot s \cdot \sin f \nu}{(1 + s^{2})^{\frac{1}{2}} \cdot \cot \theta} \cdot dt$$

donne celui-ci, en substituant, comme ci-dessus,  $\frac{dv}{u^2}$  ou simplement dvpour dt, et faisant r=1,

10. 
$$H^{(s)}$$
.  $D^{s}$ .  $\sin \lambda \cdot \cos \lambda \cdot \gamma dv \cdot \cos \left(\frac{gv - fv}{\theta}\right)$ .

ce qui précède,

On a par ce qui précède,

par ce qui précède,
$$-2Q' = \frac{m^2}{2} \cdot \left[1 - 3s^2 + 3(1 - s^2) \cdot \cos(2v - 2mv)\right],$$

le terme - 2Q'ror. dt donnera ainsi le suivant

$$\frac{m^2 dv}{2} [1 + 3 \cdot \cos(2v - 2mv)] \cdot r dr$$
 (0).

Il faut déterminer la partie de ror qui dépend de cos (gv - fv -θ) et qui a pour diviseur g-f. Voulant ensuite avoir égard aux termes de l'ordre m3, il faut déterminer la partie du ror de l'ordre m, qui dépend de  $\cos(2v-2mv-gv+fv-\theta)$ , et qui a le diviseur g-1; parce que cette partie étant multipliée par cos (2v - 2mv), produit un terme de l'ordre m3, dans la fonction (o). Il faut donc avoir égard aux mêmes parties dans les développemens de sos et du.

Développons d'abord Ss. La partie de Q relative aux forces perturbatrices étant - R, elle est égale à - uc) cle . c (a ao crois te : lun

$$-r^{2}Q'+2H^{(2)}.D^{2}.\frac{\sin\lambda\cos\lambda\cdot u^{3}.s\cdot\sin fv}{(1-s^{2})^{3}}.$$

Milcan, cia. Tome V.

1. 机粉粉菜 海绵树

En n'ayant égard qu'au second de ces termes, la partie utile de

$$-\frac{1}{h^2u^2} \cdot \frac{ds}{dv} \cdot \left(\frac{dQ}{dv}\right) - \frac{s}{h^2u} \cdot \left(\frac{dQ}{dv}\right) - \frac{(1+ss)}{h^2u^2} \cdot \left(\frac{dQ}{ds}\right)$$

se réduit à très peu près à manage de la company de la com

La troisième des équations (L) du n°  $\iota$  du Livre VII donne ainsi , en désignant par  $\Im s$  le terme de s qui dépend de  $f \iota$  ,

$$o = \frac{dd. \delta s}{dv^2} + g'^2. \delta s - 2H^{(s)}. D^2. \sin \lambda . \cos \lambda . \sin \delta v.$$

 $g^{\prime *}$  étant comme dans le n° précédent, égal à  $g^* + \frac{9}{4} m^* \gamma^*$ ; on a donc

$$\delta s = \frac{2H^{(2)} \cdot D^2 \cdot \sin \lambda \cdot \cos \lambda \cdot \sin \cdot f_0}{g^2 - f^2 + \frac{9}{4}m^2\gamma^2}$$

On a à très peu près  $g^2 - f^2$  égal à  $g^2 - 1$ , et  $g^2 - 1$  est assez grand par rapport à  $\frac{9}{4}m^2\gamma^2$ , pour que l'on puisse négliger ici ce dernier terme; en sorte que l'on a aux quantités près de l'ordre  $m^2$ ,

$$\delta s = \frac{k' \cdot \sin f_0}{g - 1};$$

en faisant

$$k' = \mathbf{H}^{(2)} \cdot \mathbf{D}^2 \cdot \sin \lambda \cdot \cos \lambda$$
.

Pour avoir le terme de s, dépendant de  $\sin(2v-2mv-fv)$ ; on observera que l'on peut considérer l'expression précédente de  $\mathcal{I}s$ , comme étant relative à une inclinaison de l'orbite lunaire, égale à  $\frac{k'}{g-1}$ , et dont (1-f)v serait le mouvement du nœud. Or on a vu dans le n° 7 du Livre VII que l'inclinaison  $\gamma$  de l'orbite lunaire produit dans s, en vertu de l'action du Soleil, le terme

$$B_{i}^{(\circ)} \cdot \gamma \cdot \sin(2v - 2mv - gv + \theta);$$

l'inclinaison  $\frac{k^2}{g-1}$  produira donc un terme semblable que nous re-Mécan. Cél.  $Tome\ V$ . présenterons par

La seconde des equivons (I) entee donne dous 
$$\frac{1}{g-1}$$
 ence  $\frac{1}{g}$   $\frac{1}{g}$  ence  $\frac{1}{g}$   $\frac{1}{g}$ 

et l'on voit par le n° 7 cité, que l'on peut en négligeant les quantités de l'ordre ma, supposer B(o) égal à B,(o). Ce résultat auquel conduit la considération de la partie - r2Q', de l'expression de Q, nous dispense de considérer ici cette partie; nous pouvons ainsi faire

$$\delta s = \frac{k'}{g-1} \left[ \sin f v + B_t(0) \cdot \sin \left( 2v - 2mv - f v \right) \right].$$

Déterminons maintenant du. Pour cela, reprenons la seconde des équations (L) du n° 1 du Livre VII. En faisant usage de la valeur précédente de Q, et ne considérant que le dernier terme de cette valeur ; l'intégrale

t expression precedente de 
$$\frac{dv}{u^2}$$
.  $\frac{dv}{u^2}$  dono dono

donnera le terme

$$\frac{2k' \cdot \cos(gv - fv - \theta)}{g - 1}$$

Ainsi la fonction

$$\left[\left(\frac{ddu}{dv^2}\right) + u\right] \cdot \left[1 + \frac{2}{s} \int \left(\frac{dQ}{dv}\right) \frac{dv}{u^2}\right].$$

du second membre de la seconde des équations (L) citées, renferme le terme

$$\frac{2k' \cdot \cos(gv - fv - \theta)}{g - 1} \cdot \text{ind} \quad \text{independent of more properties}$$

Le développement de ce second membre renferme encore, comme on l'a dit dans le numéro précédent, le terme 3s ds. Il faut ici substituer pour s,

$$\gamma \cdot \sin(gv - \theta) + B_1^{(0)} \gamma \cdot \sin(2v - 2mv - gv + \theta),$$

et pour Ss

$$\frac{k'}{g-1}\left[\sin f \upsilon + B_1^{(\circ)} \cdot \sin \left(2\upsilon - 2m\upsilon - f\upsilon\right)\right],$$

et alors ce terme donne les suivans

et alors de terme donne les suivans
$$\frac{\frac{3}{p} \cdot \frac{\gamma k'}{g-1} \cdot \cos(gv - fv - \theta)}{-\frac{3}{p} \cdot \frac{k \cdot B_1^{(o)} \gamma}{g-1} \cdot \left[ \frac{\cos(2v - 2mv + gv - fv - \theta)}{+\cos(2v - 2mv - gv + fv + \theta)} \right].$$

La seconde des équations (L) citée donne donc en négligeant les termes de l'ordre ma

at timbroo le 
$$\frac{y}{g-1}$$
  $B_1^{(\bullet)}$   $\cos(gv-fv-\theta)$  at  $\cos(gv-fv-\theta)$   $\cos(gv-fv-\theta)$   $\cos(gv-fv-\theta)$   $\cos(gv-fv-\theta)$   $\cos(gv-fv-\theta)$   $\cos(gv-fv-\theta)$   $\cos(gv-fv-\theta)$ 

On a à très peu près,

$$r\delta r = -\delta u + s\delta s$$
;

en substituant pour su et sos leurs valeurs précédentes, on aura

l'expression précédente de d. Su, deviendra donc

$$d \cdot \delta v = -\frac{d \cdot (dr \delta r)}{dt} + i \circ k' \gamma \cdot dv \cdot \sin(g \circ -f \circ -\theta).$$

Il est facile de voir que  $\frac{d(dr\partial r)}{dt}$  est ici nul, et qu'ainsi l'on a

$$d \cdot \delta v = 10k\gamma \cdot dv \cdot \sin(gv - fv - \theta)$$
.

Cette valeur de d. Su se rapporte à l'orbite même de la Lune; et pour la rapporter à l'écliptique, il faut, comme on l'a vu dans le numéro précédent, lui ajouter

Si l'on substitue pour 
$$s$$
,  $\left(s^2 - \frac{ds^2}{dv^2}\right) \cdot dv$ .  $s = 0$  substitue pour  $s$ ,

$$\gamma \cdot \sin(gv - \theta) + B_{\iota}^{(o)}\gamma \cdot \sin(2v - 2mv - gv + \theta) + \frac{k'}{g - 1} \cdot \sin fv + \frac{k'B_{\iota}^{(o)}}{g - 1} \cdot \sin(2v - 2mv - fv);$$

on aura

$$\frac{1}{2} \cdot \left(s^2 - \frac{ds^2}{dv^2}\right) = -\frac{2k^1}{2} \left(1 - \frac{4m \cdot B_1(0)^2}{g - 1}\right) \cdot \cos(gv - fv - \theta).$$

On a, par le nº 14 du livre VII, aux quantités près de l'ordre m²,

$$B_{1}(0) = \frac{3m}{8}; g - 1 = \frac{3}{4}m^{2},$$

on aura donc

$$\frac{1}{2} \delta \left( s^2 - \frac{ds^2}{dv^2} \right) = -\frac{1}{2} \cdot \gamma k \left( 1 - \frac{3m}{4} \right) \cdot \cos \left( gv - fv - \theta \right),$$

d'où l'on tire VI JATIGAH)

$$d. \, \Im u = \frac{19}{2} \cdot \gamma k \left( 1 + \frac{3m}{76} \right) \cdot dv \cdot \cos \left( gv - fv - \theta \right).$$

En considérant m, e et y comme des quantités du premier ordre, on voit que ces expressions de d's et de d. du sont approchées aux quantités près de l'ordre m². Si l'on rapproche la valeur de ds, de celle qui résulte du second chapitre du Livre VII, on a

$$k = \frac{1}{2} \alpha \phi$$

$$k = \frac{1}{2$$

ap étant l'ellipticité de la Terre, et ap étant le rapport de la force centrifuge à la pesanteur à l'équateur.

Soleil . décomposées parallèlement aux axes des c des y et des s,

mais la Terre étant supposée immobile, il faut transporter en sens contraire à la Lune, son action et celle du Soleil sur la Terre. Ces actions décomposées parallèlement aux axes des a, des y et des a prises avec un signe contraire, sont exprimées par les coefficiens de dx, dy, dz, dans la differentielle de la fonction

Ainsi en nommant V la fonction quante près ile l'ordre 
$$m$$

$$\frac{\mathbf{T} + \mathbf{E}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} + \frac{m}{\sqrt{(x-x)^2 + (y-y)^2 + z^2}} = \frac{m^2(xx' + yy)}{\sqrt{y^2 + y^2 + z^2}}$$

## CHAPITRE IV. sait no'l to'l

 $d \cdot dv = \frac{10}{2} \cdot \gamma k \left( 1 + \frac{3m}{66} \right) \cdot dv \cdot \cos \left( gv - fv - \theta \right)$ 

# Sur la loi de l'attraction universelle.

6. Nommons T et L les masses de la Terre et de la Lune; r le rayon vecteur de la Lune; v sa longitude; s la tangente de sa latitude; x, y, z ses trois coordonnées rapportées au plan de l'écliptique et au centre de la Terre : désignons par m' la masse du Soleil; par r' sa distance au centre de la Terre; par x' et y' ses coordonnées rapportées à ce point et à l'écliptique, et par v' sa longitude. Les forces qui sollicitent la Lune, et qui résultent des attractions de la Terre et du Soleil, décomposées parallèlement aux axes des x des y et des z, sont, comme l'on sait, exprimées par les coefficiens de dx, de dy, et de dz, dans la différentielle de la fonction

$$\frac{T}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} + \frac{m'}{\sqrt{(x'-x)^2 + (y'-y')^2 + z^2}};$$

mais la Terre étant supposée immobile, il faut transporter en sens contraire à la Lune, son action et celle du Soleil sur la Terre. Ces actions décomposées parallèlement aux axes des x, des y et des z, prises avec un signe contraire, sont exprimées par les coefficiens de dx, dy, dz, dans la différentielle de la fonction

$$-\frac{L}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}+\frac{m'(xx'+yy')}{r'^3}.$$

Ainsi en nommant V la fonction

$$\frac{T + L}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} + \frac{m'}{\sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + z^2}} - \frac{m^2(xx' + yy')}{r'^3};$$

les forces dont la Lune est animée dans son mouvement relatif autour de la Terre, sont

$$\left(\frac{d\mathbf{V}}{dx}\right), \quad \left(\frac{d\mathbf{V}}{dy}\right), \quad \left(\frac{d\mathbf{V}}{dz}\right);$$

en sorte que les trois équations différentielles de ce mouvement, sont

$$o = \frac{ddx}{dt} - \left(\frac{dV}{dx}\right); \quad o = \frac{ddy}{dt^2} - \left(\frac{dV}{dy}\right); \quad o = \frac{ddz}{dt^2} - \left(\frac{dV}{dz}\right);$$

dt étant l'élément du temps, supposé constant l'elément du temps de l'elément du temps de l'elément de

Si l'on suppose que le Soleil attire différemment la Lune et la Terre; alors il faudra donner à m', dans le dernier terme de l'expression de V, une valeur différente de celle du second terme; en représentant donc par  $\delta m'$  cette différence; il faudra ajouter à la fonction V, le terme

Examinons l'influence de ce terme, sur le mouvement de la Lune : on a

$$x = \frac{r \cdot \cos v}{\sqrt{1 + s^2}}, \quad y = \frac{r \cdot \sin v}{\sqrt{1 + s^2}}, \quad z = \frac{78}{\sqrt{1 + s^2}}.$$

La fonction V devient ainsi, en la réduisant en série par rapport aux puissances descendantes de r',

$$V = \frac{T + L}{r} + \frac{m'}{r'} \cdot \left\{ \begin{array}{c} 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{r^2}{r'^2} + \frac{3}{2} \cdot \frac{r^3 \cdot \cos^2(v - v')}{r'^2 \cdot (1 + s^2)} \\ - \frac{3}{2} \cdot \frac{r^3 \cdot \cos(v - v')}{r'^3 \cdot (1 + s^2)} + \frac{5}{2} \cdot \frac{r^3 \cdot \cos^3(v - v')}{r'^3 \cdot (1 + s^2)} + \text{etc.} \end{array} \right\}$$
and a large space of a condition of the proof of the pr

Le terme multiplié par  $\cos(u-u')$ , de cette série, produit dans le mouvement lunaire, l'inégalité que l'on nomme inégalité parallactique. Il résulte des diverses théories de la Lune, et spécialement de celle que j'ai donnée dans le Livre VII, que le coefficient de cette inégalité est à fort peu près proportionnel au coefficient de  $\cos(v-u')$  dans le développement de V; en sorte que si l'on nomme A le coefficient de cette inégalité, donné par ma théorie de la Lune; l'indéter-

minée Im', en retranche une quantité qui est à A, à très peu près, es forces dont la Lune est animée dans son mouvement relatif simmos

$$\delta m' \cdot \frac{r}{r'^2}$$
 est à  $\frac{1.5}{8} \cdot \frac{m'r^3}{r'^4 (1+s^2)^{\frac{3}{2}}} \frac{3}{\sqrt{3}} \cdot \frac{m'r^3}{r'^4}$ ;

en négligeant donc le carré de s, l'indéterminé &m' diminuera le coefficient A, de la quantité

$$\binom{Vb}{10}$$
 -  $\frac{abb}{abb}$  = 0 (  $\frac{abb}{ab}$   $\frac{abb}{m'}$   $\frac{abb}{m'}$   $\frac{abb}{m'}$   $\frac{abb}{m'}$  =

En comparant le coefficient A, à celui que les observations donnent, on en conclut le rapport  $\frac{r}{r}$ , ou le rapport de la parallaxe solaire à la parallaxe lunaire; ce qui donne la parallaxe solaire, puisque la parallaxe lunaire est bien connue. Je trouve ainsi, en secondes sexagésimales 8",585 pour la parallaxe du Soleil, ce qui ne diffère pas d'un dixième de secondes, de la valeur de cette parallaxe, déterminée par les passages de Vénus sur le Soleil, observés en 1761 et 1769. Il est donc bien certain que le coefficient A de ma théorie de la Lune, ne diffère pas de la vérité, d'un huitième de secondes; et qu'ainsi la quantité

$$\frac{8}{3} \cdot \frac{\delta m'}{m'} \cdot \frac{r'^2}{r^2} \cdot \mathbf{A}$$

est au-dessous de  $\frac{A}{8}$ ; ce qui donne  $\frac{\delta m'}{m'}$  moindre que  $\frac{3}{64} \cdot \frac{r^2}{r'^2}$ . On a, à très peu près  $\frac{r}{r'} = \frac{1}{400}$ ; donc on a  $\frac{(^{2}+1)^{2}}{3410000} = \frac{(^{2}+1)^{2}}{(^{2}+1)^{2}}$ 

$$\frac{\delta m'}{m'} < \frac{1}{3410000}$$

Ainsi l'égalité d'action du Soleil sur la Terre et sur la Lune, est prouvée par l'inégalité parallactique, d'une manière beaucoup plus précise encore, que l'égalité de l'attraction terrestre sur les corps placés au même point de sa surface, ne l'est par les expériences du mouvement lunaire, l'inégalité que l'on nomme inega pendule.

Je vais maintenant considérer l'influence qu'une diminution de l'attraction par l'interposition des corps aurait sur les phénomènes.

L'attraction d'une molécule se répand comme la lumière d'une molécule lumineuse; de manière que si l'on conçoit une sphère immacient de cette inégalité, donné par ma théorie de la Lune; l'indétertérielle indéfinie dont elle soit le centre; l'attraction d'un instant, en parvenant aux couches de la sphère, restera toujours la même sur chaque couche; mais elle sera pour chacun des points de la couche, affaiblie en raison du carré du rayon de cette couche. Si elle s'éteint comme la lumière, par l'interposition d'un milieu; sa quantité répandue sur chaque couche, à mesure qu'elle y parvient, diminuera sans cesse, et sur un point quelconque de la couche, elle diminuera dans un plus grand rapport que le carré de la distance à la molécule attirante.

Pour avoir la loi de cette diminution, je nommerai A la quantité de l'attraction de la molécule, répandue sur la surface de la couche dont je désignerai le rayon par r. Sur la couche suivante, dont le rayon est r+dr, la quantité de cette attraction serait encore A, si une partie ne s'éteignait pas en passant d'une couche à l'autre. Or il est visible que cette extinction est proportionnelle à A; on aura donc stant famile que f forme avec r, et qui est suppose tres petets. La

$$dA = -\alpha A dr;$$

gone de tentes les quabli a étant une constante, si le milieu reste le même, comme nous le supposerons ici. On a ainsi en intégrant

$$A = H \cdot c^{-\alpha r},$$

H étant une constante arbitraire, et c étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité. Si l'on divise A par la surface  $4\pi$ ,  $r^2$ de la couche,  $\pi$  étant le rapport de la circonférence au diamètre; on aura l'attraction de la molécule sur un point placé à la distance r. En exprimant donc par dm, la masse de la molécule; on pourra représenter par  $\frac{dm}{r^2}$   $\frac{c-ar}{r^2}$ ,

son action sur un point placé à la distance r.

Je supposerai ar assez petit pour que l'on ait à très peu près distance mutuelle de ces deux lignes, et ar l'angle forme per un plan

fixe passard par n, et par un, waite plampatenat par r et par q jun aura

et alors l'attraction précédente devient

or due donne Meann, chr. Tome V.

Je vais maintenant déterminer d'après cette loi, l'attraction d'une sphère homogène dont le rayon est R sur un point P extérieur dont r est la distance au centre de la sphère; et je supposerai r très grand par rapport à R.

Soit f la distance à P, d'une molécule dm de la sphère. Soit q la partie de f, interceptée entre cette molécule et la surface de la sphère. Il est facile de voir que l'attraction de la molécule dm sur P sera villa clucilem al a contatale al chicaras de cato income hacis

Four avoir la loi de cetto d'apantion), inhemmera A la quantité de l'accraction de la molécule, répandue sur 
$$\overline{f}$$
 surface de la conche dont

Cette attraction décomposée parallèlement à r sera

where 
$$\frac{d}{dx}$$
 is a quantitie of the settle strategy of  $\frac{d}{dx}$  and  $\frac{d}{dx}$  are strategy as  $\frac{d}{dx}$  and  $\frac{d}{dx}$  are strategy as  $\frac{d}{dx}$ .

V étant l'angle que f forme avec r, et qui est supposé très petit. La somme de toutes les quantités  $\frac{dm.\cos V}{f^2}$ , exprime l'attraction de la sphère entière sur le point P, lorsque a est nul; et cette attraction est, comme l'on sait, égale à la masse de la sphère, divisée par ra; elle est donc

$$\frac{\frac{4}{3}\pi \cdot R^3}{r^2}$$
;

₹ étant la circonférence dont le diamètre est l'unité.

Pour avoir la somme de toutes les quantités —  $\frac{aq.dm.\cos V}{f^2}$ observerons que  $\alpha$  étant très petit ainsi que V, et f différant extrêmement peu de r; on peut supposer ici  $\cos V = 1$ , et f = r; ce qui réduit la quantité précédente à celle-ci :

$$-\frac{aq.dm}{r^2}$$

ag. dm. La ligne q peut être supposée parallèle à r; en nommant donc u la distance mutuelle de ces deux lignes, et a l'angle formé par un plan fixe passant par r, et par un autre plan passant par r et par q; on aura

ce qui donne

$$-\frac{\alpha}{r^2} \cdot \int q dm = -\frac{\alpha}{r^2} \cdot \int u du \cdot d\omega \cdot q dq.$$
Mégan, cél. Tome V.

Les intégrales doivent être prises depuis  $\varpi = 0$ , jusqu'à  $\varpi = 2\pi$ ; depuis q = 0, jusqu'à q = 2Q, 2Q étant la partie de la droite f comprise dans la sphère; enfin depuis u = 0, jusqu'à u = R. Il est visible que  $Q^a = R^a - u^a$ ; on aura ainsi

$$-\frac{\alpha}{r^2} \cdot fqdm = \frac{\alpha \pi \cdot R^4}{r^2};$$

l'attraction de la sphère sur le point P sera donc

is loi de l'attraction étai(
$$R \propto \frac{3}{4} \propto R$$
)  $\frac{R_0^3}{r^2} \left(1 - \frac{3}{4} \propto R\right)$  interestion a, pour cette

La réaction étant toujours égale à l'action, il est facile de voir que l'action de P sur le centre de la sphère, sera

L'attraction de la Teme que nou 
$$\xi$$
 suppose que la sphere dont il sant, sur ce point place à  $\xi$  ( $\frac{A}{a}$ )  $\frac{\xi}{a}$  entre de la Lune, sera par

P étant la masse du point.

Imaginons maintenant que ce point soit le Soleil, et que la sphère dont nous venons de parler soit la Terre; concevons ensuite que la Lune soit une sphère homogène dont R' soit le rayon;

$$\frac{P}{r^2} \cdot \left(1 - \frac{3}{4} \alpha' R'\right)$$

sera l'attraction du Soleil sur le centre de la Lune, à la distance r du Soleil; α' étant pour la Lune, ce qu'est α pour la Terre. La différence des actions du Soleil sur la Lune et sur la Terre sera donc

En faisant  $\alpha' = \alpha$ , cette différence devient

$$\frac{3P}{4r^2} \cdot \alpha (R - R').$$

On ne peut pas, par ce qui précède, supposer  $\alpha(R-R')$  plus grand que  $\frac{1}{1000000}$ ;  $\alpha R$  est donc une fraction moindre que  $\frac{1}{1000000}$ , c'està-dire que la force attractive de la molécule placée au centre de la

Terre, sur un point de sa surface, n'est pas diminuée d'un millionième, par l'interposition des couches terrestres.

L'attraction d'une molécule dm d'une sphère homogène dont le rayon est R, sur un point de sa surface dont elle est distante de f, est par ce qui précède,

$$\frac{dm}{f^2}(1-\alpha f);$$

l'attraction de la sphère entière sur ce point, est donc la même que si la loi de l'attraction était  $\frac{1}{f^2} - \frac{\alpha}{f}$ . Par le Livre XII on a, pour cette attraction,

La reaction étant toujou
$$(S_1 \times S_2 \times S_3 \times S_3 \times S_4 \times S_4$$

L'attraction de la Terre que nous supposerons être la sphère dont il s'agit, sur ce point placé à la distance r du centre de la Lune, sera par ce qui précède,

$$\frac{4}{3}\pi \cdot \frac{R^3}{r^3} \left(1 - \frac{3}{4}\alpha R\right);$$
 in masses at the second of the second of

mais relativement au centre de la Lune dont le rayon est supposé R', l'attraction de la Terre sera par ce qui précède,

$$\frac{4}{3}\pi \cdot \frac{R^3}{r^2} \left(1 - \frac{3}{4}\alpha R\right) \left(1 - \frac{3}{4}\alpha' R'\right);$$

elle est donc diminuée par l'interposition des couches lunaires, de sa valeur multipliée par la fraction  $\frac{3}{4} \alpha' R'$ . Si cette fraction n'était pas extrêmement petite, elle deviendrait sensible dans la parallaxe lunaire.

 $\alpha(R-R')$ 

On ne pent pas, par ce qui precede, supposer c(R = R) plus grand

in busint a == a, cette difference devient

que rocces a de la de la molteule place au centre de la

n étaient pas encore connues; mais ensuite elle fut généralement

Bradley indique le Vergent Religion des éclipses du premier satellite, dont le periode est de 437 jours. Il reconnut qu'il existe dans les retours des éclipses du second satellite une inegalité dont la périodomonomone.

### Wargentin, dans les Mémoires d'Upsal pour l'année 1743, a des THE PROPERTY OF SATELLITES DE JUPITER SO SOCIETA

ment du troisième satellite. Il avait encore remarqué dans le mouvement de ce dernier astre, deux équations du centre; mais ensuite il les a réduites à une seule équation d'une excentricité variable. Ention Bradley reconnut en 1717, l'ellipticité de l'orbe du quatrieme satellite

Notice historique des travaux des Astronomes et des Géomètres minées par les observations, toto tes rus rincipe de la besanteuronaire

erselle cut été appliqué à leurs mouvemens.

7. Galilée découvrit le 7 janvier 1610, les quatre satellites de Jupiter. Il détermina ensuite au moyen de leurs configurations, leurs distances au centre de Jupiter et les durées de leurs révolutions; ce que firent également plusieurs astronomes ses contemporains. Ces élémens, quoique déterminés par ce moyen imparfait, suffirent pour faire reconnaître à Képler, que le beau rapport qu'il avait trouvé entre les carrés des temps des révolutions des planètes et les cubes de leurs distances moyennes au centre de leurs mouvemens, existe dans le système des satellites de Jupiter. Mais ce fut par les observations de leurs éclipses, que l'on découvrit les inégalités de leurs

Le premier résultat qu'on ait obtenu par ce moyen, est la propagation de la lumière. Roëmer observa que les éclipses du premier satellite avancent vers les oppositions de Jupiter, et retardent vers ses conjonctions. Il expliqua en 1675 cette différence, par la différence des temps que la lumière du satellite emploie à parvenir à l'observateur, dans les diverses distances de Jupiter à la Terre. Cette explication de Roëmer éprouva quelques objections fondées sur ce qu'elle ne paraissait pas indiquée par les éclipses des autres satellites, où il était difficile de la reconnaître parmi leurs nombreuses inégalités qui n'étaient pas encore connues; mais ensuite elle fut généralement admise, et Bradley fonda sur elle, sa théorie de l'aberration des astres.

Bradley indiqua le premier la principale inégalité du retour des éclipses du premier satellite, dont la période est de 437 jours. Il reconnut qu'il existe dans les retours des éclipses du second satellite, une inégalité dont la période est la même.

Wargentin, dans les Mémoires d'Upsal pour l'année 1743, a développé ces inégalités, et il en a reconnu une pareille dans le mouvement du troisième satellite. Il avait encore remarqué dans le mouvement de ce dernier astre, deux équations du centre; mais ensuite il les a réduites à une seule équation d'une excentricité variable. Enfin Bradley reconnut en 1717, l'ellipticité de l'orbe du quatrième satellite. Telles sont les inégalités des satellites que les astronomes ont déterminées par les observations, avant que le principe de la pesanteur universelle eût été appliqué à leurs mouvemens.

Le retour des éclipses et leurs durées dépendant surtout de la position des orbites des satellites sur celle de Jupiter, les astronomes se sont spécialement occupés de l'inclinaison de ces orbites, et du mouvement de leurs nœuds; mais les variations de ces élémens sont si compliquées, qu'ils n'ont donné que des moyens empiriques et très imparfaits, pour les représenter. Ils ont trouvé que l'on pouvait supposer fixes à très peu près, l'inclinaison et le nœud de l'orbite du premier satellite. L'inclinaison de l'orbite du second satellite leur a paru variable, dans une période de 30 ans environ : le nœud leur a paru fixe, ou n'avoir qu'un très petit mouvement. Ils ont supposé l'inclinaison de l'orbite du troisième satellite, variable dans une période d'environ 132 ans, et le nœud fixe. Enfin, ils ont supposé fixe l'inclinaison de l'orbite du quatrième satellite, et le mouvement du nœud, direct et d'environ quatre minutes sexagésimales par année. L'incertitude de ces suppositions que les observations ultérieures ont obligé de modifier, faisait sentir la nécessité d'éclairer tous ces phénomènes, par l'application du principe de la pesanteur universelle qui devait en recevoir une grande confirmation. Déjà Bradley et Wargentin avaient attribué l'inégalité de 437 jours, aux attractions mutuelles des trois premiers satellites ; mais ce n'était de leur part qu'un simple aperçu dénué de tout calcul. Dans la proposition 66 du premier Livre des

Principes, Newton s'est occupé des perturbations du mouvement de plusieurs petits corps qui circulent autour d'un grand corps. Il trouve que le corps le plus intérieur se meut plus vite dans sa conjonction et dans son opposition au corps extérieur, que dans les quadratures. Il a de plus étendu aux satellites, dans le troisième Livre, quelques-uns des résultats de sa théorie lunaire. Mais ce ne fut qu'en 1766 que l'on appliqua l'analyse au mouvement des satellites de Jupiter; l'Académie des Sciences ayant proposé la théorie de ces mouvemens, pour le sujet du prix de Mathématiques de cette année.

Lagrange auteur de la pièce couronnée, y donne les équations différentielles du mouvement de ces astres, en ayant égard à leur action mutuelle, à l'attraction du Soleil et à l'ellipticité du sphéroïde de Jupiter. Il les intègre d'abord, en négligeant les excentricités et les inclinaisons des orbites, et il parvient aux inégalités dépendantes de l'élongation mutuelle des satellites, et d'où résultent dans le retour des éclipses des trois premiers, les inégalités dont la période est de 43-jours, et que Bradley et Wargentin avaient découvertes. Lagrange considère ensuite les inégalités dépendantes des excentricités et des inclinaisons des orbites. Ici se présentait à l'analyste, une grande difficulté dont le dénoûment donne l'explication des phénomènes singuliers observés par les astronomes, sans qu'ils en aient pu reconnaître les lois. Cette difficulté s'était déjà présentée à Euler et à Lagrange dans la théorie de Jupiter et de Saturne. J'ai développé dans le premier chapitre du livre précédent, la manière dont ces deux grands géomètres l'avaient résolue. La méthode dont Lagrange a fait usage pour cet objet, dans la théorie des satellites de Jupiter, est celle qu'il avait employée dans sa théorie de Jupiter et de Saturne. Elle consiste à regarder comme autant de variables, les termes des équations différentielles, qui par l'intégration acquièrent des diviseurs de l'ordre des forces perturbatrices; et à former entre les termes correspondans du rayon vecteur, de la longitude, et ces nouvelles variables, autant d'équations différentielles linéraires à coefficiens constans. En les intégrant, Lagrange obtient pour chaque satellite, quatre équations du centre. En appliquant la même analyse, aux équations différentielles de la latitude, il obtient pour chaque satellite, quatre équations principales de la latitude ; et pour les représenter, il imagine quatre plans dont le premier se meut sur l'orbite de Jupiter; le second se meut sur

le premier, le troisième sur le second, enfin le quatrième qui est celui de l'orbite du satellite, se meut sur le troisième. Mais ce grand géomètre ayant supposé que l'équateur de Jupiter est dans le plan de l'orbite de Jupiter, a fait disparaître par cette supposition, les termes dus à l'inclinaison de cet équateur sur l'orbite de la planète, et dont dépendent principalement les singuliers phénomènes aperçus par les astronomes dans le mouvement des orbites des satellites.

Lorsque Lagrange s'occupait de ces recherches, Bailli appliquait au mouvement des satellites de Jupiter les formules que Clairaut avait données dans sa Théorie de la Lune. Il reconnut les inégalités dont la période était de 43 7 mais cette théorie ne pouvait pas lui donner les quatre équations du centre que Lagrange avait obtenues par son analyse.

Mes premières recherches sur les satellites de Jupiter ont eu pour objet, les rapports que présentent les trois premiers satellites de Jupiter. et qui consistent en ce que 1°. le moyen mouvement du premier satellite, plus deux fois celui du troisième est égal à trois fois celui du second; 2°. la longitude moyenne du premier satellite, plus deux fois celle du troisième, est égale à trois fois la longitude du second, plus la demi-circonférence. L'approximation avec laquelle les mouvemens observés de ces astres satisfont à ces lois, depuis leur découverte, en indiquait l'existence avec une vraisemblance extrême. J'en cherchai donc la cause dans l'action mutuelle des trois satellites. L'examen approfondi de cette action me sit voir qu'il a suffi qu'à l'origine, les rapports des moyens mouvemens séculaires aient approché de la première de ces lois dans de certaines limites, pour que cette action ait établi ces deux lois et les maintienne en vigueur. Si par exemple, à un instant quelconque que l'on peut toujours prendre pour l'origine des mouvemens, l'angle formé par le moyen mouvement séculaire du premier satellite, moins trois fois celui du second, plus deux fois celui du troisième, a été compris entre les limites, plus ou moins vingt circonférences; l'action mutuelle des trois satellites a fini par rendre cet angle nul. Or on voit dans le nº 20 du Livre VIII, que Delambre a trouvé par un très grand nombre d'éclipses observées, qu'en 1700, ce même angle n'a pas excédé deux secondes sexagésimales; la première des deux lois précédentes est donc

rigoureuse. Il en résulte, suivant la théorie, que l'angle formé par la longitude moyenne du premier satellite, moins trois fois celle du second, plus deux fois celle du troisième, est ou nul ou égal à la demi-circonférence; et l'on conclut des distances moyennes de ces trois corps au centre de Jupiter, que le second cas est celui qui a lieu dans la nature. C'est, en effet, ce que l'observation confirme; car on voit par le numéro cité du Livre VIII, que Delambre a trouvé qu'en 1750, cet angle était au-dessous de soixantequatre secondes sexagésimales. Ce savant astronome a donc assujetti ses tables aux deux lois précédentes qui ne sont altérées ni par les équations séculaires des satellites, ni par la résistance des milieux éthérés. Ces équations séculaires se modifient par l'action mutuelle de ces astres, de manière que l'équation séculaire du premier satellite, plus deux fois celle du troisième est égale à trois fois celle du second. En vertu de ces lois, les inégalités du retour des éclipses, dont la période est de 437 jours, seront toujours les mêmes.

Ces lois déterminent deux des dix-huit constantes arbitraires que renferme nécessairement la théorie du mouvement des trois premiers satellites; il faut donc qu'elles soient remplacées par deux autres arbitraires. Elles le sont en effet, par une oscillation de l'angle formé par la longitude du premier satellite, moins trois fois celle du second, plus deux fois celle du troisième, angle que je nomme par cette raison, libration des trois premiers satellites. Cette oscillation est analogue à celle d'un pendule qui ferait une oscillation en 1135 jours. L'étendue de l'oscillation et l'instant où elle commence sont les deux arbitraires qui remplacent celles que les lois précédentes font disparaître. Mais Delambre n'a pu reconnaître par les observations, l'existence de cette oscillation; ce qui prouve qu'elle est insensible. Il est vraisemblable qu'à l'origine, des causes particulières l'ont anéantie, ainsi que la libration du grand axe du sphéroide lunaire, qui remplace les deux arbitraires que l'égalité des mouvemens moyens de rotation et de révolution de la Lune fait dispaun plan incliné d'envican huit secondes sexegéamales sur l'é

Les recherches précédentes ont parû dans le volume des Mémoires de l'Académie des Sciences, de l'année 1784, et qui a été publié en 1787; elles m'ont fait reprendre toute la théorie des satellites de Jupiter, que les travaux des astronomes et des géomètres laissaient, comme on l'a vu, très imparfaite. Il était nécessaire pour en tirer des

Mean da. Tome V.

tables exactes de leurs mouvemens, d'y faire entrer un grand nombre de considérations nouvelles, soit pour démêler toutes les inégalités qui deviennent sensibles par les intégrations, soit pour reconnaître l'influence réciproque de ces diverses inégalités. C'est ainsi qu'en appliquant à ces astres, les formules très simples des variations séculaires des élémens elliptiques, que j'avais trouvées auparavant; j'ai reconnu l'influence qu'avaient sur ces variations les grandes inégalités dont la période dans le retour des éclipses est de 437<sup>jours</sup>. J'ai reconnu pareillement l'influence de la libration des trois premiers satellites, sur leurs inégalités à longues périodes, telles que l'inégalité dépendante de l'équation du centre de Jupiter.

Un des élémens les plus importans de la théorie des éclipses des satellites, est la position de leurs orbites sur celle de Jupiter. Il est indispensable pour la déterminer, d'avoir égard à l'inclinaison de l'équateur de cette planète, inclinaison dont les phénomènes singuliers observés par les astronomes dépendent principalement. L'analyse m'a conduit à ce résultat remarquable. Pour avoir la position de l'orbite d'un satellite sur celle de Jupiter, on doit imaginer cinq plans dont le premier fixe à très peu près, passe entre l'équateur et l'orbe de Jupiter, par leur intersection, et en conservant sur eux, une inclinaison à très peu près constante; le second plan se meut uniformément sur le premier auquel il est toujours incliné d'une quantité constante ; le troisième plan se meut de la même manière sur le second; le quatrième plan se meut semblablement sur le troisième; enfin le cinquième plan qui est celui de l'orbite même du satellite se meut de la même manière sur le quatrième. Ces plans fixes ne sont pas les mêmes pour les quatre satellites : celui de chaque satellite est d'autant moins incliné à l'équateur, que le satellite est plus près de la planète. La même chose a lieu pour la Lune. Son inégalité en latitude dépendante de l'aplatissement de la Terre, vient de ce que le plan de son orbite, au lieu de se mouvoir uniformément sur l'écliptique, se meut uniformément sur un plan incliné d'environ huit secondes sexagésimales sur l'écliptique et qui passe constamment par les équinoxes, entre l'écliptique et l'équateur. C'est encore ainsi que l'anneau de Saturne et ses premiers satellites sont retenus à fort peu près dans le plan de l'équateur de cette planète. 10 mobs asi de anno

L'axe du cône d'ombre dans lequel les satellites de Jupiter sont MÉCAN, CÉL. Tome V.

plongés pendant leurs éclipses, étant le prolongement du rayon vecteur de cette planète; il est visible que pour calculer ces éclipses, il faut connaître la position de ce rayon et par conséquent le mouvement de Jupiter. Delambre a construit d'après ma théorie de Jupiter et de Saturne, des tables de ce mouvement, que M. Bouvard a encore perfectionnées.

Après avoir formé les expressions analytiques des mouvemens des satellites de Jupiter, il restait à déterminer par les observations, trente-une inconnues, savoir les vingt-quatre constantes arbitraires introduites par les intégrations, les masses de ces astres, l'aplatissement de Jupiter, l'inclinaison de l'équateur de Jupiter à l'orbite de cette planète et la position des nœuds de cet équateur. Ce travail immense a été exécuté par Delambre qui a discuté pour cet objet, toutes les observations d'éclipses des satellites de Jupiter, et dont le nombre était d'environ six mille. Il a construit de nouvelles tables de ces astres, dont tout empirisme est banni : leur exactitude les a fait généralement adopter, et elles sont un des principaux titres de ce savant illustre à la reconnaissance des astronomes.

Depuis la publication de ces tables, j'ai recherché l'influence que les grandes inégalités de Jupiter ont sur le mouvement de ses satellites. Je vais présenter ici l'analyse que j'ai employée, et les résultats que j'ai obtenus.

Lieure lex passeron de la contact de trainer Contre send there de la contre de la c

pour calculer ces éclipses.

# et de Satjame, yles tables V. APTICA H. Bouyard a encore perfectionnées. Après avoir formé les expressions analytiques des mouvemens des

satellites de Jupiter, it 10596028 Actagnister par les observations,

ment de Juoiler. Delambre a construit d'après me théorie de Jupiter

De l'influence des grandes inégalités de Jupiter sur les mouvemens de ses satellites.

8. Pour déterminer cette influence, je reprends l'expression des perturbations en longitude, donnée par la formule (2) du n° 2 du Livre VIII. Il est facile de voir que dans cette expression, le terme

$$\frac{2a}{\omega}$$
. Indt.  $r\left(\frac{dR}{dr}\right)$ 

est le seul qui puisse donner une inégalité sensible, dépendante de la grande inégalité de Jupiter. Dans ce terme, a est la distance moyenne du satellite à Jupiter, nt est son moyen mouvement; r est son rayon vecteur, et  $\mu$  est la masse de Jupiter. Par le n° 1 du même Livre, l'expression de R contient le terme  $\frac{-Sr^2}{4r^{n\sqrt{3}}}$ , S étant la masse du Soleil, et  $r^{n}$  étant le rayon vecteur de Jupiter. C'est le seul terme a considérer ici; en a donc

$$\frac{2a}{\mu} \cdot \int ndt \cdot r\left(\frac{dR}{dr}\right) = \frac{-aS}{\mu} \cdot \int \frac{ndt \cdot r^2}{r^{1}v^3}.$$

La partie de la variation de r', dépendante de la grande inégalité de Jupiter, est par le n° 23 du Livre X,

-0,002008 
$$\cdot \cos(n^{1} t + \varepsilon^{1} - x)$$
  
-0,000264  $\cdot \cos(x + 48^{\circ}, 27)$ ;

n'vt+ e'v est la longitude moyenne de Jupiter, et l'on a

$$x = 5n^{\nu}t + 5\epsilon^{\nu} - 2n^{\nu}t - 2\epsilon - 61^{\circ},77$$
:

n't + ε' est la longitude moyenne de Saturne, et les degrés sont centésimaux. Nous pouvons donc ici réduire l'expression du rayon vecteur de Jupiter du n° 23 du Livre cité, à la suivante,

$$r^{1V} = 5,208735 - 0.249994 \cdot \cos(n^{1V}t + \epsilon^{1V} - \varpi^{1V})$$
  
- 0,002008 \cdot \cos(n^{1V}t + \epsilon^{1V} - x)  
- 0,000264 \cdot \cos(x + 48°,27).

Or on a

le terme - a findt.ra, donne donc le suivant dup el emercial de couvent en 1759, le premier et le secouvrit en 1759, le premier et le seco

$$\frac{-3n^{1v^2}}{n \cdot (5n^v - 2n^{1v})} + \frac{0,000264}{5,208731} \cdot \sin(x + 48^\circ, 27) = 0.0015$$

ce qui donne relativement au quatrième satellite, l'inégalité

$$-44'',334 \cdot \sin(x+25^{\circ},41)$$
.

Les trois premiers satellites sont assujettis à des inégalités semblables; mais leur période étant fort longue, leurs coefficiens sont modifiés par l'action mutuelle de ces corps, et ils deviennent relativement au premier, au second et au troisième moddans sont estate en entire et en premier.

Mémoires de l'Academie des Sciences pour l'aunée 1714, ses observations d'après leb 77. Let a 3748, Let de cit 90 let est inclinée au plan de d'anneau d'environ 15 à 16 degrés sexagésiment, et que ses nœuds avec d'ecliptique s'écartent vers l'Occident de 17 degrés, des nœuds de l'anneau. Il à terminé son Mémoire par le passage suivant que je rapporte à cause de son analogie avec la véritable explication de ce phénomène.

(\*) Maiatenant Tereprieme - 5et - 2n'te - 2e - 61° 77 :

art de et est la longitude movementes Saturiles det les degrés sont centé-

### CHAPITRE VII.

n rellite, so, ceptre de su o, ocosod d'edn (v'il el e' un x') es satellites a rellites direction du o, ocosod d'edn (v'il ell's) pa s'eloignan

de Jupitet du po 23 du Livre che pa la salvaine a

## DES SATELLITES DE SATURNE ET D'URANUS.

9. Huygens découvrit en 1655, le sixième des satellites de Saturne. Ouelques années après, Dominique Cassini découvrit successivement le troisième, le quatrième, le cinquième et le septième. Enfin Herschel découvrit en 1789, le premier et le second. On a déterminé les moyens mouvemens de ces astres et leurs distances moyennes au centre de Saturne, et l'on a reconnu entre les cubes de ces distances et les carrés des temps des révolutions, le beau rapport que Képler avait trouvé entre les mêmes quantités relatives aux planètes. Mais comme on n'a pas à l'égard de ces astres, le secours des observations de leurs éclipses; on est loin de connaître toutes les inégalités de leurs mouvemens : seulement, on a reconnu que l'orbe du sixième satellite est elliptique. M. Bessel dans le Journal de Gotha pour l'année 1811. a trouvé son excentricité égale à 0,0488759. Tous ces corps ont paru se mouveir dans le plan de l'anneau, à l'exception du sixième et principalement du septième. Jacques Cassini a observé que l'orbite du septième s'écarte très sensiblement de ce plan. Il a publié dans les Mémoires de l'Académie des Sciences pour l'année 1714, ses observations d'après lesquelles il a estimé que cette orbite est inclinée au plan de l'anneau, d'environ 15 à 16 degrés sexagésimaux, et que ses nœuds avec l'écliptique s'écartent vers l'Occident de 17 degrés, des nœuds de l'anneau. Il a terminé son Mémoire par le passage suivant que je rapporte à cause de son analogie avec la véritable explication de ce phénomène.

« La situation des nœuds du cinquième satellite (\*), et l'inclinaison

» de son orbe qui sont si différentes de celles des autres, semblent dén ranger l'économie du système des satellites qu'on avait cru jusqu'à » présent avoir tous, les mêmes nœuds et être à peu près dans un » même plan. Cependant, il paraît qu'on peut en rendre aisément la » raison physique, si l'on fait attention à la grande distance de ce sa-» tellite au centre de Saturne; car l'effort qui entraîne les satellites » suivant la direction du plan de l'anneau s'affaiblit en s'éloignant » de Saturne, et est obligé de céder à un autre effort qui emporte » Saturne et toutes les planètes saivant l'écliptique. Ces deux efforts » agissant sur le cinquième satellite suivant des directions inclinées » l'une à l'autre de 31 degrés; il résulte qu'il doit faire son cours » suivant une direction movenne entre le plan de l'anneau et celui » de l'écliptique. Il paraît même que selon ce raisonnement, les plans » des orbes des autres satellités doivent un peu décliner du plan de » l'anneau, quoique beaucoup moins que celui du cinquieme satellite; » ce qui nous a para s'accorder à quelques observations. »

Cassini n'assigne point les causes des deux efforts qu'il suppose, mais la théorie de la pesanteur universelle donne ces deux causes. La première est l'attraction de la protubérance de l'équateur de Saturne, produite par la rotation de cette planète. Cette attraction maintient l'anneau et les premiers satellites à peu près dans le plan de cet équateur, et s'affaiblit très rapidement, quand les distances moyennes des satellites sont plus grandes. La seconde cause est l'attraction du Soleil sur les satellites, qui tend à les abaisser sur le plan de l'orbite de leur planète. En vertu de ces causes, l'orbite de chaque satellite se meut sur un plan qui passe entre l'équateur et l'orbite de Saturne par leur intersection, et qui s'écarte d'autant plus du plan de l'anneau, que le satellite est plus éloigné.

M. Bessel dans le Journal cité, a trouvé l'inclinaison de l'orbite du sixième satellite, plus petite que celle de l'anneau, d'environ deux degrés. J'ai déterminé dans le huitième Livre, l'inclinaison et le mouvement du nœud de l'orbe du septième satellite, en employant principalement les observations faites par Bernard à Marseille, en 1787. Mais ces observations et toutes celles que l'on à faites sur ces satellites sont imparfaites et peu nombreuses. Les astronomes se sont peu occupés de ce genre d'observations qui cependant offrent beaucoup d'intérêt par elles-mêmes, et par la lumière qu'elles doivent répandre

sur les masses de l'anneau et des satellites, et sur l'aplatissement du sphéroide de Saturne.

Herschel découvrit en 1787 six satellites à la planète Uranus qu'il avait découverte en 1781. Les deux premiers qu'il ait vus, sont dans l'ordre des distances, le second et le quatrième. Ces deux satellites ont été aperçus par d'autres astronomes; ainsi leur existence ne doit laisser aucun doute. L'existence de quatre autres ne paraît pas aussi certaine. Les heureux essais que l'on vient de faire pour augmenter le pouvoir des lunettes astronomiques, donnent lieu d'espèrer que l'on aura bientôt les moyens de suivre avec autant d'exactitude que de facilité, les mouvemens de ces astres. Ils paraissent se mouvoir dans un plan presque perpendiculaire à l'écliptique, ce qui indique dans la planète, un mouvement rapide de rotation autour d'un axe presque parallèle à l'écliptique.

Ces satellites obéissent à la loi de Képler, suivant laquelle les carrés des temps des révolutions sont proportionnels aux cubes des movennes distances. C'est ce que l'on a vérifié par l'observation à l'égard des deux satellites premièrement découverts. On en a conclu la masse d'Uranus égale à 1/19504, de celle du Soleil. M. Bouvard a trouvé cette masse égale à 17918, au moyen des perturbations du mouvement de Saturne par l'action d'Uranus. La différence de ces deux valeurs paraîtra bien peu considérable, si d'une part, on considère l'incertitude des mesures des plus grandes élongations de ces satellites, et l'ignorance où nous sommes des excentricités de leurs orbites; et si d'une autre part, on considère la petitesse des perturbations dues à planere. En vertu de ces causes, s'orbite de chaque .zurar D'action d'Uranus.

inversection, et qui s'écarse d'autant plus du plan de l'anneau, que le

M. Bessel dans le Journal ente, a touve l'inclination de l'orbite du

axième satellite, plus petite que celle de l'anneau, d'environ deux degrés. J'ai détermine dans le hutteme Lavre, l'incinaison et le meuvement du roeud de l'orbe du septième satellite, en employant principalement les observations faites par Bernard à Marseille, en 1787 Mais ees observations et toutes celles que l'on à faites sur c's satellites some imperfaites et peu nombreuses. Les astronomes se cont peu occupés de es genre d'observations qui cependant offrent beaucoup d'interêt par elles-mêmes, et par la lumière qu'elles doivent repandre

Errata du cinquième volume.

sur les masses de l'anneau et des satellites, et sur l'oplatissement du

Page 248, avant-dernière ligne, après le mot facteur, ajoutez l'unité divisée par

250, ligne 7, au lieu de Méchin lisez Machin.

252, ligne 1, effacez ces mots: par rapport à l'équinoxe

278, ligne 13, effacez les mots parallélisme de

289, ligne 4, au lieu de seconde lisez minute

318, ligne 5 en remontant, au lieu de molécule attirante lisez molécule perturbatrice attirante

251, ligne 2, même correction. Dipunonous seronal seb no mode

350, dans la note, au lieu de Hooek lisez Hook and an ille les and

368, ligne 12, au lieu de somme produit lisez somme des produits

369, ligne 4 en remontant, au lieu de vecteurs lisez osculateurs

387, ligne 19, au lieu de grand lisez petit soullaise zoob 290 bises [

la masse d'Uranus egale à 19594, de celle du Soleil. M. Leuvard a trouvé cette masse egale à 17918, au moyen des perumbations du mou-

vement de Saturne par l'action d'Urarus. La cillérence de ces deux valeurs paraltra bien peu considérable, si d'une part, on considére l'incertifude des mesures des plus grandes élongations de ces satellites.

et l'ignorance où nous sommes des executricités de leurs orbites, et si-

d'une autre part, on considére la petitesse des perturbations dues a l'action d'Uranus.

reflection et characterie d'animar ples els provide l'apprecia, que le reflese estrelles characteriste. Le Bankel dans le Foncial est en l'appreci l'accomation de l'orbite plu

ried notice to describe the contract of the co

coment de dente de libéle de septième aresure, on employant procapabliment des observations fortes une Bernard à Municipe, en a 1870. Mons des observations et toutes celles que l'en a faites sur sos satel-

Risis some demandables et peu combinadores. Les estrationes es sont peu necuers du cu genre l'elles restintes qui expresidant différent bequesup transfet que alles mismos es nin le fraction médites dels contrainers

d'socrét par elles mêmes, et par le lumière adelles dois est répandre

Or momins L. Barry Mourice de la part des fils de L'auseur.

## SUPPLÉMENT

AU 5° VOLUME

DU

## TRAITÉ DE MÉCANIQUE CÉLESTE;

PAR M. LE MARQUIS DE LAPLACE.

I IMPRIMÉ SUR LE MANUSCRIT TROUVÉ DANS SES PAPIERS.

1827.

Or morning to Dawy Mourie

## SUPPLÉMENT

AU TO VOLUME

THAITE DE MÉCANIQUE CELESTE:

PAR WALCOUS DETAPLACE

70.5

## SUPPLÉMENT

### AU 5° VOLUME

DU

### TRAITÉ DE MÉCANIQUE CÉLESTE;

### PAR L'AUTEUR.

[IMPRIMÉ SUR LE MANUSCRIT TROUVÉ DANS SES PAPIERS.]

En publiant mon Traité de Mécanique céleste, j'ai désiré que les Géomètres en vérifiassent les résultats, et spécialement ceux qui me sont propres. Les résultats de la théorie du Système du Monde sont, pour la plupart, si distans des premiers principes, que leur vérification est nécessaire pour en assurer l'exactitude. Les Géomètres qui s'en occupent font donc une chose utile à l'Astronomie. Je dois, comme savant et comme auteur, beaucoup de reconnaissance à ceux qui ont bien voulu prendre mon Ouvrage pour texte de leurs discussions, et qui par là m'ont fourni l'occasion d'éclaircir quelques points délicats traités dans cet Ouvrage. Ce sont ces éclaircissemens et quelques recherches nouvelles qui sont l'objet de ce Supplément.

Sur le développement en série du radical qui exprime la distance mutuelle de deux planètes.

ment par ane integrale definie, le

ternic general dit second dere-

1. En considérant cet objet dans les nº 3 du livre XI et du livre XV de la Mécanique céleste, je me suis spécialement proposé de faire voir, par un exemple intéressant, l'utilité des méthodes que j'ai exposées

avec étendue dans ma Théorie analytique des Probabilités; l'une, pour obtenir en intégrales définies les variables données par des équations linéaires aux différences finies à coefficiens variables; l'autre, pour avoir, par des approximations rapides et convergentes, les intégrales définies, fonctions de très grands nombres. C'est surtout dans le développement des fonctions en séries que ces méthodes sont utiles pour avoir les limites des termes de ces développemens, et pour reconnaître si les séries qui en résultent sont convergentes. Je nomme limites, les valeurs dont les termes du développement approchent sans cesse à mesure que leur rang est plus considérable, et qui coïncident avec elles dans l'infini. Si l'on nomme r et r' les distances mutuelles de deux corps qui s'attirent, à un même point fixe, et  $\theta$  l'angle compris entre ces distances, la distance mutuelle de ces deux corps sera  $\sqrt{r^2-2rr'\cos\theta+r'^2}$ . On sait combien le développement du radical

$$\frac{1}{\sqrt{r^2 - 2rr' \cdot \cos\theta + r'^2}}$$

est important dans les théories de la figure et des perturbations des planètes.

Or, supposant r' > r, et faisant  $\frac{r}{r'} = \alpha$ , on peut développer le radical  $(1-2\alpha.\cos\theta+\alpha^a)^{-\frac{1}{2}}$ , soit par rapport aux puissances de  $\alpha$ , soit par rapport aux cosinus de l'angle  $\theta$  et de ses multiples. Le premier de ces développemens est nécessaire dans la théorie de la figure des planètes; et le second, dans la théorie des perturbations. Dans le n° 3 du livre XI cité, j'ai exprimé par une intégrale définie, le terme général du premier développement, et j'ai donné une limite de cette expression, qui devient de plus en plus compliquée, à mesure que le nombre des termes augmente. Dans le n° 3 du livre XV, j'ai cherché à exprimer pareillement par une intégrale définie, le terme général du second développement.

Si l'on désigne par  $\alpha^i p^{(i)}$ , le terme général du radical  $(1-\alpha \cdot \cos \cdot \theta + \alpha^2)^{-\frac{1}{\alpha}}$  développé suivant les puissances de  $\alpha$ , on a, par le n° 23 du troisième livre de la Mécanique céleste,

$$p^{(i)} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots 2i - 1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots i} \cdot \left\{ \cos^{i} \cdot \theta - \frac{i \cdot i - 1}{2 \cdot 2i - 1} \cdot \cos^{i - 2} \cdot \theta + \frac{i \cdot i - 1}{2 \cdot 2i - 1} \cdot \frac{i - 3}{2i \cdot 2i - 1} \cdot \cos^{i - 4} \cdot \theta - \text{etc.} \right\}; (1)$$

lorsque i est un grand nombre, cette expression contient un grand nombre de termes; mais j'ai prouvé, dans le n° cité du livre XI, qu'alors elle se réduit à très peu près à

$$\frac{\cos \left[\left(i+\frac{1}{2}\right).\theta-\frac{1}{4}\pi\right]}{\sqrt{\frac{1}{2}\pi i.\sin \theta}},$$

 $\pi$  étant la demi-circonférence dont le rayon est l'unité. Je vais ici confirmer ce résultat singulier par une autre méthode.

On a par les nos 8 et 9 du troisième livre de la Mécanique céleste,

$$0 = i \cdot \overline{i + 1 \cdot p^{(i)}} + \left(\frac{ddp^{(i)}}{d\theta^2}\right) + \frac{dp^{(i)}}{d\theta} \cdot \frac{\cos \theta}{\sin \theta}; \quad (2)$$

exprimons l'intégrale de cette équation par

$$p^{(i)} = u \cdot \cos \cdot a\theta + u' \cdot \sin \cdot a\theta$$

u et u' étant fonctions de  $\theta$ , et a étant supposé égal à  $i.\overline{i+1}$ . En substituant cette valeur dans l'équation (2), et comparant séparément les coefficiens de sin.  $a\theta$  et de cos.  $a\theta$ , on aura

$$2 \frac{du}{d\theta} + u \cdot \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\frac{ddu'}{d\theta^2} + \frac{du'}{d\theta} \cos \theta}{a};$$

$$2 \frac{du'}{d\theta} + u' \cdot \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{-\frac{ddu'}{d\theta^2} - \frac{du}{d\theta} \cdot \cos \theta}{a}.$$

Ces équations donnent, en négligeant les termes divisés par a, et en les intégrant,

$$u = H.\sin^{-\frac{1}{2}}\theta; \quad u' = H'.\sin^{-\frac{1}{2}}\theta;$$

H et H' étant deux constantes arbitraires. Si l'on fait

$$u = H \cdot \sin^{-\frac{1}{2}}\theta + \frac{X}{a}; \quad u' = H' \cdot \sin^{-\frac{1}{2}}\theta + \frac{X'}{a};$$

les équations différentielles précédentes donneront les valeurs de X et de X'. En continuant ainsi, on aura les valeurs de u et de u', et par conséquent celle de  $v^{(i)}$  développée suivant les puissances de  $\frac{1}{a}$ . Nous ne considérerons iei que les termes indépendans de  $\frac{1}{a}$ ; et alors on

aura

$$p^{(0)} = C \cdot \sin^{-\frac{1}{2}} \cdot \theta \cdot \cos \cdot (a\theta + \epsilon),$$

C et  $\varepsilon$  étant deux constantes arbitraires qu'il faut déterminer. Pour cela, je suppose  $\theta = \frac{\pi}{2}$ ,  $\pi$  étant la demi-circonférence dont le rayon est l'unité : j'observe ensuite que si l'on néglige les termes de l'ordre  $\frac{1}{i}$ , on a  $a = i + \frac{1}{4}$ ; on a donc alors

$$p^{(i)} = \mathbb{C} \cdot \cos \left\{ \left(i + \frac{1}{a}\right) \cdot \frac{\pi}{2} + \epsilon \right\}.$$

On voit par l'équation (1) que i étant impair, et  $\theta$  étant  $\frac{\pi}{2}$ , la valeur de  $p^{(i)}$  est nulle; on a donc  $\epsilon = -\frac{1}{4}\pi$ , et par conséquent on a, quel que soit  $\theta$ ,

$$p^{(i)} = \text{C.}\sin^{-\frac{1}{2}}\theta.\cos\left\{(i+\frac{1}{2})\theta-\frac{\pi}{4}\right\}.$$

Pour déterminer la constante C, j'observe que si l'on suppose i pair et égal à 2s, l'équation (1) donne, lorsque  $\theta = \frac{\pi}{2}$ ,

$$p^{(0)} = \pm \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot 2s - 1}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2s} = \pm \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 2s}{2^{2s} \cdot (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot s)^{2}},$$

le signe supérieur ayant lieu si s est pair, et l'inférieur si s est impair. On a à très peu près, par les formules connues, lorsque s est un grand nombre,

1.2.3... 
$$s = s^{s+\frac{1}{2}} \cdot c^{-s} \cdot \sqrt{2\pi};$$
  
1.2.3...  $2s = (2s)^{2s+\frac{1}{2}} \cdot c^{-2s} \cdot \sqrt{2\pi}.$ 

On aura ainsi

$$p^{(i)} = \pm \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{a}i\pi}};$$

ce qui donne

$$C = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{a}i_{\pi}}}.$$

L'expression générale de p<sup>(t)</sup> est donc

$$\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}i\pi \cdot \sin \cdot \theta}} \cdot \cos \cdot \left\{ \left(i + \frac{1}{2}\right) \cdot \theta - \frac{1}{4}\pi \right\}.$$

2. Je passe maintenant au développement du radical  $(1-2\alpha.\cos\theta+\alpha^2)^{-\frac{1}{2}}$ , suivant les puissances de  $\alpha$ . En désignant par

$$\frac{1}{4}b_{\frac{1}{2}}^{(0)}+b_{\frac{1}{2}}^{(1)}.\cos.\theta+b_{\frac{1}{2}}^{(2)}.\cos.2\theta....+b_{\frac{1}{2}}^{(i)}.\cos.i\theta+\text{etc.},$$

le développement de ce radical, on parvient fort simplement, par l'analyse du n° 3 du livre XV de la Mécanique céleste, à cette expression de  $b_{\underline{1}}^{(i)}$ ,

$$b_{\frac{1}{a}}^{(i)} = \frac{4a^{i}}{\pi} \cdot \int_{0}^{1} \frac{(1-t^{2})^{i}dt}{\sqrt{(1-t^{2}) \cdot (1-\alpha^{2}+\alpha^{2}t^{2})}},$$

qui, lorsque i est très grand, se réduit à fort peu près à

$$\frac{2a^i}{\sqrt{i\pi.(1-a^2)}}.$$

Dans le n° cité, je n'ai trouvé que le quart de cette valeur, parce que j'ai supposé par inadvertance, que la série

$$\frac{1.3.5....2i-1}{2.4.6...2i} \cdot \left\{ 1 + \frac{2i+1}{2i+2} \cdot \alpha^2 + \text{etc.} \right\}$$

est l'expression de  $2b_{\frac{1}{2}}^{(i)}$ , tandis qu'elle n'exprime que  $\frac{1}{4}b_{\frac{1}{2}}^{(i)}$ , comme il est facile de le voir. Il faut donc, à la page 338 du tome V de la Mécanique céleste, ligne 8, écrire  $\frac{1}{4}b_{\frac{1}{2}}^{(i)}$ , au lieu de  $2b_{\frac{1}{2}}^{(i)}$ ; à la page 339, ligne 4, il faut écrire  $\frac{1}{4}b_{\frac{1}{2}}^{(i)}$  au lieu de  $b_{\frac{1}{2}}^{(i)}$ ; ligne 10, il faut changer  $\frac{1}{2\pi}$  dans  $\frac{2}{\pi}$ ; et ligne 12, il faut changer  $\alpha^i$  dans  $4\alpha^i$ , et  $(1-t^2)^{i-\frac{1}{2}}$  dans  $(1-t^2)^i$ .

### Sur le développement des coordonnées elliptiques.

3. L'excentricité des orbes elliptiques planétaires étant peu considérable, on développe le plus souvent le rayon vecteur et l'anomalie vraie en séries ordonnées suivant ses puissances. Mais si l'excentricité, qui dans les orbes elliptiques ne surpasse jamais l'unité, en devenait fort approchante; on conçoit que les séries pourraient cesser

d'être convergentes. Il importe donc de connaître si parmi les valeurs comprises entre zéro et l'unité, que l'excentricité peut avoir, il en est une au-dessus de laquelle ces séries seraient divergentes; et dans ce cas, de la déterminer. Prenons pour unité le demi grand axe de l'ellipse : désignons par e son excentricité, par t l'anomalie moyenne comptée du périgée, et par R le rayon vecteur; on aura par le n° 22 du second livre de la Mécanique céleste,

$$R = 1 + \frac{e^{2}}{2} - e \cdot \cos \cdot t$$

$$- \frac{e^{2}}{1 \cdot 2} \cdot \cos \cdot 2t$$

$$- \frac{e^{3}}{1 \cdot 2 \cdot 2^{2}} \cdot (3 \cdot \cos \cdot 3t - 3 \cdot \cos \cdot t)$$

$$- \frac{e^{4}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2^{3}} \cdot (4^{2} \cdot \cos \cdot 4t - 4 \cdot 2^{2} \cdot \cos \cdot 2t)$$

$$- \frac{e^{5}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 2^{4}} \cdot (5^{3} \cdot \cos \cdot 5t - 5 \cdot 3^{3} \cdot \cos \cdot 3t + \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} \cos \cdot t)$$

$$- \frac{e^{5}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 2^{5}} \cdot (6^{4} \cdot \cos \cdot 6t - 6 \cdot 4^{4} \cdot \cos \cdot 4t + \frac{6 \cdot 5}{1 \cdot 2} \cdot \cos \cdot 2t)$$

$$- \text{etc.}$$

Le terme général de cette expression est

$$-\frac{e^{i}}{1.2.3...i-1.2^{i-1}} \left\{ \begin{array}{l} i^{i-a} \cdot \cos \cdot it - i \cdot (i-2)^{i-a} \cdot \cos \cdot (i-2)t \\ +\frac{i \cdot i-1}{1.2} \cdot (i-4)^{i-a} \cdot \cos \cdot (i-4)t \\ -\frac{i \cdot i-1}{1.2.3} \cdot (i-6)^{i-a} \cos \cdot (i-6)t \\ +\text{etc.} \end{array} \right\};$$

la série étant continuée jusqu'à ce que l'on arrive à un facteur  $(i-2r)^{i-1}$  dans lequel i-2r soit négatif. Si l'on fait t égal à un angle droit, ce terme devient nul lorsque i est impair; et dans le cas de i pair, il devient, abstraction faite du signe, égal à

$$\frac{e^{i}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot ... i - 1 \cdot 2^{i-2}} \cdot \left[ i^{i-2} + \frac{i}{1} \cdot (i-2)^{i-2} + \frac{i \cdot i - 1}{1 \cdot 2} \cdot (i-4)^{i-2} + \text{etc.} \right]; (a)$$

et il est alors le plus grand possible. Déterminons sa valeur, lorsque i est un très grand nombre.

Il est facile de voir que les termes de la série

$$i^{i-2} + \frac{i}{1} \cdot (i-2) + \frac{i \cdot \overline{i-1}}{1 \cdot 2} \cdot (i-4)^{i-2} + \text{etc.}; (a')$$

vont d'abord en croissant, et qu'ils ont un maximum après lequel ils diminuent. A ce maximum, deux termes consécutifs sont à très peu près égaux. Soit

$$\frac{i.\overline{i-1}.\overline{i-2}...\overline{i-r+1}}{1.2.3...r}.(i-2r)^{i-2}$$

le terme maximum. Le terme qui le précède, sera

$$\frac{i.\overline{i-1}...\overline{i-r+2}}{1.2.3...\overline{r-1}}.(i-2r+2)^{i-2};$$

en égalant donc ces deux termes, on aura

$$\frac{i-r+1}{r} \cdot (i-2r)^{i-2} = (i-2r+2)^{i-2}.$$

Cette équation donne la valeur de r, et par conséquent, le rang que le terme le plus grand occupe dans la série. Si l'on prend les logarithmes des deux membres, on a

$$\log \left(\frac{i-r+1}{r}\right) = (i-2) \cdot \log \left(1 + \frac{2}{i-2r}\right);$$

011

$$\log \left(\frac{i-r}{r}\right) + \log \left(1 + \frac{1}{i-r}\right) = (i-2) \cdot \log \left(1 + \frac{2}{i-2r}\right); (b)$$

or on a, lorsque i et r sont de très grands nombres,

log. 
$$\left(1 + \frac{1}{i - r}\right) = \frac{1}{i - r} - \frac{1}{2 \cdot (i - r)^2} + \text{etc.};$$

$$\log \left(1 + \frac{2}{i-2r}\right) = \frac{2}{i-2r} - \frac{2}{(i-2r)^2} + \text{etc.};$$

l'équation (b) deviendra donc , en négligeant les termes de l'ordre  $\frac{1}{i}$ ,

$$\log \left(\frac{i-r}{r}\right) = \frac{2i}{i-2r};$$

ce qui donne

counst as interrupted in the results of the 
$$c^{\frac{2i}{r-2r}} = c^{\frac{2i}{r-2r}}$$
 of  $c^{\frac{2i}{r-2r}}$  of  $c^{\frac{2i}{r-2r}}$  of  $c^{\frac{2i}{r-2r}}$ 

c étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité. En faisant  $r = \omega i$ , on aura

$$\frac{1-\omega}{\omega}=c^{\frac{2}{1-2\omega}};\ (c)$$

si l'on nomme p le terme maximum

$$\frac{i.i-1...i-r+1}{1.2.3...r} \cdot (i-2r)^{i-2};$$

le terme qui en est éloigné du rang t, sera

$$p \cdot \frac{i-r \cdot i-r-1 \dots i-r-t+1}{r+1 \cdot r+2 \dots r+t} \cdot \left(\frac{i-2r-2t}{i-2r}\right)^{i-2}.$$

Son logarithme sera donc

$$\log p + t \cdot \log \cdot (i - r) + \log \cdot \left(1 - \frac{1}{i - r}\right) + \log \cdot \left(1 - \frac{2}{i - r}\right) \cdot \dots + \log \cdot \left[1 - \frac{(t - 1)}{i - r}\right]$$

$$- t \cdot \log \cdot r - \log \cdot \left(1 + \frac{1}{r}\right) - \log \cdot \left(1 + \frac{2}{r}\right) \cdot \dots - \log \cdot \left(1 + \frac{t}{r}\right)$$

$$+ i - 2) \cdot \log \cdot \left(1 - \frac{2t}{i - 2r}\right).$$

En développant en séries ces logarithmes, et négligeant les termes de l'ordre  $\frac{1}{i^2}$ , on aura

$$\log p + t \cdot \log \left(\frac{i-r}{r}\right) - \frac{(1+2+3...+t-1)}{i-r} - \frac{(1+2+3...+t)}{r}$$
$$-(i-2) \cdot \left[\frac{2t}{i-2r} + \frac{2t^2}{(i-2r)^2}\right].$$

Par la nature de r, on a à très peu près, par ce qui précède,

$$\log \left(\frac{i-r}{r}\right) + \frac{1}{i-r} = (i-2), \left[\frac{2}{i-2r} - \frac{2}{(i-2r)^2}\right];$$

la fonction précédente deviendra donc

$$\log p - (1+2+3...+t) \cdot \frac{i}{r \cdot (i-r)} - \frac{(i-2) \cdot 2t \cdot (t+1)}{(i+2r)^2}$$

En ne conservant ainsi parmi les termes de l'ordre  $\frac{1}{i}$ , que ceux qui sont multipliés par  $t^a$ , et observant que

$$1+2+3...+t=\frac{t^2+t}{2};$$

cette fonction prendra la forme

$$\log p - \frac{i^3 t^2}{2r \cdot i - r \cdot (i - 2r)^2};$$

ce qui donne pour le terme placé à la distance t, du terme p,

$$p.c = \frac{i^3 t^2}{2r.\overline{i-r}(i-2r)^2}$$

Il est facile de s'assurer que cette même valeur a lieu à très peu près pour le terme placé avant p à la même distance. La somme de tous ces termes sera la série entière (a'). On aura, comme on sait, cette somme à très peu près égale à

$$p.\int dt.c = \frac{i^3 t^2}{2r.\overline{i-r}.(i-2r)^2},$$

l'intégrale étant prise depuis  $t = -\infty$ , jusqu'à  $t = \infty$ ; ce qui donne, par les méthodes connues, la série (a') égale à

$$p.\sqrt{\pi}.\left(\frac{i-2r}{i}\right).\sqrt{\frac{2r.\overline{i-r}}{i}},$$

7 étant la circonférence dont le diamètre est l'unité. On a

$$p = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot ... i \cdot (i - 2r)^{t - s}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot ... i - r \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot ... r}.$$

La série (a) devient ainsi, abstraction faite du signe,

$$\frac{i.(i-2r)^{l-2}.\sqrt{\pi}}{1.2.3...i-r.1.2.3...r} \frac{\overline{i-2r}}{i}.\sqrt{\frac{2r.\overline{i-r}}{i}} \cdot \frac{e^{i}}{2^{l-1}}.$$

On a à très peu près, par les théorèmes connus,

1.2.3...
$$i-r = (i-r)^{i-r+\frac{1}{2}} \cdot c^{-(i-r)} \cdot \sqrt{2\pi};$$
  
1.2.3... $r = r^{r+\frac{1}{2}} \cdot c^{-r} \cdot \sqrt{2\pi}.$ 

La série (a) devient donc

$$\frac{\frac{2}{\sqrt{i}} \cdot (i-2r)^{i-1} \cdot \left(\frac{ec}{2}\right)^i}{r^r \cdot (i-r)^{l-r} \cdot \sqrt{2\pi}},$$

ou

$$\frac{2}{i\sqrt{i}.(1-2\omega).\sqrt{2\pi}}\cdot\left[\frac{ec.(1-2\omega)}{2\omega^{\omega}.(1-\omega)^{1-\omega}}\right]^{i}; \quad (d)$$

ω étant donné par l'équation (c).

On doit observer ici que la valeur de  $\omega$  donnée par cette équation n'est pas rigoureuse. Nous avons négligé, pour former cette équation, les quantités de l'ordre  $\frac{1}{i}$ ; et de plus nous avons supposé que le terme maximum p, était égal à celui qui le précède; ce qui n'est qu'approché. De là il suit que la valeur exacte de  $\omega$ , est celle que donne l'équation (c), plus une correction de l'ordre  $\frac{1}{i}$ , que nous désignerons par  $\frac{q}{i}$ . Mais cette correction disparaît d'elle-même par la condition de p maximum. En effet, si l'on nomme D la fonction

$$\frac{ec.(1-2\omega)}{2\omega^{\omega}.(1-\omega)^{1-\omega}},$$

et D' cette même fonction, lorsqu'on y change  $\omega$  dans  $\omega + \frac{q}{i}$ ; on aura

log. D'i=i.log. 
$$\left[\left(1+\frac{q}{i}\cdot\frac{d\mathbf{D}}{\mathbf{D}.d\omega}+\frac{q^2}{2i^2}\cdot\frac{d^2\mathbf{D}}{\mathbf{D}.d\omega^2}+\text{etc.}\right)$$
. D].

En repassant des logarithmes aux nombres, et négligeant ensuite les quantités de l'ordre ; on aura

$$\mathbf{D}'^i = \mathbf{D}^i \cdot c^q \cdot \frac{d\mathbf{D}}{\mathbf{D}d\omega}.$$

On a

$$\frac{d\mathbf{D}}{\mathbf{D}.d\omega} = -\frac{2}{1-2\omega} + \log \cdot \frac{1-\omega}{\omega};$$

et l'équation (c) donne log.  $\frac{1-\omega}{\omega} = \frac{2}{1-2\omega}$ ; on a donc aux quantités près de l'ordre  $\frac{1}{i}$ ,  $D'^i = D^i$ , d'où il est facile de conclure que, par le changement de  $\omega$  dans  $\omega + \frac{q}{i}$ , la formule (d) reste la même. Si la quantité

$$\frac{ec.(1-2\omega)}{2\omega^{\omega}(1-\omega)^{1-\omega}}$$

surpasse l'unité, la fonction (d) devient infinie, lorsque i est infini; l'expression du rayon vecteur devient donc alors divergente. La valeur de l'excentricité, déduite de l'équation

$$e = \frac{2\omega^{\omega} \cdot (1-\omega)^{1-\omega}}{(1-2\omega) \cdot c}$$

est par conséquent la limite des valeurs de l'excentricité, qui font converger l'expression du rayon vecteur développé suivant les puissances de l'excentricité. En substituant au lieu de  $\frac{1}{c}$  sa valeur

 $\left(\frac{1-\omega}{\omega}\right)^{\frac{1-2\omega}{2}}$  donnée par l'équation (c), cette expression de e devient

$$e = \frac{2 \cdot \sqrt{\omega \cdot (1-\omega)}}{1-2\omega}$$

L'équation (c) donne à peu près

$$\omega = 0,08307;$$

d'où l'on tire

$$e = 0,66195.$$

L'équation précédente de la limite de l'excentricité e, donne à cette limite

$$1-2\omega=\frac{1}{\sqrt{1+e^2}},$$

d'où il est facile de conclure

$$\frac{1-\omega}{\omega} = \frac{(1+\sqrt{1+e^2})}{e^2};$$

l'équation (c) donnera donc

$$1 + \sqrt{1 + e^2} = e \cdot c^{\sqrt{1 + e^2}}; (m)$$

les valeurs de e supérieures à celle que cette équation donne, rendent l'expression en série du rayon vecteur R, divergente lorsque t est un angle droit. Pour toutes les valeurs inférieures, cette série est convergente quel que soit t. En effet, le terme général de l'expression de R développée en série ordonnée par rapport aux puissances de l'excentricité, est, comme on l'a vu,

$$-\frac{e^{i}}{1,2\cdot3\cdot\cdot\cdot\overline{i-1}\cdot2^{i-1}}\cdot [i^{l-2}\cdot\cos\cdot it-i\cdot(i-2)^{i-2}\cdot\cos\cdot(i-2)\cdot t+\text{etc.}].$$

La plus grande valeur de ce terme, abstraction faite du signe, ne peut surpasser

$$\frac{e^{i}}{1.2.3...i-1.2^{i-1}}, \left[i^{l-a}+i.(i-2)^{l-a}+\frac{i.\overline{i-1}}{1.2}.(i-4)^{l-a}+\text{etc.}\right].$$

On vient de voir que cette valeur, lorsque i est infini, devient nulle par un facteur moindre que l'unité, élevé à la puissance i, lorsque l'excentricité e est au-dessous de celle qui résulté de l'équation aux limites; la série est donc convergente, quel que soit t. Je vais maintenant établir qu'alors la série de l'expression de l'anomalie vraie développée de la même manière, est pareillement convergente.

4. L'anomalie excentrique étant u, et v l'anomalie vraie; on a, par le n° 20 du second livre de la Mécanique céleste,

$$t = u - e \sin u,$$

$$R = 1 - e \cos u;$$

ce qui donne

$$\frac{du}{dt} = \frac{1}{R};$$

or, on a, par la loi des aires proportionnelles aux temps,

$$\frac{dv}{dt} = \frac{\sqrt{1-e^2}}{R^2};$$

on a done

$$\frac{dv}{dt} = \left(\frac{du}{dt}\right)^{a} \cdot \sqrt{1 + e^{a}}.$$

L'expression en série de u, du nº 22 du livre cité, donne

$$\frac{du}{dt} = 1 + e \cdot \cos t + \frac{e^2}{1 \cdot 2 \cdot 2} \cdot 2^2 \cdot \cos 2t + \frac{e^3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2^2} \cdot (3^5 \cos 3t - 3 \cdot \cos t) + \text{etc.}$$

Le terme général de cette série est

$$\frac{e^{t}}{1.2.3...i,2^{t-1}} \cdot \left[i^{t} \cdot \cos \cdot it - i \cdot (i-2)^{t} \cdot \cos \cdot (i-2)t + \frac{i \cdot i-1}{1.2} \cdot (i-4)^{t} \cdot \cos \cdot (i-4)t - \text{etc.}\right],$$

et dans aucun cas il ne peut surpasser

$$\frac{e^{i}}{1.2.3...i.2^{i-1}} \cdot \left[ i^{i} + i \cdot (i-2)^{i} + \frac{i \cdot i-1}{1.2} \cdot (i-4)^{i} + \text{etc.} \right].$$

En suivant exactement l'analyse de l'article précédent, on trouve ce dernier terme égal à

$$\frac{2}{\sqrt{i}} \cdot \frac{(\mathbf{I} - 2\omega)}{\sqrt{2\pi}} \cdot \left[ \frac{ec.(\mathbf{I} - 2\omega)}{2\omega^{\omega}.(\mathbf{I} - \omega)^{1-\omega}} \right]^{i}; \quad (e)$$

ω étant donné par l'équation (c) de l'article précédent.

Maintenant, si l'on désigne par A la série

$$1 + e + \frac{2^{3} \cdot e^{2}}{1 \cdot 2 \cdot 2} \cdot \dots + \frac{e^{i'}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots i' \cdot 2^{i'-1}} \cdot \left[ i'^{i'} + i' \cdot (i' - 2)^{i'} + \frac{i' \cdot \overline{i'-1}}{1-2} \cdot (i' - 4)^{i'} + \text{etc.} \right] + \text{etc.},$$

la série étant continuée jusqu'à i'=i; il est facile de voir que l'expression en série, de  $\frac{du}{dt}$ , sera moindre que le développement en série, de la fonction

$$A + \frac{2 \cdot (1-2\omega) \cdot q^i e^i}{\sqrt{2\pi} \cdot (1-qe)}; \quad (0)$$

en désignant par q la quantité

$$\frac{(1-2\omega) \cdot c}{2\omega^{\omega} \cdot (1-\omega)^{1-\omega}}.$$

Car il est visible que le coefficient d'une puissance quelconque e' dans le développement de la fonction (o) est positif, et qu'il est plus grand, abstraction faite du signe, que le coefficient de la même puissance, dans le développement de  $\frac{du}{dt}$ . L'expression de  $\frac{dv}{dt}$ , ou de  $\left(\frac{du}{dt}\right)^{2} \cdot \sqrt{1-e^{2}}$ , est donc moindre

$$\left[A + \frac{2 \cdot (\mathbf{1} - 2\omega) \cdot q^{i}e^{i}}{\sqrt{2\pi} \cdot (\mathbf{1} - qe)}\right]^{2} \cdot \sqrt{\mathbf{1} - e^{2}};$$

or, le développement de  $\sqrt{1-e^2}$  est moindre que celui de  $\frac{1}{1-e^2}$ ; le développement de  $\frac{d\nu}{dt}$  est donc moindre que celui de

$$\frac{\left[A + \frac{2 \cdot (1 - 2\omega) \cdot q^{i}e^{l}}{\sqrt{2\pi} \cdot (1 - qe)}\right]^{a}}{1 - e^{a}}; \quad (p)$$

c'est-à-dire que le coefficient d'une puissance quelconque de e' dans le développement de cette fonction, est positif et plus grand, abstraction

faite du signe, que le coefficient de la même puissance dans le développement de  $\frac{d\nu}{dt}$ .

Donnons à la fonction (p) cette forme

$$\frac{A^{2}}{1-e^{2}}+\frac{4A\cdot(1-2\omega)\cdot q^{i}e^{i}}{\sqrt{2\pi}\cdot(1-qe)\cdot(1-e^{2})}+\frac{2\cdot(1-2\omega)^{2}q^{2i}e^{2i}}{\pi\cdot(1-qe)^{2}\cdot(1-e^{2})^{*}}$$

Le terme  $\frac{A^2}{1-e^2}$  développé en série, donne une série convergente. Car, quelque grand que l'on suppose i, pourvu qu'il soit fini,  $A^2$  sera composé d'un nombre fini de termes. En désignant par  $me^{il}$  l'un de ces termes,  $\frac{me^{il}}{1-e^2}$  développé en séries donnera une série convergente, e étant supposé moindre que l'unité. Ainsi  $\frac{A^2}{1-e^2}$  donnera un nombre fini de séries convergentes, et dans leur somme le terme dépendant de  $e^i$  deviendra nul lorsque s est infini.

Le terme

$$\frac{4A.(1-2\omega).q^{i}e^{t}}{\sqrt{2\pi}.(1-qe)(1-e^{2})}$$

donnera un nombre fini de termes de la forme

$$\frac{ne^{i}}{(1-qe)(1-e^{2})};$$

or la fraction

$$\frac{1}{(1-qe)(1-e^a)}$$

se décompose dans les trois suivantes

$$\frac{1}{2(1-q)} \cdot \frac{1}{1-e} + \frac{1}{2(1+q)} \cdot \frac{1}{1+e} - \frac{q^2}{1-q^2} \cdot \frac{1}{1-qe}$$

Chacune d'elles développée en série, donne une série convergente; car, par la supposition, qe est moindre que l'unité. On voit donc que le terme

$$\frac{4A.(1-2\omega).q^{i}e^{i}}{\sqrt{2\pi}.(1-qe).(1-e^{2})}$$

donne une série convergente. Pareillement le terme

$$\frac{2.(1-2\omega)^2 \cdot q^{2i}e^{5i}}{\pi \cdot (1-qe)^2 \cdot (1-e^2)}$$

donne une série convergente; comme il est facile de le voir, en décomposant la fraction

$$\frac{1}{(1-qe)^2 \cdot (1-e^2)}$$

 $\frac{(1-qe)^2 \cdot (1-e^2)}{(1-qe)^2 \cdot (1-e^2)}$ en fractions partielles;  $\frac{d\nu}{dt}$  développé en série ordonnée par rapport aux puissances de l'excentricité, donne par conséquent une série convergente, lorsque qe est moindre que l'unité. Il est facile d'en conclure que l'expression de  $(\nu - t)$  ainsi développée forme une série convergente ; car l'intégration de de , faisant acquérir des diviseurs à ses termes, on voit que, quel que soit t, v-t sera moindre que

$$\left[A + \frac{2 \cdot (1 + 2\omega) \cdot q^{i}e^{i}}{\sqrt{2\pi} \cdot (1 - qe)}\right]$$

qui, comme on vient de le voir, forme une série convergente.

Il résulte de ce qui précède, que la condition nécessaire pour la convergence des séries qui expriment le rayon vecteur et l'anomalie vraie, développés suivant les puissances de l'excentricité, est que l'excentricité soit moindre que

$$\frac{2.\sqrt{\omega.(1-\omega)}}{\frac{2.\sqrt{1-\omega}}{2}}$$
 is probably before all sorts

ω étant donné par l'équation

anomare's siladeal sugar 
$$\frac{1-\omega}{\omega} = e^{\frac{2}{1-1}\frac{2\omega}{2}}$$
 and  $\frac{dh}{dt}$  and  $\frac{dh}{dt}$  are more factors.

Les deux séries sont alors convergentes; c'est ce qui a lieu pour toutes les planètes, même pour les planètes télescopiques. Les valeurs supérieures de l'excentricité font diverger la série du rayon vecteur, et alors il faut recourir à d'autres développemens. Tel est le cas de la comète à courte période.

5. On développe encore les expressions de l'anomalie vraie et du rayon vecteur, suivant les sinus et cosinus multiples de l'anomalie moyenne. Soit alors (T. k. V. 1 -, e

$$v = t + a^{(1)} \cdot \sin t + a^{(2)} \cdot \sin 2t \cdot ... + a^{(1)} \cdot \sin t + \text{etc.}$$

a(1), a(2), etc., étant des fonctions de l'excentricité. On peut facilement démontrer que la série est toujours convergente. En effet, on a

$$\int (v-t).dt.\sin.it = \pi.a^{(1)},$$

l'intégrale étant prise depuis t nul, jusqu'à t égale 27. Or, on a dans ces limites, en intégrant par parties,

$$dt.(v-t).\sin.it = \frac{1}{i}.\int dt \left(\frac{dv}{dt}-1\right).\cos.it = -\frac{1}{i^2}.\int dt \sin.it.\frac{ddv}{dt^2};$$

on aura done

$$\alpha^{(1)} = -\frac{1}{i^2\pi} \cdot \int dt \cdot \sin \cdot it \cdot \frac{ddv}{dt^2}$$

l'équation

$$\frac{dv}{dt} = \frac{\sqrt{1 - e^2}}{R^2}$$

donne

$$\frac{ddv}{dt^2} = -\frac{2 \cdot \sqrt{1 - e^2}}{R^2} \cdot \frac{dR}{dt}.$$

Au périhélie et à l'aphélie,  $\frac{d\mathbb{R}}{dt}$  est nul :  $\frac{d\mathbb{R}}{\mathbb{R}^3}$  dt est positif, en allant du premier de ces points au second; et négatif, du second au premier. Soit k sa plus grande valeur positive; — k sera sa plus grande valeur négative. En supposant donc que les valeurs de sin. it soient positives et égales à l'unité, depuis le périhélie jusqu'à l'aphélie, et négatives et égales à — t, depuis l'aphélie jusqu'au périhélie; on voit que l'intéda

grale  $\int dt \sin it \cdot \frac{dR}{dt}$  prise depuis le périhélie jusqu'à l'aphélie, sera moin-

dre, abstraction faite du signe, que  $2k\pi$ . De là il suit que  $a^{(0)}$ , abstraction faite du signe, est moindre que

$$\frac{4\pi \cdot k \cdot \sqrt{1-e^2}}{i^2}$$

Ce terme devient nul, lorsque *i* est infini. De plus, la série de l'expression précédente de  $\nu$ , à partir de *i* supposé très grand, est moindre que

$$\frac{4\pi \cdot k \cdot \sqrt{1-e^2}}{i};$$

quantité qui devient nulle, lorsque i est infini. Cette série est donc convergente.

Considérons de la même manière l'expression de R développée dans

## SUPPLÉMENT AU V° VOLUME.

17

une série ordonnée par rapport aux cosinus de t et de ses multiples.

$$R = b^{(0)} + b^{(1)} \cdot \cos t \cdot ... + b^{(0)} \cdot \cos t + etc.$$

on aura

$$\pi.b^{(i)} = \int \mathbf{R} dt.\cos.it$$

l'intégrale étant prise depuis t nul jusqu'à t égal à 27; ce qui donne

$$\pi.b^{(i)} = -\frac{1}{i^2} \cdot \int dt \cdot \cos it \cdot \frac{ddR}{dt^2}.$$

Les formules du mouvement elliptique donnent

$$\frac{dd\mathbf{R}}{dt^2} = \frac{\mathbf{I} - e^2 - \mathbf{R}}{\mathbf{R}^3}.$$

Cette dernière quantité est toujours négative. Désignons par — k' son maximum, et supposons  $\cos it$  égal à l'unité; on aura, abstraction faite du signe,  $\pi b^{(i)}$  moindre que  $\frac{2k'\pi}{i^2}$ ; d'où il suit que la série de l'expression de R est convergente.

On peut, en suivant la méthode exposée dans le n° précédent, déterminer la valeur approchée de  $b^{(i)}$ , lorsque i est un grand nombre. Pour cela j'observe que l'expression de R développée en série par rapport aux puissances de l'excentricité, et que nous avons rapportée dans l'article premier, donne

$$b^{(i)} = -\frac{e^{i} \cdot i^{i-2}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots i \cdot 2^{i-1}} \cdot \left[ i - \frac{\overline{i+2}}{1 \cdot \overline{i+1}} \left( \frac{ei}{2} \right)^{4} + \frac{\overline{i+4}}{1 \cdot 2 \cdot \overline{i+1} \cdot \overline{i+2}} \cdot \left( \frac{ei}{2} \right)^{4} - \frac{\overline{i+6}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \overline{i+1} \cdot \overline{i+2} \cdot \overline{i+3}} \cdot \left( \frac{ei}{2} \right)^{6} + \text{etc.} \right].$$

Le terme général de cette expression est

$$\pm \frac{e^{i \cdot i^{i-2}}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots i \cdot 2^{i-1}} \cdot \frac{(i+2r) \cdot \left(\frac{ie}{2}\right)^{2r}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots r \cdot i + 1 \cdot i + 2 \cdot \dots i + r}$$

Si l'on observe que r étant un très grand nombre, on a à fort peu près

1.2.3...
$$r$$
.1.2.3... $i+r=r^{r+\frac{1}{2}}$ . $(i+r)^{i+r+\frac{1}{2}}$ . $c^{-i-2r}$ . $2\pi$ ;

on peut donner à ce terme, la forme

$$\pm \frac{e^{i \cdot c^{i} \cdot i^{i-2} \cdot (i+2r)}}{2^{i} \cdot \pi \cdot (i+r)^{i} \cdot \sqrt{r \cdot i+r}} \cdot \left(\frac{e^{2i^{2} \cdot c}}{4r \cdot i+r}\right)^{i};$$

quantité qui devient nulle, lorsque r est infini. La série de l'expression de  $b^{(i)}$  est donc convergente.

Pour avoir sa valeur approchée, je considère la série

$$i + \frac{\overline{i+2}}{1.\overline{i+1}} \cdot \left(\frac{ei}{2}\right)^2 + \frac{\overline{i+4}}{1.2.\overline{i+1}.\overline{i+2}} \cdot \left(\frac{ei}{2}\right)^4 + \text{etc.}; (m)$$

dont le terme général est

$$\frac{(i+2r)\cdot\left(\frac{ie}{2}\right)^{ar}}{1\cdot 2\cdot 3\cdot \cdot \cdot r\cdot \overline{i+1}\cdot \overline{i+2}\cdot \cdot \cdot \overline{i+r}}.$$

On aura, par la méthode exposée dans l'article premier, la somme de cette série, fort approchée lorsque i est un très grand nombre. Nommons p le terme précédent, et supposons qu'il soit le plus grand des termes de la série. Pour avoir le rang qu'il y occupe, on l'égalera, suivant la méthode citée, au terme qui le précède; ce qui donne

$$(i+2r-2) \cdot r \cdot \overline{i+r} = (i+2r) \cdot \frac{i^2 e^2}{4};$$

d'où l'on tire à fort peu près

$$r = \frac{i \cdot \sqrt{1 + e^2} - i}{2}.$$

Le terme qui suit p, d'un rang supérieur de t, est

$$p \cdot \frac{i+2r-t}{i+2r} \cdot \left(\frac{ei}{2}\right)^{at}$$

$$\overline{r+2...r+t.i+r+1.i+r+2...i+r+t}$$

En appliquant ici l'analyse de l'article premier, il est facile de voir que le logarithme de ce terme est à très peu près,

$$\log p - \frac{t}{i+2r} + 2t \cdot \log \frac{ei}{2} - t \cdot \log r - \frac{(1+2+3...+t)}{r} - t \cdot \log \frac{i+r}{i+r} - \frac{(1+2+3...+t)}{i+r}.$$

Mais on a à très peu près

$$\log \cdot (r \cdot \overline{i+r}) = 2 \log \cdot \frac{ei}{2};$$

## SUPPLÉMENT AU V° VOLUME.

en ne conservant donc, conformément à la méthode citée, parmi les termes de l'ordre  $\frac{1}{i}$ , que ceux qui sont multipliés par  $t^a$ , et observant que

$$1+2+3...+t=\frac{t^2+t}{2};$$

le logarithme du terme placé à la distance t du terme maximum sera

$$\log p - \frac{\overline{i+2r}.t^2}{2r.\overline{i+r}};$$

ce terme sera donc

$$p.c = \frac{\overline{i+2r.t^2}}{2r.\overline{i+r}}$$

Il est facile de voir que ce sera aussi l'expression du terme qui précède p, du même intervalle t. La somme de la série (m) sera donc à très peu près

$$p.\int dt.c - \frac{(i+2r).t^2}{2r.i+r}$$

l'intégrale étant prise depuis  $t = -\infty$  jusqu'à  $t = \infty$ ; ce qui donne cette somme égale à

$$p.\sqrt{2\pi}.\sqrt{\frac{r.\overline{i+r}}{i+2r}}.$$

Si dans l'expression précédente de p, on substitue au lieu du produit

$$1.2.3...r.\overline{i+1.\overline{i+2...\overline{i+r}}}$$

sa valeur très rapprochée

$$\frac{(r.\overline{i+r})^r.(i+r)^i.2\pi.c^{-i-2r}.\sqrt{r.\overline{i+r}}}{1.2.3...i}$$

on aura

$$p = \frac{1.2.3...i.(i+2r).c^{i+2r}}{2\pi.\sqrt{r.i+r}.(i+r)^{i}};$$

ce qui, en observant que i + 2r est égal à i.  $\sqrt{1 + e^2}$ , et que i + r est égal à

$$\frac{i\sqrt{1+e^2+i}}{2};$$

donne pour la somme de la série (m),

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot ... i \cdot (1 + e^2)^{\frac{1}{4}} \cdot 2^i \cdot c^{i\sqrt{1 + e^2}} \cdot \sqrt{i}}{\sqrt{2\pi} \cdot i^i \cdot (\sqrt{1 + e^2} + 1)^i}.$$

En changeant  $e^a$  dans  $e^a$ , dans cette expression, on aura la valeur fort approchée de la série

$$i - \frac{\overline{i+2}}{1.\overline{i+1}} \cdot \left(\frac{ei}{2}\right)^2 + \frac{\overline{i+4} \cdot \left(\frac{ei}{2}\right)^4}{1.2.\overline{i+1}.\overline{i+2}} - \frac{\overline{i+6} \cdot \left(\frac{ei}{2}\right)^6}{1.2.3.\overline{i+1}.\overline{i+2}.\overline{i+3}} + \text{etc.}$$

Ces passages du positif au négatif, comme du réel à l'imaginaire, ne doivent être employés qu'avec une grande circonspection. Mais ici, e<sup>a</sup> étant indéterminé, on peut les employer sans crainte. J'en ai reconnu d'ailleurs l'exactitude, par une autre analyse. On a ainsi

$$b^{(i)} = \frac{2 \cdot (1 - e^2)^{\frac{1}{4}}}{i \sqrt{i} \cdot \sqrt{2\pi}} \cdot \frac{c^i \sqrt{1 - c^2} \cdot e^i}{(1 + \sqrt{1 - e^2})^i}.$$

Lorsque i est infini, cette valeur de  $b^{(i)}$  reste toujours infiniment petite, quel que soit e, pourvu qu'il n'excède pas l'unité.

## Sur le Flux et Reflux lunaire atmosphérique.

6. J'ai donné à la fin du livre XIII de mon Traité de Mécanique céleste, la théorie du flux et reflux lunaire atmosphérique. J'ai conclu les élémens de ce phénomène, d'une longue suite d'observations du baromètre faites à l'Observatoire royal pendant sept années consécutives, chaque jour à neuf heures du matin, à midi; et le soir, à trois heures et à neuf heures. L'ensemble de ces observations réduites par M. Bouvard à zéro de température, a donné cinquante-cinq millièmes de millimètre pour l'étendue entière du flux lunaire, depuis son maximum jusqu'à son minimum, et trois heures dix-neuf minutes sexagésimales, pour l'heure de son maximum du soir, le jour de la syzygie. Mais j'ai reconnu par le calcul des probabilités, que cette heure, et l'existence même du phénomène sensible à Paris, n'ont qu'un faible degré de probabilité. Le système d'observations, suivi à l'Observatoire royal, déjà adopté dans quelques autres Observatoires, et que l'on doit désirer de voir répandu généralement, est dû à M. Ramond qui l'a employé dans les nombreuses observations qu'il a faites à Clermont, chef-lieu du département du

Puy-de-Dôme. Il l'a exposé, ainsi que les résultats qu'il en a déduits sur la variation diurne du baromètre, dans plusieurs mémoires lus à l'Institut, et qui peuvent être regardés comme une des choses les plus intéressantes que l'on ait faites en Météorologie. M. Bouvard a confirmé ces résultats, dans ses recherches qu'il vient de perfectionner en ajoutant quatre années d'observations à celles des sept années qu'il avait considérées, et en discutant avec une attention scrupuleuse, les observations de ces onze années, dans la réduction desquelles il a eu égard à la dilatation de l'échelle du baromètre.

Ce travail immense m'a fait reprendre ma théorie du flux lunaire atmosphérique. J'ai déterminé avec un soin spécial, les facteurs par lesquels on doit multiplier les diverses équations de condition, pour obtenir les résultats les plus avantageux, dans lesquels l'erreur moyenne à craindre en plus ou en moins, est un minimum. Ces facteurs ne sont point ceux que donne le procédé connu sous le nom Méthode des moindres carrés, procédé qui n'est qu'un cas particulier de la méthode la plus avantageuse, et dont il diffère dans la plupart des questions où il a été employé. En effet, lorsqu'il s'agit, par exemple, de corriger les élémens elliptiques du mouvement des planètes; on forme des équations de condition, en égalant chaque longitude observée, à la longitude calculée par ces élémens augmentés, chacun, de sa correction. On forme ainsi un grand nombre d'équations de condition. Ensuite on multiplie chacune d'elles par le coefficient de la première correction, et l'on ajoute toutes ces équations ainsi multipliées; ce qui donne une première équation finale. En opérant de la même manière, relativement à la seconde correction, à la troisième, etc., on forme autant d'équations finales, qu'il y a de corrections que l'on détermine en résolvant ces équations. Mais la longitude n'est point le résultat d'une observation directe; elle est déduite de deux observations faites avec des instrumens différens. dont l'un donne l'ascension droite de l'astre, et dont l'autre donne sa déclinaison. La loi de probabilité des erreurs de chacun de ces instrumens peut n'être pas la même : de plus ces erreurs ont, suivant la position de l'astre, une influence différente sur la longitude. La méthode des moindres carrés, dont plusieurs géomètres ont donné des preuves très peu satisfaisantes, ne donne point ici les facteurs les plus avantageux; elle n'a plus que l'avantage d'offrir un moyen régulier de former les équations finales. J'ai présenté dans le troisième Supplément à ma Théorie analytique des Probabilités, l'expression générale des facteurs

les plus avantageux.

M. Bouvard ayant appliqué mes formules à toutes les observations qu'il a considérées, en a conclu que l'étendue entière du flux lunaire est de dix-huit millièmes de millimètre, et que l'heure du plein flux lunaire, le soir du jour de la syzygie, est deux heures huit minutes. Ces nouveaux résultats sont différens des premiers; mais quoiqu'ils soient fondés sur 208 syzygies et autant de quadratures, dans chacune desquelles on a considéré le second et le premier jour avant la phase, le jour même de la phase et les deux jours suivans, ils n'ont cependant qu'un faible degré de probabilité; en sorte que l'on doit jusqu'ici regarder comme incertaine, l'existence sensible à Paris, du flux lunaire atmosphérique. Le même nombre d'observations faites avec le même soin à l'équateur, et discuté de la même manière, indiquerait ce phénomène avec une grande probabilité. Il est vraisemblable que de pareilles observations faites dans un port où les marées sont très grandes, tel que celui de Saint-Malo, manifesteraient le flux atmosphérique produit par l'élévation et par la dépression de l'atmosphère, due à l'élévation et à la dépression alternatives de la surface de la mer.

M. Ramond a remarqué le premier, que la variation diurne du baromètre, de neuf heures du matin à trois heures du soir n'était pas la même dans toutes les saisons; M. Bouvard a confirmé ce résultat. Il a trouvé 1°. la variation moyenne des trois mois de novembre, décembre et janvier, égale à o<sup>mil</sup>,557; 2°. celle des trois mois suivans égale à o<sup>mil</sup>,940; 3°. celle des trois mois de mai, juin et juillet, égale à o<sup>mil</sup>,752; 4°. celle des trois autres mois, égale à o<sup>mil</sup>,802; ce qui donne o<sup>mil</sup>,762 pour la variation moyenne de l'année entière. Ces différences dépendent-elles des anomalies du hasard, ou indiquent-elles des causes régulières? c'est ce que le calcul des probabilités peut seul faire connaître. Il était donc intéressant de l'appliquer à cet objet. J'ai trouvé qu'il y a une très grande probabilité que des causes régulières ont produit le minimum o<sup>mil</sup>,557 de la variation, et son maximum o<sup>mil</sup>,940; mais que les différences entre les variations o<sup>mil</sup>,752, o<sup>mil</sup>,802 et la moyenne o<sup>mil</sup>,762 de l'année, peuvent sans invraisemblance être attribuées aux anomalies du hasard.

Les 132 mois d'observations que M. Bouvard a discutées pour avoir la variation diurne du baromètre, présentent ce phénomène remarquable, savoir, que la variation moyenne de neuf heures du matin à trois heures

du soir a été positive pour chacun de ces mois. Je trouve par le calcul des probabilités, que ce phénomène, loin d'être extraordinaire, est à priori vraisemblable.

7. Je nomme λ, l'heure sexagésimale du flux et reflux lunaire atmosphérique du soir, le jour de la syzygie supposée arriver à midi; cette heure étant convertie en arc, à raison de la circonférence pour un jour. Je nomme R la hauteur du baromètre au-dessus de sa hauteur moyenne, au moment du flux, produite par l'action de la Lune sur l'atmosphère. Je fais

$$4R \cdot \sin \lambda = x$$
;  $4R \cdot \cos \lambda = y$ .

Soient  $A_i$ ,  $A'_i$ ,  $A''_i$ , les hauteurs observées du baromètre, à neuf heures sexagésimales du matin, à midi et à trois heures du soir, le jour  $i^{2me}$ , à partir de la syzygie, i étant nul pour le jour de la syzygie, positif pour les jours qui le suivent, et négatif pour les jours qui le précèdent. Soient pareillement  $B_i$ ,  $B'_i$ ,  $B''_i$ , les hauteurs observées du baromètre, à neuf heures du matin, midi et trois heures du soir, le jour  $i^{2me}$  à partir de la quadrature. Je suis parvenu dans le chapitre VII du livre XIII de la Mécanique céleste, aux deux équations suivantes

$$x \cdot \cos 2iq + y \cdot \sin 2iq = E_i y \cdot \cos 2iq - x \cdot \sin 2iq = F_i ; \quad (O)$$

dans lesquelles q est le moyen mouvement synodique de la Lune dans un jour; et l'on a

$$E_{i} = A''_{i} - A'_{i} + B_{i} - B''_{i};$$

$$F_{i} = (2A'_{i} - A_{i} - A''_{i} - 2B'_{i} + B_{i} + B''_{i}) \cdot \left(1 + \frac{1}{10}\right);$$

les équations (O) donnent

$$x = E_i \cdot \cos 2iq - F_i \cdot \sin 2iq;$$
 (u)

on peut former autant d'équations semblables qu'il y a de syzygies, et que i a de valeurs. En nommant donc n le nombre de syzygies, n étant un grand nombre; en nommant s' le nombre des valeurs de i; on aura ns' valeurs de x, d'où il faut conclure la valeur la plus avantageuse, c'est-à-dire celle dans laquelle l'erreur moyenne à craindre en plus ou en moins est la plus petite.

On doit pour cela multiplier chacune des ns' équations que représente l'équation (u) par un facteur convenable. J'ai fait voir (page 32

du troisième Supplément à ma Théorie analytique des Probabilités), que si l'on a entre les élémens x, y, z, etc., un grand nombre d'équations de condition représentées par la suivante,

$$l^{(i)} \cdot x + p^{(i)} \cdot y + q^{(i)} \cdot z + \text{etc.}$$

$$= a^{(i)} + m^{(i)} \cdot \gamma^{(i)} + n^{(i)} \cdot z^{(i)} + r^{(i)} \cdot \delta \gamma^{(i)} + \text{etc.}; \quad (i)$$

le facteur le plus avantageux par lequel cette équation doit être multipliée, est

$$\frac{\overline{k''}}{\overline{k}} \cdot m^{(s)^2} + \frac{\overline{k''}}{\overline{k}} \cdot n^{(s)^2} + \frac{\overline{\overline{k'''}}}{\overline{k}} \cdot r^{(s)^2} + \text{etc.}$$

 $k, k'', \overline{k}, \overline{k''}$ , etc.; dépendant des lois de probabilité des erreurs  $\gamma^{(i)}, \lambda^{(i)}$ , etc.; de la manière suivante. Si  $\varphi(\gamma^{(i)})$  est la loi de probabilité de l'erreur  $\gamma^{(i)}$ , cette loi étant supposée la même pour les erreurs positives et pour les erreurs négatives, on a

$$k = 2 \int d\gamma^{(i)} \cdot \varphi(\gamma^{(i)}); \quad k'' = \int d\gamma^{(i)} \cdot \gamma^{(i)2} \cdot \varphi(\gamma^{(i)}),$$

les intégrales étant prises depuis zéro jusqu'à l'infini; pareillement si  $\psi(\lambda^{(i)})$  est la loi de probabilité des erreurs  $\lambda^{(i)}$ , on a

$$\overline{k} = 2 \int d\lambda^{(j)} \cdot \psi(\lambda^{(j)}); \quad \overline{k''} = \int d\lambda^{(j)} \cdot \lambda^{(j)} \cdot \psi(\lambda^{(j)});$$

et ainsi du reste. Dans la question présente,  $\gamma^{(i)}$ ,  $\lambda^{(j)}$ , etc., sont les erreurs des observations désignées par les lettres  $A_i^{(i)}$ ,  $A'_i^{(i)}$ ,  $A''_i^{(j)}$ ,  $B_i^{(j)}$ , etc., observations qui se rapportent au  $i^{ime}$  jour depuis la  $s^{iime}$  syzygie. La loi des erreurs des observations étant supposée la même pour toutes ces observations, on aura

$$k = \overline{k} = \overline{k}$$
, etc.;  $k'' = \overline{k''}$ , etc.;

le facteur précédent deviendra donc

$$\frac{1}{\frac{k^u}{k} \cdot (m^{(i)^2} + n^{(i)^2} + r^{(i)} + \text{etc.})}$$

En désignant par  $\gamma_i^{(i)}$ ,  $\lambda_i^{(i)}$ ,  $\beta_i^{(i)}$ ,  $\overline{\gamma_i^{(i)}}$ ,  $\overline{\lambda_i^{(i)}}$ ,  $\overline{\delta_i^{(i)}}$ , les erreurs des observations  $A_i^{(i)}$ ,  $A'_i^{(i)}$ ,  $A''_i^{(i)}$ ,  $B_i^{(i)}$ ,  $B'_i^{(i)}$ ,  $B''_i^{(i)}$ ; et par  $\overline{m^{(i)}}$ ,  $\overline{n'^{(i)}}$ ,  $\overline{r^{(i)}}$ , relativement aux trois dernières de ces observations, ce que représentent  $m^{(i)}$ ,  $n^{(i)}$ ,  $r^{(i)}$ , relativement aux trois premières; on aura

$$m^{(j)} = -\cos 2iq + \left(1 + \frac{1}{19}\right) \cdot \sin 2iq;$$

$$n^{(j)} = -2\left(1 + \frac{1}{19}\right) \cdot \sin 2iq;$$

$$r^{(j)} = \cos 2iq + \left(1 + \frac{1}{19}\right) \cdot \sin 2iq;$$

$$\overline{m}^{(j)} = -m^{(j)}; \quad \overline{n}^{(j)} = -n^{(j)}; \quad \overline{r}^{(j)} = -r^{(j)};$$

le facteur précédent devient ainsi,

$$\frac{4k''}{k} \cdot \{1 + 2,324 \cdot \sin^2 \cdot 2iq\}$$

En réunissant toutes les valeurs de x, multipliées par ce facteur, on aura

$$\frac{x}{1+2,324 \cdot \sin^2 q} = \frac{\cos 2iq \cdot \frac{S \cdot E_i^{(j)}}{n} - \sin 2iq \cdot \frac{S \cdot F_i^{(j)}}{n};}{1+2,324 \cdot \sin^2 \cdot 2iq};$$

 $E_i^{(j)}$  et  $F_i^{(j)}$  étant les valeurs de  $E_i$  et de  $F_i$  relatives à la  $s^{ilme}$  syzygie et à la  $s^{ilme}$  quadrature à laquelle on la compare. Le signe S indiquant la somme des quantités qu'il précède, pour toutes les syzygies dont le nombre est n;  $\frac{S.E_i^{(j)}}{n}$  et  $\frac{S.F_i^{(j)}}{n}$  seront donc les moyennes des valeurs de  $E_i^{(j)}$  et  $F_i^{(j)}$ , moyennes que l'on obtiendra en substituant dans les expressions de  $E_i$  et de  $F_i$ , au lieu de  $A_i$ ,  $A'_i$ ,  $A''_i$ ,  $B_i$ , etc., leurs valeurs moyennes. L'équation précédente deviendra ainsi,

$$\frac{x}{1+2,324.\sin^2.2iq} = \frac{E_i.\cos 2iq - F_i.\sin 2iq}{1+2,324.\sin^2.2iq};$$

cette équation produit autant d'équations que i a de valeurs. Si l'on réunit ces équations, on aura

$$x.\Sigma.\frac{1}{1+2,324.\sin^2.2iq} = \Sigma\left(\frac{E_i.\cos 2iq - F_i.\sin 2iq}{1+2,324.\sin^2.2iq}\right);$$

le signe  $\Sigma$  exprimant la somme des valeurs du terme qu'il précède, on aura ainsi pour la valeur de  $\alpha$  la plus avantageuse,

$$x = \frac{\sum \left(\frac{\hat{E}_{i} \cdot \cos 2iq - F_{i} \cdot \sin 2iq}{1 + 2,324 \cdot \sin^{2} \cdot 2iq}\right)}{\sum \frac{1}{1 + 2,324 \cdot \sin^{2} \cdot 2iq}}.$$

Les équations (0) donnent

$$y = F_i \cdot \cos 2iq + E_i \cdot \sin 2iq$$
;

on aura donc la valeur de y la plus avantageuse, en changeant dans l'expression précédente de x, cos 2iq dans sin 2iq, et sin 2iq dans — cos 2iq; ce qui donne

$$y = \frac{\sum \left(\frac{E_{i}.\sin.2iq + F_{i}.\cos2iq}{1 + 2,324.\cos^{2}.2iq}\right)}{\sum \frac{1}{1 + 2,324.\cos^{2}.2iq}}.$$

M. Bouvard a conclu de ces formules

$$x = 0.031758, \quad y = 0.01534,$$

et l'étendue entière 2R du flux lunaire atmosphérique, égale à 0,01763.

8. Je vais présentement déterminer la loi de probabilité des erreurs de ces deux valeurs de x et de y. Il résulte des formules que j'ai données dans ma Théorie analytique des Probabilités, que si  $\gamma$ ,  $\lambda$ ,  $\delta$ , etc., sont des erreurs indépendantes, mais assujetties à la même loi de probabilité; la probabilité que l'erreur de la fonction

$$m\gamma + n\lambda + r\delta + \text{etc.}$$

sera égale à une quantité quelconque l, est proportionnelle à l'exponentielle

$$\frac{-kl^2}{4k^n\cdot H}$$

H étant la somme des carrés de m, n, r, et c étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité. Si dans la valeur précédente de x, on désigne par  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\lambda$ , les erreurs des observations  $A^{(j)}$ ,  $A'^{(j)}$ ,  $A''^{(j)}$ ; il est facile de voir que les coefficiens de ces erreurs sont

$$\frac{\left(1+\frac{1}{19}\right)(\sin 2iq - \cos 2iq) \cdot \frac{1}{1+2,324 \cdot \sin^2 \cdot 2iq}}{n \ \Sigma \cdot \frac{1}{1+2,324 \cdot \sin^2 \cdot 2iq}};$$

$$-2\left(1+\frac{1}{19}\right) \cdot \sin 2iq \cdot \frac{1}{\cdot 1+2,324 \cdot \sin^2 \cdot 2iq}$$

$$n \cdot \Sigma \cdot \frac{1}{1+2,324 \cdot \sin^2 \cdot 2iq}$$

## SUPPLÉMENT AU V° VOLUME.

$$\frac{\left(1+\frac{1}{19}\right)(\sin 2iq + \cos 2iq) \cdot \frac{1}{1+2,324 \cdot \sin^2 2iq}}{n \cdot \Sigma \cdot \frac{1}{1+2,324 \cdot \sin^2 2iq}}$$

La somme des carrés de ces coefficiens, est

$$2 \cdot \frac{1}{1+2,324.\sin^2 \cdot 2iq} \cdot \frac{1}{n^2 \left( \sum \frac{1}{1+2,324.\sin^2 \cdot 2iq} \right)^2};$$

La somme des carrés des coefficiens des erreurs des observations  $B_{i}^{(j)}$ ,  $B'_{i}^{(j)}$ ,  $B''_{i}^{(j)}$  est égale à la précédente. En ajoutant donc ces deux sommes, on aura

$$4 \cdot \frac{1}{1+2,324.\sin^2 \cdot 2iq} \cdot \frac{1}{n^2 \cdot \left(\sum_{i} \frac{1}{1+2,324.\sin^2 \cdot 2iq}\right)}.$$

Chaque syzygie fournit une quantité semblable; la somme de toutes ces quantités sera donc, pour les n syzygies, la quantité précédente multipliée par le nombre n des syzygies. Cette somme sera donc relativement à toutes les syzygies, et relativement à toutes les valeurs de i, c'est-à-dire relativement à toutes les observations,

$$\frac{4}{n \cdot \Sigma \cdot \frac{1}{1 + 2,324 \cdot \sin^2 \cdot 2iq}}$$

Ainsi la probabilité que l sera l'erreur de x, peut être supposée égale à

$$\frac{-l^{2} \cdot n}{\text{H} \cdot c} \cdot \Sigma \cdot \frac{1}{1+2,324 \cdot \sin^{2} \cdot 2iq}$$

H étant une constante qu'il faut déterminer. Pour cela, j'observe que si l'on intègre cette différentielle depuis  $l=-\infty$ , jusqu'à  $l=\infty$ , l'intégrale doit être l'unité, puisqu'il est certain que la valeur de l est comprise dans ces limites; en faisant donc

$$g^2 = \frac{nk}{16 \cdot k''} \cdot \Sigma \cdot \frac{1}{1 + 2,324 \cdot \sin^2 \cdot 2iq};$$

on doit avoir

$$H \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} dl \cdot c^{-g^* l^*} = 1.$$

27

Mais on a, par un théorème connu,

$$\int_{-\infty}^{\infty} g dl. c^{-g^2 l^2} = \sqrt{\pi},$$

₩ étant la demi-circonférence dont le rayon est l'unité; on a donc

$$H = \frac{g}{\sqrt{\pi}}.$$

Ainsi la probabilité que l'erreur de la valeur de x sera comprise dans des limites données, est

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \int g dl \cdot c^{-g^2 l^2},$$

l'intégrale étant prise dans ces limites.

On trouve de la même manière que la probabilité que l'erreur de la valeur de y sera comprise dans les limites données, est

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \int g' dl \cdot c^{-g'^2 l^2},$$

l'intégrale étant prise dans ces limites, et g'a étant égal à

$$\frac{nk}{16.k''}$$
.  $\Sigma \cdot \frac{1}{1+2,324\cdot\cos^2\cdot 2iq}$ .

Il faut maintenant déterminer par les observations, la valeur numérique de k. Pour cela, j'observe que par ma théorie analytique des probabilités, si l'on nomme e la somme des carrés des différences des variations journalières de neuf heures du matin à trois heures du soir, d'un grand nombre s de jours à leur variation moyenne, on a, avec une très grande vraisemblance,

$$\frac{2k''}{k} \cdot s = e$$
, which is the same time if

ce qui donne

$$\frac{k}{k''} = \frac{2s}{e}.$$

Le calcul de k devient pénible, lorsque s est très considérable; mais on peut le simplifier de la manière suivante :

Je conçois le nombre s de jours partagé en groupes de jours, par exemple, dans un nombre i de mois moyens; et je suppose s assez grand,

pour que i soit lui-même un grand nombre. Je désigne par  $\bar{k}$  et  $\bar{k}''_{i}$  relativement à ces mois, ce que j'ai nommé k et k'' relativement aux jours. Soit encore E la somme des carrés des différences des erreurs des variations moyennes de chacun de ces mois, à la variation moyenne de tous ces mois. On aura par ce qui précède

$$\frac{\bar{k}}{\bar{k}''} = \frac{2i}{E}.$$

Mais la probabilité de l'erreur u de la variation moyenne de tous ces jours, ou de tous ces mois, est par la théorie citée proportionnelle à l'exponentielle

$$\frac{-su^{\bullet}}{4\frac{k^{\bullet}}{k}}$$

Elle est encore proportionnelle à l'exponentielle

$$\frac{-iu^{s}}{4\frac{\overline{k}''}{\overline{k}}}$$

en comparant ces exponentielles, on aura

$$\frac{k}{k''} = \frac{i}{s} \cdot \frac{\overline{k}''}{\overline{k}} = \frac{2i^2}{sE}.$$

Le calcul de E est beaucoup plus simple que celui de e, et c'est ainsi que la valeur numérique de  $\frac{k}{k''}$  a été déterminée. Il y avait pour cela, quelques précautions à prendre. La variation diurne du baromètre n'est pas la même à Paris, dans tous les mois; elle est la plus petite dans ceux de novembre, décembre et janvier, et la plus grande dans les trois mois suivans. Dans les six autres mois, elle diffère peu de la variation moyenne de l'année. Il y a donc des causes régulières de ces phénomènes, et que l'on ne doit pas confondre avec les causes irrégulières de la variation diurne. Les causes régulières agissant de la même manière sur la variation diurne des syzygies et sur celle des quadratures, elles n'influent point sur les valeurs de x et de y, qui ne dépendent que des différences de ces variations, les valeurs de  $E_i$  et de  $F_i$  ne dépendent que de ces différences. Il faut donc pour avoir la loi de probabilité des erreurs dont ces

valeurs sont susceptibles, ne considérer que les variations diurnes dépendantes des seules causes irrégulières, et qui paraissent être celles des mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre; ce sont celles dont on a fait usage pour avoir la valeur de  $\frac{k}{k''}$ . On a trouvé ainsi, en prenant le millimètre carré pour unité, E = 2,565118; d'où l'on tire

$$\frac{k}{k''} = 4.0,42884.$$

On a ensuite

On a ensure 
$$\Sigma \cdot \frac{1}{1 + 2,324.\sin^2.2iq} = 3,29667,$$

$$\Sigma \frac{1}{1 + 2,324.\cos^2.2iq} = 1,97904.$$

Pour déterminer le flux lunaire, j'observe que l'on a n=298, d'où l'on tire

$$g^{a} = 3,29667.298.0,42884.\frac{1}{4},$$
  
 $g'^{2} = 1,97904.298.0,42884.\frac{1}{4},$ 

et, en supposant que la valeur de x soit le résultat des causes accidentelles, la probabilité qu'elle sera comprise dans les limites ± 0,031758, sera

$$\frac{\int gdl.c^{-g^2l^2}}{\sqrt{\pi}},$$

l'intégrale étant prise relativement à l, dans ces mêmes limites. On trouve, au moyen des données précédentes, 0,3617 pour cette probabilité. Si cette probabilité était fort approchante de l'unité, elle indiquerait avec une grande vraisemblance, que la valeur de x n'est pas due aux seules anomalies du hasard, et qu'elle est en partie l'effet d'une cause constante qui ne peut être que l'action de la lune sur l'atmosphère. Mais la différence considérable entre cette probabilité et la certitude représentée par l'unité montre que, malgré le très grand nombre d'observations employées, cette action n'est indiquée qu'avec une faible vraisemblance; en sorte que l'on peut regarder son existence sensible à Paris, comme incertaine. La valeur de y, considérée de la même manière, donne encore plus d'incertitude sur cette existence.

q. Je vais soumettre au calcul des probabilités, quelques singularités que la variation diurne du baromètre a présentées à M. Bouvard. Ce savant astronome a trouvé par onze années d'observations barométriques faites tous les jours à neuf heures du matin et à trois heures du soir, que la variation moyenne diurne du baromètre dans cet intervalle a été o<sup>mil</sup>,557 pour les trois mois de novembre, décembre et janvier; o<sup>mil</sup>,940 pour les trois mois de février, mars et avril; o<sup>mil</sup>,752 pour les trois mois de mai, juin et juillet; enfin, o<sup>mil</sup>,789 pour les trois mois d'août, septembre et octobre. Il a trouvé o<sup>mil</sup>,802 pour la variation moyenne de l'année. Déterminons la probabilité des différences de ces variations en les supposant dues aux anomalies du hasard.

Si l'on nomme u l'erreur de la variation conclue par une moyenne de onze années ou de cent trente-deux mois ; la probabilité de cette erreur sera proportionnelle à

$$\frac{-132.\overline{k}}{4\overline{k''}}.u^2$$

comme il est facile de s'en assurer par le n° 20 du second livre de ma Théorie analytique des Probabilités. Pareillement si l'on nomme u' l'erreur de la variation conclue par une moyenne des mois de février, mars et avril, pendant onze années; la probabilité de u' sera proportionnelle à

$$+\frac{3.8.1}{c} - \frac{8.1 - 33.\overline{k}}{4\overline{k''} \cdot 18} \cdot \frac{1}{100} \cdot \frac{1}{100}$$

la probabilité de l'existence simultanée de u et de u' sera donc proportionnelle à

$$c^{\frac{-33 \cdot \overline{k}}{4\overline{k''}} \cdot (4u^2 + u'^2)}$$

Soit u' = u + z; la probabilité de l'existence simultanée de u et de z sera ainsi proportionnelle à

$$\frac{-33.\overline{k}}{4\overline{k^n}} \left[ 5\left(u + \frac{1}{5}z\right)^2 + \frac{4}{5}z^2 \right]$$

En multipliant cette exponentielle par du et intégrant le produit depuis  $u = -\infty$ , jusqu'à  $u = \infty$ , on aura une quantité proportionnelle à la probabilité de la valeur de z correspondante à l'ensemble de toutes les valeurs de u; et cette exponentielle sera proportionnelle à

$$\frac{-33 \cdot \overline{k}}{4\overline{k''}} \frac{4}{5} z^{2}$$

En faisant donc

$$h^{\bullet} = \frac{33 \cdot \bar{k}}{4\bar{k}''} \cdot \frac{4}{5};$$

la probabilité que la valeur de z sera comprise dans des limites données, est

$$\frac{\int hdz.c^{-h^2z^2}}{\sqrt{\pi}},$$

l'intégrale étant prise dans ces limites. Par les observations précédentes, z est égal à o<sup>mil</sup>, 940 — o<sup>mil</sup>, 763 ou à o<sup>mil</sup>, 177; ainsi la probabilité que z est au-dessous de o<sup>mil</sup>, 177, est

$$1 - \int_{0,177.h}^{\infty} dt e^{-t^2}$$

On a par le nº 44 de ma Théorie analytique des probabilités,

$$\frac{\int_{T}^{\infty} dt_{i}c^{-t^{2}}}{\sqrt{\pi}} = \frac{c^{-T_{2}}}{2T.\sqrt{\pi}} \left(1 - \frac{1}{2T^{2}} + \frac{1.3}{2^{2}.T^{4}} - \frac{1.3.5}{2^{3}T^{6}} + \text{etc.}\right);$$

et la série a l'avantage de donner une valeur alternativement plus grande et plus petite, suivant que l'on s'arrête à un nombre pair ou impair de ses termes.

Si l'on fait  $\frac{1}{2T^2} = q$ ; la série  $1 - \frac{1}{2T^2} + \frac{1 \cdot 3}{2^2T^4} - \rho c$ , peut être mise sous la forme suivante, de fraction continue

$$\frac{1}{1+q}$$

$$\frac{1}{1+\frac{2q}{1+\frac{4q}{1+\text{etc.}}}}$$

Ici l'on a

$$T = 0,177.h; h = 33.\frac{\bar{k}}{4\bar{k}'}.\frac{4}{5};$$

et l'on a par le n° précédent

$$\frac{k}{4k''} = 33 \cdot \frac{k}{4k''} = 33 \cdot 0,42884 = 12,8652;$$

on a donc

$$T^a = (0,177)^a \cdot 24 \cdot 12,8652;$$

c'est le logarithme hyperbolique de c<sup>T</sup>, et pour avoir le logarithme tabulaire de cette exponentielle, il faut le multiplier par 0,434294. On trouvera ainsi à fort peu près

$$\frac{\int_{T}^{\infty} dt. e^{-ts}}{\sqrt{\pi}} = 0,0000015815;$$

en retranchant ce nombre de l'unité, on aura la probabilité que l'excès de la variation diurne observée pendant les trois mois de février, mars et avril, et pendant onze années, sur la variation moyenne des onze années, serait moindre que o<sup>mil</sup>, 177, s'il était dû aux simples anomalies du hasard. L'excès observé indique donc avec une extrême vraîsemblance une cause constante, qui augmente à Paris, la variation diurne du baromètre, pendant les trois mois cités.

On trouve de la même manière que l'excès o<sup>mt</sup>, 205, de la variation moyenne de l'année, sur la variation moyenne des trois mois de novembre, décembre et janvier, indique avec une vraisemblance encore plus grande, une cause constante, qui diminue la variation diurne pendant ces mois.

Enfin on trouve que les différences observées entre la variation moyenne de l'année, et les variations moyennes, soit des trois mois de mai, juin et juillet, soit des trois mois d'août, de septembre et octobre, peuvent sans invraisemblance être attribuées aux seules anomalies du hasard.

Les observations de la variation dinrne du baromètre, de neuf heures du matin à trois heures du soir, discutées par M. Bouvard, présentent ce phénomène remarquable, savoir que la variation moyenne de chacun des cent trente-deux mois qu'il a considérés, a été positive. Pour apprécier la probabilité de ce phénomène, je supposerai que la variation moyenne des trois mois de novembre, décembre et janvier, serait, indépendamment des anomalies du hasard, et par l'effet des seules causes régulières, celle que M. Bouvard a conclue de onze an-

nées d'observations, savoir o<sup>mil</sup>, 557. Je ferai une supposition semblable relativement à la variation des trois mois suivans, février, mars et avril, et qui a été trouvée de o<sup>mil</sup>, 940. Enfin je supposerai que la variation moyenne des six autres mois, qui ne paraît être soumise qu'à l'action des causes accidentelles, est celle que l'on a trouvée pour l'année entière, savoir o<sup>mil</sup>, 762. Cela posé, si l'on nomme u l'erreur de la variation d'un mois, due aux seules causes accidentelles; la probabilité de cette erreur sera par ce qui précède, proportionnelle à c<sup>-12,525.u²</sup>. D'où il est facile de conclure que la probabilité que u ne sera pas au-dessous de o<sup>mil</sup>,557 sera

$$1 - \frac{\int dt \cdot c^{-t^2}}{\sqrt{\pi}},$$

en supposant

$$t^2 = 12,8652.u^2$$

et l'intégrale étant prise depuis t = 0.557.  $\sqrt{12.8652}$  jusqu'à  $t = \infty$ .

La probabilité qu'aucun des trois mois de novembre, décembre et janvier n'aura de variation négative, ou que l'erreur négative de u n'atteindra jamais —  $0^{mil}$ , 557, sera

$$\left(1-\frac{\int dt.c^{-t_2}}{\sqrt{\pi}}\right)^3$$

et celle que le même résultat aura lieu pendant onze années sera

$$\left(1-\frac{\int dt.c^{-t^2}}{\sqrt{\pi}}\right)^{33}.$$

On trouvera de la même manière que la probabilité semblable relative aux trois mois de février, mars et avril est

$$\left(1-\frac{\int dt.c^{-t^2}}{\sqrt{\frac{-}{\pi}}}\right)^{33},$$

l'intégrale étant prise depuis t = 0.940.  $\sqrt{12,8652}$  jusqu'à  $t = \infty$ .

Enfin on trouvera que la probabilité semblable relative aux six autres mois est

$$\left(1-\frac{\int dt.c^{-t2}}{\sqrt{\pi}}\right)^{66},$$

l'intégrale étant prise depuis  $t = 0^{mt}$ ,762 ·  $\sqrt{12,8652}$  jusqu'à  $t = \infty$ .

Le produit de ces trois probabilités est la probabilité du phénomène

observé, que l'on trouvera ainsi à peu près égale à 0,9; en sorte que, loin de présenter une chose invraisemblable, il est lui-même vraisemblable.

J'ai supposé dans tous ces résultats tous les mois égaux et de 30 jours. On leur donnerait plus d'exactitude en y introduisant l'inégalité des mois, ce qui n'a d'autre difficulté que la longueur du calcul. Mais comme il suffit que ces résultats soient approchés pour que nos conclusions soient justes, soit relativement à l'existence des causes régulières qui produisent le maximum et le minimum de la variation, soit relativement à la vraisemblance du phénomène suivant lequel tous les 132 mois ont donné une variation diurne positive, on peut se dispenser de ce calcul.

FIN.

SUPPLEMENT ALL V. VOLUME.

observi. 1711 for nonversites à peu prés égale à 0,0 , an suite que, loin de présentair une abore fuverisanblable, il est lui-même vraisem-

I'd apposé dans tons des pérdiats tons les mois égays et de 30 jours con les donnemit plus d'expetitude en y introditisant d'inégalité des mois, ce qui t'é d'intre difficulté que la longueur du caloul. Mais comme il suffic que les résultats soient approchés pour que nos conclusions soient justes, soit relativement à l'existence des causes régulières qui produisent le maximum et le minimum de la variation, soit relativement à la vreisenflieure du phénomene suivant lequel tons les 13 a nois out donné une variation dinvie positive, on peut se dispenser de ce salest

on such mosant


and the second second second remaining the second s


The probabilities for the second to the seco


The Challe and the Colored way and the Spirit State of the Colored Spirit State of the Colored Spirit Spiri

Comparation of the comparation o


pulse and the second of the se






















Continue					
3   1   1   2   1   1   2   1   1   1   1	stors	-	32	x William	2
3   1   1   2   1   1   2   1   1   1   1	ntime				ap
3   1   1   2   1   1   1   2   1   1   1	CO1		30	27,17	ces L
3   1   1   2   1   1   1   2   1   1   1	11111		29	0.88	Serv
3   1   1   2   1   1   1   2   1   1   1	16 11			45 45 59	Color
3   1   1   2   1   1   1   2   1   1   1	all in			83.3	unsell
3   1   1   2   1   1   1   2   1   1   1	8 111			43.9 52.00 30.01	by M
3   1   1   2   1   1   1   2   1   1   1	HILL		26	54.91 -38.91 30.77	Colors
3	Z HILL			13.06	
3	11119		24	72.95 16.83 68.80	
3	HILL			72.46 24.45 55.93	1
3	11/811			90.08	
3	THE REAL PROPERTY.			3.44	2.42
3	1111	-		181	04
3	31111			200	67 2
3	B		110	200	1
3	1011		18 (8	28.8	1.2
3				38.62	96.0
3	E		16 (M)		
3		2 2	0	22	
3	•	Sie 1 Sic Sie			en In
3	0	in the first			7
3				0	Gold
3	H				
3	-		15		
3			14   15		
3			13 14 15		
3			12   13   14   15		
C 3912 6643 4647 4426 5656 7082 6351 3922 622 62 6251 3922 6351 3922 6351 3922 6351 3922 6351 3922 6351 3922 6351 3922 6351 3922 6351 3922 6351 3922 6351 3922 6351 3922 6351 3922 6351 3922 6351 3922 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351			11 (A)   12   13   14   15	92.02 87.34 82.14 72.06 62.15 -0.60 0.75 -1.06 -1.19 -1.07 0.23 0.21 0.43 0.28 0.19	0.15 0.22 0.36 0.51
C 2012 654 9097 442 56 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 6 7			10   11 (A)   12   13   14   15	92.02 87.34 82.14 72.06 62.15 -0.60 0.75 -1.06 -1.19 -1.07 0.23 0.21 0.43 0.28 0.19	0.09 0.15 0.22 0.36 0.51
C			9   10   11 (A)   12   13   14   15	92.02 87.34 82.14 72.06 62.15 -0.60 0.75 -1.06 -1.19 -1.07 0.23 0.21 0.43 0.28 0.19	► 0.04 0.09 0.15 0.22 0.36 0.51
C 39.7 (4.7 (7.7 (7.7 (7.7 (7.7 (7.7 (7.7 (7			8 9 10 11(A) 12 13 14 15	92.02 87.34 82.14 72.06 62.15 -0.60 0.75 -1.06 -1.19 -1.07 0.23 0.21 0.43 0.28 0.19	► 0.04 0.09 0.15 0.22 0.36 0.51
Complete   1   2   3   4   5   5   5   5   5   5   5   5   5			7 8 9 10 11(A) 12 13 14 15	92.02 87.34 82.14 72.06 62.15 -0.60 0.75 -1.06 -1.19 -1.07 0.23 0.21 0.43 0.28 0.19	► 0.04 0.09 0.15 0.22 0.36 0.51
Control of the contro	2		1 7   8   9   10   11(A)   12   13   14   15	92.02 87.34 82.14 72.06 62.15 -0.60 0.75 -1.06 -1.19 -1.07 0.23 0.21 0.43 0.28 0.19	► 0.04 0.09 0.15 0.22 0.36 0.51
C 29 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			6   7   8   9   10   11(A)   12   13   14   15	92.02 87.34 82.14 72.06 62.15 -0.60 0.75 -1.06 -1.19 -1.07 0.23 0.21 0.43 0.28 0.19	► 0.04 0.09 0.15 0.22 0.36 0.51
nches 4 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			5   6   7   8   9   10   11(A)   12   13   14   15	92.02 87.34 82.14 72.06 62.15 -0.60 0.75 -1.06 -1.19 -1.07 0.23 0.21 0.43 0.28 0.19	Density
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2		4   5   6   7   8   9   10   11(A)   12   13   14   15	92.02 87.34 82.14 72.06 62.15 -0.60 0.75 -1.06 -1.19 -1.07 0.23 0.21 0.43 0.28 0.19	Density
nches 4 1	2		3 4 5 6 7 8 9 10 11(A) 12 13 14 15	92.02 87.34 82.14 72.06 62.15 -0.60 0.75 -1.06 -1.19 -1.07 0.23 0.21 0.43 0.28 0.19	Density
D50	3		2 3 4 5 6 7 8 9 10 111(A) 12 13 14 15	92.02 87.34 82.14 72.06 62.15 -0.60 0.75 -1.06 -1.19 -1.07 0.23 0.21 0.43 0.28 0.19	Density
			1 2 3 4 6 6 6 7 8 9 10 11(A) 12 13 14 15	92.02 87.34 82.14 72.06 62.15 -0.60 0.75 -1.06 -1.19 -1.07 0.23 0.21 0.43 0.28 0.19	Density